

抗血栓薬の術前休薬期間

◇本一覧は、当院(院内・院外)採用薬と未採用の先発医薬品に関して、抗血小板薬・抗凝固薬等の術前休薬期間の目安を記載しています。
 ◇休薬期間は各薬剤の添付文書等を参考に、当院麻酔科医師と相談の上、院内で規定しています。出血リスクや休薬による血栓・塞栓症リスクに応じて、主治医の判断で期間が短縮または延長される可能性があります。
 ◇抗菌・白内障手術・体表の小手術で術後出血への対応が容易な場合等は、抗血栓療法継続下での実施が推奨されています。
 ◇内視鏡的処置前の休薬に関しては、本一覧とは別の規定となっていますのでご留意下さい。
 ◇後発品に関しては一般名を参照の上、先発品の休薬期間に準じてください。

●:院内採用薬 ○:院外採用薬

2020年5月

採用区分	薬品名	一般名	休薬期間の目安	添付文書上の休薬に関する記載
	アンブラーグ細粒10%	サルポグレラート塩酸塩	2日	
●	アンブラーグ錠100mg	サルポグレラート塩酸塩	2日	記載なし
	アンブラーグ錠50mg	サルポグレラート塩酸塩	2日	
●(錠)	イグザレルト錠・細粒分包10mg	リバーロキサバン	1日*	24時間
●(錠)	イグザレルト錠・細粒分包15mg	リバーロキサバン	1日*	
	エパデールS300	イコサペント酸エチル	1週間	
○	エパデールS600	イコサペント酸エチル	1週間	記載なし
●	エパデールS900	イコサペント酸エチル	1週間	(手術予定は慎重投与)
○	エパデールカプセル300	イコサペント酸エチル	1週間	
●(OD)	エフィエント錠・OD錠20mg	プラスグレル塩酸塩	1週間	
	エフィエント錠2.5mg	プラスグレル塩酸塩	1週間	14日以上
●	エフィエント錠3.75mg	プラスグレル塩酸塩	1週間	
	エフィエント錠5mg	プラスグレル塩酸塩	1週間	
●	エリキウス錠2.5mg	アピキサバン	2日(低リスク1日)*	低リスク:24時間 中～高リスク:48時間
●	エリキウス錠5mg	アピキサバン	2日(低リスク1日)*	
●(後発)	オパルモン錠5μg	リマプロスト アルファデクス	2日	記載なし
	キャブピリン配合錠	アスピリン・ボノプラザンフマル酸塩配合剤	1週間	記載なし(術前7日は慎重投与)
○	コンプラビン配合錠	クロピドグレル硫酸塩・アスピリン	1週間	14日以上
○	タケルダ配合錠	アスピリン・ランソプラゾール配合剤	1週間	記載なし(術前7日は慎重投与)
	ドルナー錠20μg	ベラプロストナトリウム	2日	記載なし
●(後発)	バイアスピリン錠100mg	アスピリン	1週間	記載なし(術前7日は慎重投与)
	パナルジン細粒10%	チクロピジン塩酸塩	1週間	10～14日
○	パナルジン錠100mg	チクロピジン塩酸塩	1週間	
●	プラザキサカプセル110mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	2日(小手術1日)*	24時間 大手術・ハイリスクは2日以上
●	プラザキサカプセル75mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	2日(小手術1日)*	
●(後発)	プラビックス錠25mg	クロピドグレル硫酸塩	1週間	14日以上
●(後発)	プラビックス錠75mg	クロピドグレル硫酸塩	1週間	
○	ブリリント錠60mg	チカグレロル	5日	5日以上前に投与中止が望ましい
	ブリリント錠90mg	チカグレロル	5日	
●	プレタールOD錠100mg	シロスタゾール	2日	
○	プレタールOD錠50mg	シロスタゾール	2日	記載なし
	プレタール散20%	シロスタゾール	2日	
●(後発)	プロサイリン錠20	ベラプロストナトリウム	2日	記載なし
○	プロレナール錠5μg	リマプロスト アルファデクス	2日	記載なし
○	ベラサスLA錠60μg	ベラプロストナトリウム	2日	記載なし
○	ペルサンチン-Lカプセル150mg	ジピリダモール	2日	記載なし
●	ペルサンチン錠100mg	ジピリダモール	2日	
	ペルサンチン錠12.5mg	ジピリダモール	2日	
○	ペルサンチン錠25mg	ジピリダモール	2日	
●(OD)	リクシアナ錠・OD錠15mg	エドキサバントシル酸塩水和物	1日*	24時間
●(OD)	リクシアナ錠・OD錠30mg	エドキサバントシル酸塩水和物	1日*	
●(OD)	リクシアナ錠・OD錠60mg	エドキサバントシル酸塩水和物	1日*	
●	ロトリガ粒状カプセル2g	オメガ-3脂肪酸エチル	1週間	記載なし(エパデールに準ずる)
	ワーファリン錠0.5mg	ワルファリンカリウム	5日(低リスク3日)	記載なし (手術時は禁忌)
●	ワーファリン錠1mg	ワルファリンカリウム	5日(低リスク3日)	
○	ワーファリン錠5mg	ワルファリンカリウム	5日(低リスク3日)	
	ワーファリン顆粒0.2%	ワルファリンカリウム	5日(低リスク3日)	

※<参考> 腎機能・出血リスク別DOAC休薬期間(JCSガイドラインフォーカスアップデート版2020より)

腎機能	CCr ≥ 80		50 ≤ CCr < 80		30 ≤ CCr < 50		15 ≤ CCr < 30		CCr < 15	
	低リスク	高リスク	低リスク	高リスク	低リスク	高リスク	低リスク	高リスク		
商品名	プラザキサ	24時間	48時間	36時間	72時間	48時間	96時間(4日前)	使用禁忌		使用禁忌
	エリキウス			24時間	48時間	24時間	48時間	36時間	48時間	
	イグザレルト									
	リクシアナ									