

【自動車運転等に影響のある可能性のある主な薬剤】

薬効分類	主な薬剤	理由
全身麻酔剤	プロポフォール 等	薬剤の影響が完全に消失するまでは、自動車の運転に従事しない
催眠鎮痛剤、抗不安剤	グッドミン、ゾルピデム、エチゾラム 等	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがある
抗てんかん剤	アレビアチン、イーケプラ、デパケン 等	眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがある
解熱鎮痛消炎剤、疼痛治療剤	セレコックス、トラムセット、リリカ 等	眠気、めまい、意識消失が起こることがある
抗パーキンソン剤	メネシット、ビ・シフロール、ミラペックスLA 等	前兆のない突発的睡眠、傾眠、調整障害及び、注意力・集中力・反射機能等の低下が起こることがある
精神神経用剤	セレネース、リスパーダル、リフレックス 等	眠気、めまい等があらわれることがある
総合感冒剤	PL配合顆粒	眠気を催すことがある
認知症治療剤	アリセプト、メモリー、イクセロンパッチ 等	アルツハイマー型認知症では、機械操作能力が低下する可能性がある。また本剤により、意識障害、めまい、眠気等があらわれることがある。
鎮けい剤、痙性麻痺緩解剤	テルネリン、エペリゾン、ダントリウム 等	反射運動能力の低下、眠気、めまい及び低血圧等があらわれることがある
眼科用剤	キサラタン点眼、エイゾプト点眼、アイファガン点眼 等	一時的に霧視があらわれることがある
鎮暈剤	トラベルミン	眠気を催すことがある
不整脈用剤	シベノール、メインテート、テノーミン 等	めまい、ふらつきがあらわれることがある
利尿剤	アルダクトンA、ラシックス 等	降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがある
血圧降下剤、血管拡張剤	アジルバ、オルメテック、アーチスト、アムロジピン 等	降圧作用に基づくめまい等があらわれることがある
鎮咳剤	メジコン、リン酸コデイン 等	眠気を催すことがある
消化器管用剤	ナウゼリン、ロペラミド 等	眠気、めまい・ふらつきがあらわれることがある
泌尿器管用剤	タムスロシン、ベシケア、ユリーフ、バップフォー 等	眼調整機能(羞眠、霧視、眼の異常感覚等)、めまい、眠気があらわれることがある
糖尿病用剤	インスリン製剤、アマリール、グリミクロン 等	重篤かつ遷延性の低血糖を起こすことがある
アレルギー用剤	アレロック、エピナスチン、ポララミン、レスタミン 等	眠気を催すことがある
抗菌剤、抗ウイルス剤等	レボフロキサシン、ピクロックス、バルトレックス 等	眠気、めまい・ふらつき、意識障害等があらわれることがある