

# 食道

レジメン名	食道癌 weeklyPTX療法													更新日								
														1クール	49日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	8	15	22	29	36	49												
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓		↓		↓								
グラニセトロン点滴静注 ガスター注射液 デキサート注射液	1mg/50mL 20mg 6.6mg	点滴末梢	15分	↓		↓		↓		↓		↓		↓								
パクリタキセル注 ブドウ糖液5%	100mg/m <sup>2</sup> 250ml	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓		↓		↓		↓								
レスタミンコーワ	5錠	内服	投与前	↓		↓		↓		↓		↓		↓								

備考：

レジメン名	食道癌：NIVO（240mg/body:2週毎）													更新日								
														1クール	14日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	14																	
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																		
オブジーボ点滴静注 生理食塩液	240mg/body 100mL	点滴末梢	30分	↓																		

備考：

レジメン名	食道癌：NIVO（480mg/body:4週毎）													更新日								
														1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	28																	
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																		
オブジーボ点滴静注 生理食塩液	480mg/body 100mL	点滴末梢	30分	↓																		

備考：

# 食道

レジメン名	TXT tri-weekly(70)				更新日	2020/3/17													
					1クール	21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓															
ドセタキセル点滴静注 ブドウ糖液5%	70mg/m <sup>2</sup> 500ml	点滴末梢	1時間30分	↓															

備考：

# 食道

レジメン名	食道癌 FOLFOX 6 (リザーバー)			更新日	2021/11/15														
				1クール	14日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	14													
生理食塩液	20mL	フラッシュ	フラッシュ	↓															
ブドウ糖液5%	100mL	中心静脈	メイン	↓															
アロキシ点滴静注 デキサート注射液 ポララミン注	0.75mg 6.6mg 5mg	中心静脈	15分	↓															
レボホリナート点滴静注用 ブドウ糖液5%	200mg/m <sup>2</sup> 250ml	中心静脈	2時間	↓															
オキサリプラチン点滴静注液 ブドウ糖液5%	85mg/m <sup>2</sup> 250ml	中心静脈	2時間	↓															
フルオロウラシル注 生理食塩液	400mg/m <sup>2</sup> 50ml	中心静脈	15分	↓															
フルオロウラシル注 ヘパリンナトリウム注射液 生理食塩液	2400mg/m <sup>2</sup> 5000単位 適宜調整	中心静脈	46時間	↓															

備考：レボホリナートとオキサリプラチンは同時に開始。

# 食道

レジメン名	食道癌 FOLFOX 6 (末梢)			更新日																						
				1クール	2021/11/15	14日間																				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
ブドウ糖液5%	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓																					
アロキシ点滴静注 デキサート注射液 ポララミン注	0.75mg 6.6mg 5mg	点滴末梢	15分	↓																						
レボホリナート点滴静注用 ブドウ糖液5%	200mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	2時間	↓																						
オキサリプラチン点滴静注液 デキサート注射液 ブドウ糖液5%	85mg/m <sup>2</sup> 1.65mg 250ml	点滴末梢	2時間	↓																						
フルオロウラシル注 生理食塩液	400mg/m <sup>2</sup> 50ml	点滴末梢	15分	↓																						
フルオロウラシル注 生理食塩液	1200mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	23時間	↓	↓																					

備考：レボホリナートとオキサリプラチンは同時に開始。