

食道

レジメン名	食道癌 weeklyPTX療法																更新日	2020/3/17			
																	1クール	49日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	8	・	15	・	22	・	29	・	36	・	49					
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓		↓		↓							
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓		↓		↓		↓							
ガスター注射液	20mg																				
デキサート注射液	6.6mg																				
パクリタキセル注	100mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓		↓		↓		↓							
ブドウ糖液5%	250ml																				
レスタミンコーワ	5錠	内服	投与前	↓		↓		↓		↓		↓		↓							

備考：

レジメン名	食道癌：NIVO（240mg/body:2週毎）																更新日	2020/3/13						
																	1クール	14日間						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																				
				1	・	14																		
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓			14																	
オブジーボ点滴静注	240mg/body	点滴末梢	30分	↓																				
生理食塩液	100mL																							

備考：

レジメン名	食道癌：NIVO（480mg/body:4週毎）																更新日	2021/3/23			
																	1クール	28日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	28															
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																	
オブジーボ点滴静注	480mg/body	点滴末梢	30分	↓																	
生理食塩液	100mL																				

備考：

食道

レジメン名	食道癌：IPI+NIVO（240mg/body:2週毎）																更新日	2023/2/21	
																	1クール	42日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	15	・	29	・	42									
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓															
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン			↓		↓											
オブジーボ点滴静注	240mg	点滴末梢	30分	↓		↓		↓											
生理食塩液	100mL																		
ヤーボイ点滴静注液	1mg/kg	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	50mL																		

備考：

レジメン名	食道癌：IPI+NIVO（360mg/body:3週毎）																更新日	2023/2/21	
																	1クール	42日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	22	・	42											
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓															
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン			↓													
オブジーボ点滴静注	360mg	点滴末梢	30分	↓		↓													
生理食塩液	100mL																		
ヤーボイ点滴静注液	1mg/kg	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	50mL																		

備考：

食道

レジメン名	TXT tri-weekly(70)																更新日	2020/3/17		
																	1クール	21日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																
デキサート注射液	6.6mg																			
ドセタキセル点滴静注	70mg/m ²	点滴末梢	1時間30分	↓																
ブドウ糖液 5 %	500ml																			

備考：

食道

レジメン名	食道癌 FOLFOX 6（リザーバー）																	更新日	2022/9/27	
																		1クール	14日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	14														
生理食塩液	20mL	フラッシュ	フラッシュ	↓																
ブドウ糖液 5 %	100mL	中心静脈	メイン	↓																
パロノセトロン点滴静注	0.75mg	中心静脈	15分	↓																
デキサート注射液	6.6mg																			
ポララミン注	5mg																			
レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	中心静脈	2時間	↓																
ブドウ糖液 5 %	250ml																			
オキサリプラチン点滴静注液	85mg/m ²	中心静脈	2時間	↓																
ブドウ糖液 5 %	250ml																			
フルオロウラシル注	400mg/m ²	中心静脈	15分	↓																
生理食塩液	50ml																			
フルオロウラシル注	2400mg/m ²	中心静脈	46時間	↓																
ヘパリンナトリウム注射液	5000単位																			
生理食塩液	適宜調整																			

備考：レボホリナートとオキサリプラチンは同時に開始。

食道

[illegible]

備考：レボホリナートとオキサリプラチンは同時に開始。

食道

レジメン名	食道癌 Pembro+F リザーバー（維持）																	更新日	2022/5/11		
																		1クール	21日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	2	3	4	・	21												
生理食塩液	20mL	フラッシュ	フラッシュ	↓																	
生理食塩液	100mL	中心静脈	メイン	↓																	
生理食塩液	100mL	中心静脈	30分	↓																	
キイトルーダ点滴静注	200mg/body																				
生理食塩液	50mL	中心静脈	15分	↓																	
デキサート注射液	3.3mg																				
フルオロウラシル注	4000mg/m ²	中心静脈	120時間	↓																	
ヘパリンナトリウム注射液	5000単位																				
生理食塩液	100mL																				

備考：最大35コース（2年）

レジメン名	食道癌 Pembro+F 末梢（維持）																	更新日	2022/5/11		
																		1クール	21日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	2	3	4	5													
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓	↓	↓													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	30分	↓																	
キイトルーダ点滴静注	200mg/body																				
生理食塩液	50mL	点滴末梢	15分	↓	↓	↓	↓														
デキサート注射液	3.3mg																				
フルオロウラシル注	800mg/m ²	点滴末梢	24時間	↓	↓	↓	↓	↓													
生理食塩液	500mL																				

備考：最大35コース（2年）

食道

レジメン名	食道癌 Pembro+FP																			更新日	2022/9/27			
																				1クール	21日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																				
				1	2	3	4	5	・	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓							21													
ラクテック注	1000mL	点滴末梢	メイン		↓	↓	↓	↓																
生理食塩液	100mL	点滴末梢	30分	↓																				
キイトルーダ点滴静注	200mg/body																							
ソルデム 3 A 輸液	500mL	点滴末梢	1時間	↓																				
硫酸Mg	8mEq																							
パロノセトロン点滴静注	0.75mg	点滴末梢	15分	↓																				
デキサート注射液	9.9mg																							
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分		↓	↓	↓																	
生理食塩液	50mL																							
マンニトール S 注射液	200mL	点滴末梢	30分	↓																				
シスプラチン点滴静注液	80mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																				
生理食塩液	500mL																							
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓																				
フルオロウラシル注	800mg/m ²	点滴末梢	24時間	↓	↓	↓	↓	↓																
生理食塩液	500mL																							
ソルデム 3 A 輸液	500mL	点滴末梢	1時間	↓																				

備考：最大6コース。アプレピタントカプセルセット(day1～3)

食道

[illegible]

備考：

食道

[illegible]

備考：
