

胃

| レジメン名 | G-SOX | | | | 更新日 | 2020/3/19 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------|------|-----|----------------|-----------|---|---|---|----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 1クール | 21日間 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | . | . | . | . | . | 15 | . | 21 | | | | | | | | | |
| ブドウ糖液5% | 500mL | 点滴末梢 | メイン | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液 ポララミン注 | 3mg/100mL 6.6mg 5mg | 点滴末梢 | 30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オキサリプラチン点滴静注液 デキサート注射液 ブドウ糖液5% | 100mg/m ² 1.65mg 250ml | 点滴末梢 | 2時間 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S-1 | 備考参照 | 内服 | 朝夕食後 | | day1夕～day15朝服用 | | | | | | | | | | | | | | | | |

備考：S-1 体表面積<1.25m² 80mg/日、1.25～1.5未満 100mg/日、1.5≤120mg/日

| レジメン名 | G-SOX(リザーバ) | | | | 更新日 | 2020/3/19 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------|-------|-----|----------------|-----------|---|---|---|----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 1クール | 21日間 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | . | . | . | . | . | 15 | . | 21 | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 20mL | フラッシュ | フラッシュ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブドウ糖液5% | 500mL | 中心静脈 | メイン | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液 ポララミン注 | 3mg/100mL 6.6mg 5mg | 中心静脈 | 30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オキサリプラチン点滴静注液 ブドウ糖液5% | 100mg/m ² 250ml | 中心静脈 | 2時間 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヘパリンナトリウム注射液 | 5000単位 | ロック | ロック | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S-1 | 備考参照 | 内服 | 朝夕食後 | | day1夕～day15朝服用 | | | | | | | | | | | | | | | | |

備考：S-1 体表面積<1.25m² 80mg/日、1.25～1.5未満 100mg/日、1.5≤120mg/日

胃

| レジメン名 | 術前G-SOX | | | | 更新日 | | 投与日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|------|------|----------------|-----------|---|-----------|---|---|----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 2020/3/19 | | 1クール 21日間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 1 | . | . | . | . | . | 15 | . | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブドウ糖液 5% | 500mL | 点滴末梢 | メイン | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液 ポラミン注 | 3mg/100mL 6.6mg 5mg | 点滴末梢 | 30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オキサリプラチン点滴静注液 デキサート注射液 ブドウ糖液 5% | 130mg/m ² 1.65mg 250ml | 点滴末梢 | 2時間 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S-1 | 備考参照 | 内服 | 朝夕食後 | day1夕～day15朝服用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

備考：S-1 体表面積<1.25m² 80mg/日、1.25～1.5未満 100mg/日、1.5≤120mg/日
術前2～3コースまで

| レジメン名 | GC：RAM+nabPTX | | | | 更新日 | | 投与日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|------|------|---|-----------|---|-----------|----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 2020/3/19 | | 1クール 28日間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 1 | . | 8 | . | 15 | . | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 250mL | 点滴末梢 | メイン | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| グラニセトロン点滴静注バッグ デキサート注射液 | 1mg/50mL 6.6mg | 点滴末梢 | 15分 | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サイラムザ点滴静注液 生理食塩液 | 8mg/kg 250ml | 点滴末梢 | 1時間 | ↓ | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アブラキサン点滴静注用 生理食塩液 | 100mg/m ² 100ml | 点滴末梢 | 30分 | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

備考：サイラムザ投与日は前投薬として抗ヒスタミン剤を使用（経口薬も可）

胃

| レジメン名 | GC ; RAM+PTX療法 | | | | 投与日 | | | | | | | | | | | | | | 更新日 | 2020/3/19 | | | | | |
|----------------|---------------------|------|------|-----|------|---|------|----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----------|--|--|--|--|--|
| | | | | | 1クール | | 28日間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | ・ | 8 | ・ | 15 | ・ | 28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 250mL | 点滴末梢 | メイン | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| グラニセトロン点滴静注バッグ | 1mg/50mL | 点滴末梢 | 15分 | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デキサート注射液 | 6.6mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ガスター注射液 | 20mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サイラムザ点滴静注液 | 8mg/kg | 点滴末梢 | 1時間 | ↓ | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 250ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パクリタキセル注 | 80mg/m ² | 点滴末梢 | 1時間 | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 250ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| レスタミンコーワ | 50mg | 内服 | 投与前 | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

備考：

| レジメン名 | GC ; RAM単剤療法 | | | | 投与日 | | | | | | | | | | | | | | 更新日 | 2020/3/19 | | | | |
|------------|--------------|------|------|-----|------|----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----------|--|--|--|--|
| | | | | | 1クール | | 14日間 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | ・ | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 250mL | 点滴末梢 | メイン | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サイラムザ点滴静注液 | 8mg/kg | 点滴末梢 | 1時間 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 250ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

備考：サイラムザ投与日は前投薬として抗ヒスタミン剤を使用（経口薬も可）

| レジメン名 | GC : Weekly nabPTX | | | | 投与日 | | | | | | | | | | | | | | 更新日 | 2020/3/19 | | | | |
|-------------|----------------------|------|------|-----|------|---|------|----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----------|--|--|--|--|
| | | | | | 1クール | | 28日間 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | ・ | 8 | ・ | 15 | ・ | 28 | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 100mL | 点滴末梢 | メイン | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 100mL | 点滴末梢 | 15分 | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デキサート注射液 | 6.6mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アブラキサン点滴静注用 | 100mg/m ² | 点滴末梢 | 30分 | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 100ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

備考：

胃

| レジメン名 | | GC:胃癌XELOX (リザーバー) | | | | | | | 更新日 | 2020/3/19 | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------|----------------|---|---|---|---|------|-----------|---|----|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | 1クール | 21日間 | | | | | | | | | |
| 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | . | . | . | . | . | 15 | . | 21 | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 20mL | フラッシュ | フラッシュ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブドウ糖液5% | 100mL | 中心静脈 | メイン | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液 ポララミン注 | 3mg/100mL 6.6mg 5mg | 中心静脈 | 30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| オキサリプラチン点滴静注液 ブドウ糖液5% | 130mg/m ² 250ml | 中心静脈 | 2時間 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヘパリンナトリウム注射液 | 5000単位 | ロック | ロック | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| カペシタビン | 備考参照 | 内服 | 朝夕食後 | day1夕~day15朝服用 | | | | | | | | | | | | | | | |

備考：カペシタビン 1000mg/m²/回 (2000mg/m²/日) 1日2回

| レジメン名 | | GC:胃癌XELOX (末梢) | | | | | | | 更新日 | 2020/3/19 | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|------|----------------|---|---|---|---|------|-----------|---|----|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | 1クール | 21日間 | | | | | | | | | |
| 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | . | . | . | . | . | 15 | . | 21 | | | | | | | |
| ブドウ糖液5% | 250mL | 点滴末梢 | メイン | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液 ポララミン注 | 3mg/100mL 6.6mg 5mg | 点滴末梢 | 30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| オキサリプラチン点滴静注液 デキサート注射液 ブドウ糖液5% | 130mg/m ² 1.65mg 250ml | 点滴末梢 | 2時間 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| カペシタビン | 備考参照 | 内服 | 朝夕食後 | day1夕~day15朝服用 | | | | | | | | | | | | | | | |

備考：カペシタビン 1000mg/m²/回 (2000mg/m²/日) 1日2回

胃

| レジメン名 | FOLFOX 6 胃癌（リザーバー） | | | | 更新日 | 2020/3/19 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------|-------|-----|------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 1クール | 14日間 | | | | | | | | | | | | | |
| 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | ・ | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 20mL | フラッシュ | フラッシュ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブドウ糖液 5% | 100mL | 中心静脈 | メイン | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| アロキシ点滴静注 デキサート注射液 ポララミン注 | 0.75mg 6.6mg 5mg | 中心静脈 | 15分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| レボホリナート点滴静注用 ブドウ糖液 5% | 200mg/m ² 250ml | 中心静脈 | 2時間 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| オキサリプラチン点滴静注液 ブドウ糖液 5% | 85mg/m ² 250ml | 中心静脈 | 2時間 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| フルオロウラシル注 生理食塩液 | 400mg/m ² 50ml | 中心静脈 | 15分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| フルオロウラシル注 ヘパリンナトリウム注射液 生理食塩液 | 2400mg/m ² 5000単位 適宜調整 | 中心静脈 | 46時間 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | |

備考：レボホリナートとオキサリプラチンは同時に開始。

胃

| レジメン名 | TS-1+TXT(DOC) | | | | 更新日 | 2020/3/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|------|------|----------------|------|-----------|---|---|---|---|----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 1クール | 21日間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | . | . | . | . | . | . | 15 | . | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブドウ糖液5% | 250mL | 点滴末梢 | メイン | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液 | 1mg/50mL 6.6mg | 点滴末梢 | 30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドセタキセル点滴静注 ブドウ糖液5% | 40mg/m ² 250ml | 点滴末梢 | 1時間 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S-1 | 備考参照 | 内服 | 朝夕食後 | day1夕~day15朝服用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

備考：S-1 体表面積<1.25m² 80mg/日、1.25~1.5未満 100mg/日、1.5≦120mg/日

| レジメン名 | GC：Trastuzumab+SP併用療法 | | | | 更新日 | 2021/11/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------|---------------------|----------------|------|------------|---|---|---|---|---|---|----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 1クール | 21日間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | 15 | . | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 500mL | 点滴末梢 | メイン | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ラクテック注 | 500ml | 点滴末梢 | メイン | | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソルデム3A輸液 硫酸Mg補正液 | 500ml 8mEq | 点滴末梢 | 1時間 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アロキシ点滴静注 デキサート注射液 | 0.75mg 9.9mg | 点滴末梢 | 15分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 デキサート注射液 | 50ml 6.6mg | 点滴末梢 | 15分 | | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トラスツズマブBS点滴静注用 生理食塩液 | 8mg/kg (2回目以降 6mg/kg) 250ml | 点滴末梢 | 1時間30分(2回目以降30~45分) | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20%マンニトール注射液 | 200ml | 点滴末梢 | 30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シスプラチン点滴静注 生理食塩液 | 60mg/m ² 500ml | 点滴末梢 | 2時間 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソルデム3A輸液 | 500ml | 点滴末梢 | | ×2×2×2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S-1 | 備考参照 | 内服 | 朝夕食後 | day1夕~day15朝服用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

備考：S-1 体表面積<1.25m² 80mg/日、1.25~1.5未満 100mg/日、1.5≦120mg/日

胃

| レジメン名 | GC : Trastuzumab+XP併用療法 | | | 更新日 | 2021/11/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------|------------------------------|----------------|------------|----|---|---|---|----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 1クール | 21日間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | . | . | . | 15 | . | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 500ml | 点滴末梢 | メイン | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ラクテック注 | 500ml | 点滴末梢 | メイン | | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソルデム3A輸液 | 500ml | 点滴末梢 | 1時間 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硫酸Mg補正液 | 8mEq | 点滴末梢 | 15分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アロキシ点滴静注 | 0.75mg | 点滴末梢 | 15分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デキサート注射液 | 9.9mg | 点滴末梢 | 15分 | | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50ml | 点滴末梢 | 15分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デキサート注射液 | 6.6mg | 点滴末梢 | 15分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トラスツズマブBS点滴静注用 生理食塩液 | 8mg/kg (2回目以降 6mg/kg) 250ml | 点滴末梢 | 1時間30分 (2回目以降30分 ~45分) | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20%マンニトール注射液 | 200ml | 点滴末梢 | 30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シスプラチン点滴静注液 | 60mg/m ² | 点滴末梢 | 2時間 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 500ml | 点滴末梢 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソルデム3A輸液 | 500ml | 点滴末梢 | | ×2 | ×2 | ×2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カペシタビン | 備考参照 | 内服 | 朝夕食後 | day1夕～day15朝服用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

備考：カペシタビン 1000mg/m²/回（2000mg/m²/日） 1日2回

| レジメン名 | エンハーツ | | | 更新日 | 2021/3/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|------|--------|------|-----------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 1クール | 21日間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | . | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブドウ糖液5% | 100ml | 点滴末梢 | メイン | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アロキシ点滴静注 | 0.75mg | 点滴末梢 | 15分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デキサート注射液 | 9.9mg | 点滴末梢 | 15分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エンハーツ点滴静注用 注射用水 | 6.4mg/kg 20ml | 点滴末梢 | 30~90分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブドウ糖液5% | 100ml | 点滴末梢 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

備考：

胃

| レジメン名 | XELOX+Trastuzumab療法 | | | | | | | | | | | | | 更新日 | 2021/11/24 | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------|---------------------|-----|----------------|---|---|---|---|----|---|----|--|------|------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | 1クール | 21日間 | | | | | | |
| 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | . | . | . | . | . | 15 | . | 21 | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 100mL | 点滴末梢 | メイン | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液 ポララミン注 | 3mg/100mL 6.6mg 5mg | 点滴末梢 | 30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トラスツズマブBS点滴静注用 生理食塩液 | 8mg/kg (2回目以降 6mg/kg) 250ml | 点滴末梢 | 1時間30分(2回目以降30~45分) | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブドウ糖液5% | 250mL | 点滴末梢 | メイン | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オキサリプラチン点滴静注液 デキサート注射液 ブドウ糖液5% | 130mg/m ² 1.65mg 250ml | 点滴末梢 | 2時間 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カペシタビン | 備考参照 | 内服 | 朝夕食後 | | day1夕~day15朝服用 | | | | | | | | | | | | | | | | |

備考：カペシタビン 1000mg/m²/回 (2000mg/m²/日) 1日2回

胃

| レジメン名 | FOLFOX 6 胃癌（末梢） | | | | | | | | | | 更新日 | 2020/3/19 | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------|------|-----|---|---|----|--|--|--|------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | 1クール | 14日間 | | | | | | | | |
| 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | ・ | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| ブドウ糖液5% | 500mL | 点滴末梢 | メイン | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| アロキシ点滴静注 デキサート注射液 ポララミン注 | 0.75mg 6.6mg 5mg | 点滴末梢 | 15分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| レボホリナート点滴静注用 ブドウ糖液5% | 200mg/m ² 250mL | 点滴末梢 | 2時間 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オキサリプラチン点滴静注液 デキサート注射液 ブドウ糖液5% | 85mg/m ² 1.65mg 250ml | 点滴末梢 | 2時間 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フルオロウラシル注 生理食塩液 | 400mg/m ² 50ml | 点滴末梢 | 15分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フルオロウラシル注 生理食塩液 | 1200mg/m ² 500mL | 点滴末梢 | 23時間 | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | |

備考：レボホリナートとオキサリプラチンは同時に開始。

胃

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------|------|-----|---|----|--|--|--|--|------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| レジメン名 | GC : NIVO (240mg/body:2週間毎) | | | | | | | | | | 更新日 | 2020/3/13 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1クール | 14日間 | | | | | | | | |
| 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | . | 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 100mL | 点滴末梢 | メイン | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オプジーボ点滴静注 | 240mg/body | 点滴末梢 | 30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

備考：

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------|------|-----|---|----|--|--|--|--|------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| レジメン名 | GC : NIVO (480mg/body:4週間毎) | | | | | | | | | | 更新日 | 2021/3/23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1クール | 28日間 | | | | | | | | |
| 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | . | 28 | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 100mL | 点滴末梢 | メイン | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オプジーボ点滴静注 | 480mg/body | 点滴末梢 | 30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

備考：