

胃

レジメン名	G-SOX										更新日	2020/3/19								
											1クール	21日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	15	.	21								
ブドウ糖液5%	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液 ポララミン注	3mg/100mL 6.6mg 5mg	点滴末梢	30分	↓																
オキサリプラチン点滴静注液 デキサート注射液 ブドウ糖液5%	100mg/m ² 1.65mg 250ml	点滴末梢	2時間	↓																
S-1	備考参照	内服	朝夕食後		day1夕～day15朝服用															

備考：S-1 体表面積<1.25m² 80mg/日、1.25～1.5未満 100mg/日、1.5≤120mg/日

レジメン名	G-SOX(リザーバ)										更新日	2020/3/19								
											1クール	21日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	15	.	21								
生理食塩液	20mL	フラッシュ	フラッシュ	↓																
ブドウ糖液5%	500mL	中心静脈	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液 ポララミン注	3mg/100mL 6.6mg 5mg	中心静脈	30分	↓																
オキサリプラチン点滴静注液 ブドウ糖液5%	100mg/m ² 250ml	中心静脈	2時間	↓																
ヘパリンナトリウムロック用	100単位	ロック	ロック	↓																
S-1	備考参照	内服	朝夕食後		day1夕～day15朝服用															

備考：S-1 体表面積<1.25m² 80mg/日、1.25～1.5未満 100mg/日、1.5≤120mg/日

胃

レジメン名	術前G-SOX										更新日	2020/3/19								
											1クール	21日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	15	.	21							
ブドウ糖液5%	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液 ポララミン注	3mg/100mL 6.6mg 5mg	点滴末梢	30分	↓																
オキサリプラチン点滴静注液 デキサート注射液 ブドウ糖液5%	130mg/m ² 1.65mg 250ml	点滴末梢	2時間	↓																
S-1	備考参照	内服	朝夕食後	day1夕～day15朝服用																

備考：S-1 体表面積<1.25m² 80mg/日、1.25～1.5未満 100mg/日、1.5≤120mg/日
術前2～3コースまで

胃

レジメン名	GC : Trastuzumab + SP併用療法													更新日	2021/11/24				
														1クール	21日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	3	.	.	.	15	.	21							
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓															
ラクテック注	500ml	点滴末梢	メイン		↓	↓													
ソルデム3 A 輸液	500ml	点滴末梢	1時間	↓															
硫酸Mg 補正液	8mEq	点滴末梢	15分	↓															
パロノセトロン点滴静注	0.75mg	点滴末梢	15分	↓															
デキサート注射液	9.9mg	点滴末梢	15分		↓	↓													
生理食塩液	50ml	点滴末梢	15分		↓	↓													
トラスツズマブBS点滴静注用	8mg/kg	点滴末梢	1時間30分(2回目以降30~45分)	↓															
生理食塩液	(2回目以降6mg/kg) 250ml																		
20%マンニトール注射液	200ml	点滴末梢	30分	↓															
シスプラチン点滴静注液	60mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓															
生理食塩液	500ml	点滴末梢																	
ソルデム3 A 輸液	500ml	点滴末梢		×2	×2	×2													
S-1	備考参照	内服	朝夕食後	day1夕~day15朝服用															

備考：S-1 体表面積<1.25m² 80mg/日、1.25~1.5未満 100mg/日、1.5≦120mg/日

胃

レジメン名	GC : Trastuzumab + XP併用療法													更新日	2021/11/24				
														1クール	21日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	3	.	.	.	15	.	21							
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓															
ラクテック注	500ml	点滴末梢	メイン		↓	↓													
ソルデム3A輸液	500ml	点滴末梢	1時間	↓															
硫酸Mg補正液	8mEq	点滴末梢	1時間	↓															
パロノセトロン点滴静注	0.75mg	点滴末梢	15分	↓															
デキサート注射液	9.9mg	点滴末梢	15分	↓															
生理食塩液	50ml	点滴末梢	15分		↓	↓													
トラスツズマブBS点滴静注用 生理食塩液	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg) 250ml	点滴末梢	1時間30分(2回目以降30~45分)	↓															
20%マンニトール注射液	200ml	点滴末梢	30分	↓															
シスプラチン点滴静注液	60mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓															
生理食塩液	500ml	点滴末梢		↓															
ソルデム3A輸液	500ml	点滴末梢		×2	×2	×2													
カペシタビン	備考参照	内服	朝夕食後	day1夕~day15朝服用															

備考：カペシタビン 1000mg/m²/回 (2000mg/m²/日) 1日2回

胃

レジメン名	XELOX+Trastuzumab療法										更新日	2021/11/24								
											1クール	21日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	15	.	21							
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液 ポララミン注	3mg/100mL 6.6mg 5mg	点滴末梢	30分	↓																
トラスツズマブBS点滴静注用 生理食塩液	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg) 250ml	点滴末梢	1時間30分(2回目以降30~45分)	↓																
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
オキサリプラチン点滴静注液 デキサート注射液 ブドウ糖液5%	130mg/m ² 1.65mg 250ml	点滴末梢	2時間	↓																
カペシタビン	備考参照	内服	朝夕食後	day1夕~day15朝服用																

備考：カペシタビン 1000mg/m²/回 (2000mg/m²/日) 1日2回

胃

レジメン名	GC:mFOLFOX 6 +NIVO 胃癌（末梢）			更新日	2022/7/27														
				1クール	14日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	・	14												
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
オプジーボ点滴静注	240mg/body	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL	点滴末梢																	
ブドウ糖液5%	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓														
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	15分	↓															
デキサート注射液	6.6mg																		
ポララミン注	5mg																		
レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓															
ブドウ糖液5%	250mL																		
オキサリプラチン点滴静注液	85mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓															
デキサート注射液	1.65mg																		
ブドウ糖液5%	250ml																		
フルオロウラシル注	400mg/m ²	点滴末梢	15分	↓															
生理食塩液	50ml																		
フルオロウラシル注	1200mg/m ²	点滴末梢	23時間	↓	↓														
生理食塩液	500mL																		

備考：レボホリナートとオキサリプラチンは同時に開始。

胃

レジメン名	GC : NIVO (240mg/body:2週間毎)				更新日	2020/3/13													
					1クール	14日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	14													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
オプジーボ点滴静注	240mg/body	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		

備考：

レジメン名	GC : NIVO (480mg/body:4週間毎)				更新日	2021/3/23													
					1クール	28日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	28													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
オプジーボ点滴静注	480mg/body	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		

備考：