

胃

レジメン名	G-SOX													更新日		2020/3/19						
														1クール		21日間						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	.	.	.	.	.	15	.	21										
ブドウ糖液 5%	500mL	点滴末梢	メイン	↓																		
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																		
デキサート注射液	6.6mg																					
ポララミン注	5mg																					
オキサリプラチン点滴静注液	100mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																		
デキサート注射液	1.65mg																					
ブドウ糖液 5%	250ml																					
S-1	備考参照	内服	朝夕食後	day1夕～day15朝服用																		

備考：S-1 体表面積<1.25m² 80mg/日、1.25～1.5未満 100mg/日、1.5≤120mg/日

レジメン名	G-SOX(リザーバ)													更新日	2020/3/19								
														1クール	21日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	.	.	.	.	.	15	.	21											
生理食塩液	20mL	フラッシュ	フラッシュ	↓																			
ブドウ糖液 5%	500mL	中心静脈	メイン	↓																			
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液 ポララミン注	3mg/100mL 6.6mg 5mg	中心静脈	30分	↓																			
オキサリプラチン点滴静注液 ブドウ糖液 5%	100mg/m ² 250ml	中心静脈	2時間	↓																			
ヘパリンナトリウムロック用	100単位	ロック	ロック	↓																			
S-1	備考参照	内服	朝夕食後	day1夕～day15朝服用																			

備考：S-1 体表面積<1.25m² 80mg/日、1.25～1.5未満 100mg/日、1.5≤120mg/日

胃

レジメン名	GC:胃癌SOX+NIVO(末梢)													更新日	2022/5/11									
														1クール	21日間									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																				
				1	.	.	.	.	.	15	.	21												
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																				
オプジーボ点滴静注	360mg/body	点滴末梢	30分	↓																				
生理食塩液	100mL																							
ブドウ糖液 5 %	500mL	点滴末梢	メイン	↓																				
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL																							
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	30分	↓																				
ポララミン注	5mg																							
オキサリプラチン点滴静注液	130mg/㎡																							
デキサート注射液	1.65mg	点滴末梢	2時間	↓																				
ブドウ糖液 5 %	250ml																							
S-1	備考参照	内服	朝夕食後	day1夕～day15朝服用																				

備考：S-1 体表面積<1.25m² 80mg/日、1.25～1.5未満 100mg/日、1.5≤120mg/日

レジメン名	GC:胃癌SOX+NIVO(リザーバー)													更新日	2022/5/11									
														1クール	21日間									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																				
				1	.	.	.	.	.	15	.	21												
生理食塩液	20mL	フラッシュ	フラッシュ	↓																				
生理食塩液	100mL	中心静脈	メイン	↓																				
オプジーボ点滴静注	360mg/body	中心静脈	30分	↓																				
生理食塩液	100mL																							
ブドウ糖液 5 %	500mL	中心静脈	メイン	↓																				
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL																							
デキサート注射液	6.6mg	中心静脈	30分	↓																				
ポララミン注	5mg																							
オキサリプラチン点滴静注液	130mg/m ²	中心静脈	2時間	↓																				
ブドウ糖液 5 %	250ml																							
ヘパリンナトリウムロック用	100単位	ロック	ロック	↓																				
S-1	備考参照	内服	朝夕食後	day1夕～day15朝服用																				

備考：S-1 体表面積<1.25m² 80mg/日、1.25～1.5未満 100mg/日、1.5≤120mg/日

胃

レジメン名	術前G-SOX														更新日		2020/3/19					
															1クール		21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	.	.	.	.	.	15	.	21										
ブドウ糖液 5 %	500mL	点滴末梢	メイン	↓							15		21									
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																		
デキサート注射液	6.6mg																					
ポララミン注	5mg																					
オキサリプラチン点滴静注液	130mg/㎡	点滴末梢	2時間	↓																		
デキサート注射液	1.65mg																					
ブドウ糖液 5 %	250ml																					
S-1	備考参照	内服	朝夕食後	day1 夕～day15 朝服用																		

備考：S-1 体表面積<1.25m² 80mg/日、1.25～1.5未満 100mg/日、1.5≦120mg/日
術前 2～3 コースまで

胃

レジメン名	GC：RAM+nabPTX																更新日	2020/3/19			
																	1クール	28日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	8	・	15	・	28											
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		28											
グラニセトロン点滴静注バック [※]	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓													
デキサート注射液	6.6mg																				
サイラムザ点滴静注液	8mg/kg	点滴末梢	1時間	↓				↓													
生理食塩液	250ml																				
アブラキサン点滴静注用	100mg/m ²	点滴末梢	30分	↓		↓		↓													
生理食塩液	100ml																				

備考：サイラムザ投与日は前投薬として抗ヒスタミン剤を使用（経口薬も可）																						
レジメン名	GC；RAM+PTX療法																更新日	2020/3/19				
																	1クール	28日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	・	8	・	15	・	28												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓														
グラニセトロン点滴静注バック [®]	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓														
デキサート注射液	6.6mg																					
ガスター注射液	20mg																					
サイラムザ点滴静注液	8mg/kg	点滴末梢	1時間	↓				↓														
生理食塩液	250ml																					
パクリタキセル注	80mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓														
生理食塩液	250ml																					
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓														

備考：

胃

レジメン名	GC ; RAM単剤療法																	更新日	2020/3/19	
																		1クール	14日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	14														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
サイラムザ点滴静注液	8mg/kg	点滴末梢	1時間	↓																
生理食塩液	250ml																			

備考：サイラムザ投与日は前投薬として抗ヒスタミン剤を使用（経口薬も可）

レジメン名	GC : Weekly nabPTX																	更新日	2020/3/19	
																		1クール	28日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	15	・	28										
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓												
生理食塩液	100mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓												
デキサート注射液	6.6mg																			
アブラキサン点滴静注用	100mg/m ²	点滴末梢	30分	↓		↓		↓												
生理食塩液	100ml																			

備考：

胃

レジメン名	GC:胃癌XELOX（リザーバー）														更新日	2020/3/19					
															1クール	21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	.	.	.	.	15	.	21									
生理食塩液	20mL	フラッシュ	フラッシュ	↓																	
ブドウ糖液 5%	100mL	中心静脈	メイン	↓																	
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液 ポララミン注	3mg/100mL 6.6mg 5mg	中心静脈	30分	↓																	
オキサリプラチン点滴静注液 ブドウ糖液 5%	130mg/m ² 250ml	中心静脈	2時間	↓																	
ヘパリンナトリウムロック用	100単位	ロック	ロック	↓																	
カペシタビン	備考参照	内服	朝夕食後	day1夕～day15朝服用																	

備考：カペシタビン 1000mg/m²/回（2000mg/m²/日） 1日2回

レジメン名	GC:胃癌XELOX（末梢）														更新日	2020/3/19							
															1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	.	.	.	.	.	15	.	21											
ブドウ糖液 5%	250mL	点滴末梢	メイン	↓																			
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液 ポララミン注	3mg/100mL 6.6mg 5mg	点滴末梢	30分	↓																			
オキサリプラチン点滴静注液 デキサート注射液 ブドウ糖液 5%	130mg/m ² 1.65mg 250ml	点滴末梢	2時間	↓																			
カペシタビン	備考参照	内服	朝夕食後	day1夕～day15朝服用																			

備考：カペシタビン 1000mg/m²/回（2000mg/m²/日） 1日2回

胃

レジメン名	GC:胃癌CapeOX+NIVO（リザーバー）																更新日	2022/5/11	
																	1クール	21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	.	.	.	.	15	.	21							
生理食塩液	20mL	フラッシュ	フラッシュ	↓															
生理食塩液	100mL	中心静脈	メイン	↓															
オプジーボ点滴静注	360mg/body	中心静脈	30分	↓															
ブドウ糖液5％	500mL	中心静脈	メイン	↓															
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	中心静脈	30分	↓															
デキサート注射液	6.6mg																		
オキサリプラチン点滴静注液	130mg/m ²	中心静脈	2時間	↓															
ヘパリンナトリウムロック用	100単位	ロック	ロック	↓															
カペシタビン	備考参照	内服	朝夕食後	day1夕～day15朝服用															

備考：カペシタビン 1000mg/m²/回（2000mg/m²/日） 1日2回

レジメン名	GC:胃癌CapeOX+NIVO（末梢）													更新日	2022/5/11						
														1クール	21日間						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	.	.	.	.	15	.	21									
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																	
オプジーボ点滴静注	360mg/body	点滴末梢	30分	↓																	
生理食塩液	100mL																				
ブドウ糖液 5%	500mL	点滴末梢	メイン	↓																	
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL																				
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	30分	↓																	
ポララミン注	5mg																				
オキサリプラチン点滴静注液	130mg/m ²																				
デキサート注射液	1.65mg	点滴末梢	2時間	↓																	
ブドウ糖液 5%	250ml																				
カペシタビン	備考参照	内服	朝夕食後	day1夕～day15朝服用																	

備考：カペシタビン 1000mg/m²/回（2000mg/m²/日） 1日2回

胃

レジメン名	FOLFOX 6 胃癌（リザーバー）																更新日	2020/3/19			
																	1クール	14日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	14															
生理食塩液	20mL	フラッシュ	フラッシュ	↓																	
ブドウ糖液 5 %	100mL	中心静脈	メイン	↓																	
パロノセトロン点滴静注	0.75mg	中心静脈	15 分	↓																	
デキサート注射液	6.6mg																				
ポララミン注	5mg																				
レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	中心静脈	2時間	↓																	
ブドウ糖液 5 %	250ml																				
オキサリプラチン点滴静注液	85mg/m ²	中心静脈	2時間	↓																	
ブドウ糖液 5 %	250ml																				
フルオロウラシル注	400mg/m ²	中心静脈	15分	↓																	
生理食塩液	50ml																				
フルオロウラシル注	2400mg/m ²	中心静脈	46時間	↓																	
ヘパリンナトリウム注射液	5000単位																				
生理食塩液	適宜調整																				

備考：レボホリナートとオキサリプラチンは同時に開始。

胃

レジメン名	GC:mFOLFOX 6 +NIVO 胃癌（リザーバー）																更新日	2022/7/27	
																	1クール	14日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	14													
生理食塩液	20mL	フラッシュ	フラッシュ	↓															
生理食塩液	100mL	中心静脈	メイン	↓															
オプジーボ点滴静注	240mg/body	中心静脈	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		
ブドウ糖液 5 %	100mL	中心静脈	メイン	↓															
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL																		
デキサート注射液	6.6mg	中心静脈	15 分	↓															
ポララミン注	5mg																		
レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	中心静脈	2時間	↓															
ブドウ糖液 5 %	250ml																		
オキサリプラチン点滴静注液	85mg/m ²	中心静脈	2時間	↓															
ブドウ糖液 5 %	250ml																		
フルオロウラシル注	400mg/m ²	中心静脈	15分	↓															
生理食塩液	50ml																		
フルオロウラシル注	2400mg/m ²																		
ヘパリンナトリウム注射液	5000単位	中心静脈	46時間	↓															
生理食塩液	適宜調整																		

備考：レボホリナートとオキサリプラチンは同時に開始。

胃

レジメン名	TS-1+TXT(DOC)														更新日		2020/3/19						
															1クール		21日間						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	.	.	.	.	.	15	.	21											
ブドウ糖液 5 %	250mL	点滴末梢	メイン	↓							15		21										
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																			
ドセタキセル点滴静注 ブドウ糖液 5 %	40mg/m ² 250ml	点滴末梢	1時間	↓																			
S-1	備考参照	内服	朝夕食後	day1夕～day15朝服用																			

備考：S-1 体表面積<1.25m² 80mg/日、1.25～1.5未満 100mg/日、1.5≤120mg/日

胃

レジメン名	GC：Trastuzumab＋SP併用療法															更新日	2021/11/24				
																1クール	21日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	2	3	.	.	.	15	.	21									
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																	
ラクテック注	500ml	点滴末梢	メイン		↓	↓															
ソルデム 3 A 輸液	500ml	点滴末梢	1時間	↓																	
硫酸M g 補正液	8mEq																				
パロノセトロン点滴静注	0.75mg	点滴末梢	15 分	↓																	
デキサート注射液	9.9mg																				
生理食塩液	50ml	点滴末梢	15 分		↓	↓															
デキサート注射液	6.6mg																				
トラスツズマブBS点滴静注用	8mg/kg	点滴末梢	1時間30分(2回目以降30～45分)	↓																	
生理食塩液	(2回目以降6mg/kg) 250ml																				
20%マンニトール注射液	200ml	点滴末梢	30分	↓																	
シスプラチン点滴静注液	60mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																	
生理食塩液	500ml																				
ソルデム 3 A 輸液	500ml	点滴末梢		×2	×2	×2															
S-1	備考参照	内服	朝夕食後	day1夕～day15朝服用																	

備考：S-1 体表面積<1.25m² 80mg/日、1.25～1.5未満 100mg/日、1.5≦120mg/日

胃

レジメン名	GC：Trastuzumab＋XP併用療法															更新日	2021/11/24			
																1クール	21日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	3	.	.	.	15	.	21								
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
ラクテック注	500ml	点滴末梢	メイン		↓	↓														
ソルデム3 A 輸液	500ml	点滴末梢	1時間	↓																
硫酸M g 補正液	8mEq																			
パロノセトロン点滴静注	0.75mg	点滴末梢	15 分	↓																
デキサート注射液	9.9mg																			
生理食塩液	50ml	点滴末梢	15 分		↓	↓														
デキサート注射液	6.6mg																			
トラスツズマブBS点滴静注用	8mg/kg	点滴末梢	1時間30分(2回目以降30～45分)	↓																
生理食塩液	(2回目以降6mg/kg) 250ml																			
20%マンニトール注射液	200ml	点滴末梢	30分	↓																
シスプラチン点滴静注液	60mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																
生理食塩液	500ml																			
ソルデム3 A 輸液	500ml	点滴末梢		×2	×2	×2														
カペシタビン	備考参照	内服	朝夕食後	day1夕～day15朝服用																

備考：カペシタビン 1000mg/m²/回（2000mg/m²/日） 1日2回

胃

レジメン名	エンハーツ																更新日	2021/3/23	
																	1クール	21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	21													
ブドウ糖液 5 %	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg 9.9mg	点滴末梢	15分	↓															
エンハーツ点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液 5 %	6.4mg/kg 20mL 100ml	点滴末梢	30～90分	↓															

備考：

胃

レジメン名	XELOX＋Trastuzumab療法													更新日		2021/11/24						
														1クール		21日間						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	.	.	.	.	.	15	.	21										
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																		
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																		
デキサート注射液	6.6mg																					
ポララミン注	5mg																					
トラスツズマブBS点滴静注用生理食塩液	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg) 250ml	点滴末梢	1時間30分(2回目以降30～45分)	↓																		
ブドウ糖液 5%	250mL	点滴末梢	メイン	↓																		
オキサリプラチン点滴静注液	130mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																		
デキサート注射液	1.65mg																					
ブドウ糖液 5%	250ml																					
カペシタビン	備考参照	内服	朝夕食後	day1夕～day15朝服用																		

備考：カペシタビン 1000mg/m²/回（2000mg/m²/日） 1日2回

胃

レジメン名	SOX＋Trastuzumab療法															更新日		2023/2/21					
																1クール		21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	.	.	.	.	.	15	.	21											
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓							15		21										
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																			
デキサート注射液	6.6mg																						
ポララミン注	5mg																						
トラスツズマブBS点滴静注用 注射用水 生理食塩液	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg) 20mL 250ml	点滴末梢	1時間30分(2回目以降30～45分)	↓																			
ブドウ糖液 5 %	250mL	点滴末梢	メイン	↓																			
オキサリプラチン点滴静注液	130mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																			
デキサート注射液	1.65mg																						
ブドウ糖液 5 %	250ml																						
S-1	備考参照	内服	朝夕食後	day1夕～day15朝服用																			

備考：S-1 体表面積<1.25㎡ 80mg/日、1.25～1.5未満 100mg/日、1.5≤120mg/日

レジメン名	FOLFOX 6 胃癌（末梢）															更新日	2020/3/19		
																1クール	14日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	・	14												
ブドウ糖液 5 %	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓														
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液 ポララミン注	0.75mg 6.6mg 5mg	点滴末梢	15 分	↓															
レボホリナート点滴静注用 ブドウ糖液 5 %	200mg/m ² 250mL	点滴末梢	2時間	↓															
オキサリプラチン点滴静注液 デキサート注射液 ブドウ糖液 5 %	85mg/m ² 1.65mg 250ml	点滴末梢	2時間	↓															
フルオロウラシル注 生理食塩液	400mg/m ² 50ml	点滴末梢	15分	↓															
フルオロウラシル注 生理食塩液	1200mg/m ² 500mL	点滴末梢	23時間	↓	↓														

備考：レボホリナートとオキサリプラチンは同時に開始。

胃

レジメン名	GC:mFOLFOX 6 +NIVO 胃癌（末梢）																	更新日	2022/7/27	
																		1クール	14日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	・	14													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
オプジーボ点滴静注	240mg/body	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			
ブドウ糖液 5 %	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓															
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL																			
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15 分	↓																
ポララミン注	5mg																			
レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																
ブドウ糖液 5 %	250mL																			
オキサリプラチン点滴静注液	85mg/m ²																			
デキサート注射液	1.65mg	点滴末梢	2時間	↓																
ブドウ糖液 5 %	250ml																			
フルオロウラシル注	400mg/m ²	点滴末梢	15分	↓																
生理食塩液	50ml																			
フルオロウラシル注	1200mg/m ²	点滴末梢	23時間	↓	↓															
生理食塩液	500mL																			

備考：レボホリナートとオキサリプラチンは同時に開始。

胃

レジメン名	GC : NIVO (240mg/body:2週間毎)																更新日	2020/3/13		
																	1クール	14日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	14														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
オプジーボ点滴静注	240mg/body	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			

備考：

レジメン名	GC : NIVO (480mg/body:4週間毎)																更新日	2021/3/23		
																	1クール	28日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	28														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
オプジーボ点滴静注	480mg/body	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			

備考：