肝臓

レジメン名	RAM単剤	療法											更 1ク	新日 フーノ	リレ	202 1	22/5 4日	5/11 間
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	4		1 1				投 <i>⁵</i>	手 日							
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	\downarrow	•	14												+
	8mg/kg 250mL	占海末档	1時間 以上	↓														

備考:前投薬として抗ヒスタミン剤使用。初回60分、2回目以降30分に短縮可能。

レジメン名	BEV+At	ezo療法	L A								•	 夏新 E ク ー		20/1 21日	0/12 間
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	1	21				投 <i>⁵</i>	月 日					
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	\downarrow											
テセントリク点滴静注液 生理食塩液	1200mg 250mL	点滴末梢	30~60分	\downarrow											
アバスチン点滴静注用 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴末梢	30~90分	\downarrow											

備考:

肝臓

レジメン名	EPI30mg	TAE	Ħ								-	 新E 7 — ,	_	2023/2/ 7日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	1	7	I			投 <i>与</i>	月 日		1	1	I	$\overline{}$	\overline{T}	_
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	\downarrow													
エピルビシン塩酸塩	10mg	動脈注射 (肝動脈)	緩徐に	\downarrow													
エピルビシン塩酸塩	10mg	動脈注射 (肝動脈)	緩徐に	\downarrow													
エピルビシン塩酸塩	10mg	動脈注射 (肝動脈)	緩徐に	\downarrow													

備考:

レジメン名	EPI50mg	TAE	Ħ	<u>更新日</u> 1クール 投与日												3/2/ 日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	1		7		I					投与	₹日				$\overline{+}$	
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL		30分	\downarrow	-	/													
エピルビシン塩酸塩	10mg	動脈注射 (肝動脈)	緩徐に	\downarrow															
エピルビシン塩酸塩	10mg	動脈注射 (肝動脈)	緩徐に	\downarrow															
エピルビシン塩酸塩	10mg	動脈注射 (肝動脈)	緩徐に	\downarrow															
エピルビシン塩酸塩	10mg	動脈注射 (肝動脈)	緩徐に	\downarrow															
エピルビシン塩酸塩	10mg	動脈注射 (肝動脈)	緩徐に	\downarrow	·														

備考:

肝臓

レジメン名	アイ・エー・コ	-ル50 E	Pl30mg	ngTAE用(パロノセトロン使用) _限 l 投与日												<u>新日</u> 一ル	,	2/9/ 日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	1		7		I					投 <i>⁵</i>	∌日					$\overline{\top}$	T
パロノセトロン点滴静注	0.75mg	点滴末梢	15分	\downarrow																
動注用アイエーコール	50mg	動脈注射 (肝動脈)	緩徐に	\downarrow																
エピルビシン塩酸塩	10mg	動脈注射 (肝動脈)	緩徐に	\downarrow																
エピルビシン塩酸塩	10mg	動脈注射 (肝動脈)	緩徐に	\downarrow																
エピルビシン塩酸塩	10mg	動脈注射 (肝動脈)	緩徐に	\leftarrow																

備考:

レジメン名	アイエーコーノ	ν(65mg	/ m²)+E	-EPI30mgTAE 											-	 新 フー.		20		/9/27 I間	7
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	1		7							投 <i>⁵</i>	5 日			1		$\overline{}$	$\overline{\Gamma}$	
パロノセトロン点滴静注	0.75mg	点滴末梢	30分	\downarrow																	
動注用アイエーコール	65mg/m²	動脈注射 (肝動脈)	30分	\downarrow																	
エピルビシン塩酸塩	10mg	動脈注射 (肝動脈)	緩徐に	\downarrow																	
エピルビシン塩酸塩	10mg	動脈注射 (肝動脈)	緩徐に	\downarrow																	
エピルビシン塩酸塩	10mg	動脈注射 (肝動脈)	緩徐に	\downarrow		·				·	·										

備考: