

# 婦人科

レジメン名	TCweekly (7日間隔)				更新日															
					1クール	7日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	7														
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																
ガスター注射液	20mg																			
デキサート注射液	6.6mg																			
パクリタキセル注	80mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	1時間	↓																
ブドウ糖液5%	250mL																			
カルボプラチン注射液	AUC=2	点滴末梢	1時間	↓																
ブドウ糖液5%	250mL																			
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																

備考：

レジメン名	TCweekly(3週1休)				更新日															
					1クール	28日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	8	.	15	.	28										
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓												
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	30分	↓		↓		↓												
ガスター注射液	20mg																			
デキサート注射液	6.6mg																			
パクリタキセル注	75mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓												
ブドウ糖液5%	250mL																			
カルボプラチン注射液	AUC=2	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓												
ブドウ糖液5%	250mL																			
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓												

備考：

# 婦人科

レジメン名	BEV(3週毎)				更新日															
					1クール	21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
アバステン点滴静注用 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴末梢	30分	↓																

備考：

レジメン名	TC tri-weekly				更新日															
					1クール	21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 ガスター注射液 デキサート注射液	3mg/100mL 20mg 19.8mg	点滴末梢	30分	↓																
パクリタキセル注 ブドウ糖液5%	180mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	3時間	↓																
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																

備考：

# 婦人科

レジメン名	TC tri-weekly+BEV				投与日																			
					更新日		2020/3/18																	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	1	.	21																		
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																				
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																				
ガスター注射液	20mg	点滴末梢	30分	↓																				
デキサート注射液	19.8mg	点滴末梢	30分	↓																				
パクリタキセル注	180mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	3時間	↓																				
ブドウ糖液5%	500mL	点滴末梢	3時間	↓																				
カルボプラチン注射液	AUC=5	点滴末梢	1時間	↓																				
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	1時間	↓																				
アバチン点滴静注用	15mg/kg	点滴末梢	30~90分	↓																				
生理食塩液	100mL	点滴末梢	30~90分	↓																				
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																				

備考：

レジメン名	Triweekly TN				投与日																			
					更新日		2020/3/18																	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	1	.	21																		
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓																				
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																				
ガスター注射液	20mg	点滴末梢	30分	↓																				
デキサート注射液	19.8mg	点滴末梢	30分	↓																				
パクリタキセル注	180mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	3時間	↓																				
ブドウ糖液5%	500mL	点滴末梢	3時間	↓																				
アクブラ静注用	80mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	1時間	↓																				
生理食塩液	250mL	点滴末梢	1時間	↓																				
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																				

備考：

# 婦人科

レジメン名	TN+BEV				投与日														
					更新日		2020/3/18												
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	1	.	21													
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓															
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓															
ガスター注射液	20mg																		
デキサート注射液	19.8mg																		
パクリタキセル注	180mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	3時間	↓															
ブドウ糖液 5%	500mL																		
アクブラ静注用	60mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	1時間	↓															
生理食塩液	250mL																		
アバチン点滴静注用	15mg/kg	点滴末梢	30~90分	↓															
生理食塩液	100mL																		
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓															

備考：

レジメン名	GC+BEV				投与日														
					更新日		2020/3/18												
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	1	.	8	.	21											
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓															
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン			↓													
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓													
デキサート注射液	6.6mg																		
ゲムシタビン点滴静注用	1000mg/m <sup>2</sup>																		
ブドウ糖液 5%	100mL	点滴末梢	30分	↓		↓													
カルボプラチン注射液	AUC=4	点滴末梢	1時間	↓															
ブドウ糖液 5%	250mL																		
アバチン点滴静注用	15mg/kg	点滴末梢	30~90分	↓															
生理食塩液	100mL																		

備考：

# 婦人科

レジメン名	DC (75mg/m <sup>2</sup> )													更新日	2020/3/18									
														1クール	21日間									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																				
				1	・	21																		
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓																				
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																				
ドセタキセル点滴静注 生理食塩液	75mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	2時間	↓																				
カルボプラチン注射液 生理食塩液	AUC=5 500mL	点滴末梢	2時間	↓																				
ラクテック★D注	500mL	点滴末梢	2時間	↓																				

備考：

レジメン名	DC+BEV													更新日	2020/3/18									
														1クール	21日間									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																				
				1	・	21																		
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																				
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																				
ドセタキセル点滴静注 生理食塩液	60mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間	↓																				
カルボプラチン注射液 生理食塩液	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																				
アバスチン点滴静注用 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴末梢	30~90分	↓																				

備考：

# 婦人科

レジメン名	weekly DC													更新日	2020/3/18					
														1クール	7日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	7														
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	3mg/100mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																
ドセタキセル点滴静注 ブドウ糖液5%	30mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=2 250mL	点滴末梢	1時間	↓																

備考：

レジメン名	weekly TN													更新日	2020/3/18					
														1クール	7日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	7														
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 ガスター注射液 デキサート注射液	1mg/50mL 20mg 6.6mg	点滴末梢	15分	↓																
パクリタキセル注 ブドウ糖液5%	80mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
アクブラ静注用 ブドウ糖液5%	25mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																

備考：

# 婦人科

レジメン名	CPT-N													更新日						
														2020/3/18						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	28												
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓		↓														
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 生理食塩液	50mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	2時間	↓		↓														
アクブラ静注用 生理食塩液	60mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	2時間	↓																
ラクテック★D注	500mL	点滴末梢	2時間	↓		↓														

備考：

レジメン名	CPT-CDDP 20mg/m2 day1.8.15													更新日						
														2020/3/18						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	15	・	28										
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓												
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	3mg/100mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓		↓		↓												
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 生理食塩液	60mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	2時間	↓		↓		↓												
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	20mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	2時間	↓		↓		↓												
ラクテック★D注	500mL	点滴末梢	2時間	↓		↓		↓												

備考：

# 婦人科

レジメン名		weekly PTX+BEV												更新日									
														2020/3/18									
														1クール									
														21日間									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	・	8	・	15	・	21													
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓															
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	30分	↓		↓		↓															
ガスター注射液	20mg																						
デキサート注射液	6.6mg																						
パクリタキセル注	80mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓															
ブドウ糖液5%	250mL																						
アバチン点滴静注用	15mg/kg	点滴末梢	30~90分	↓																			
生理食塩液	100mL																						
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓															

備考：

レジメン名		PLD+BEV												更新日								
														2020/3/18								
														1クール								
														28日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	・	22	・	28														
ブドウ糖液5%	500mL	点滴末梢	メイン	↓																		
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																		
デキサート注射液	6.6mg																					
ドキシル注	40mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	1時間30分	↓																		
ブドウ糖液5%	250mL																					
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓																
アバチン点滴静注用	15mg/kg					↓		↓														
生理食塩液	100mL																					

備考：ドキシルは4週間毎、アバチンは3~4週間毎の投与となるようスケジュール調整する。



# 婦人科

レジメン名	PLD+BEV 入院用 (BEV4週毎)													更新日					
														1クール	29日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	・	29												
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
アバチン点滴静注用 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴末梢	30~90分	↓															
ブドウ糖液5%	500mL	点滴末梢	メイン		↓														
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分		↓														
ドキシル注 ブドウ糖液5%	40mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間30分		↓														

備考：本レジメンを連続適用する場合、適宜インターバル1日短縮する。

レジメン名	PLD+BEV 外来用 (BEV4週毎)													更新日					
														1クール	28日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	28													
ブドウ糖液5%	500mL	点滴末梢	メイン	↓															
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓															
ドキシル注 ブドウ糖液5%	40mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間30分	↓															
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
アバチン点滴静注用 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴末梢	30~90分	↓															

備考：ドキシル初回は入院用レジメンを使用する。

# 婦人科

レジメン名	PLD													更新日						
														2020/3/18						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	28														
ブドウ糖液 5%	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																
ドキシル注 ブドウ糖液 5%	50mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間30分	↓																

備考：

レジメン名	PLD-C													更新日						
														2020/3/18						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	28														
ブドウ糖液 5%	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																
ドキシル注 ブドウ糖液 5%	30mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液 5%	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																

備考：

# 婦人科

レジメン名	子宮肉腫GD													更新日						
														2020/3/18						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	21												
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	3mg/100mL 19.8mg	点滴末梢	30分			↓														
ゲムシタビン点滴静注用 ブドウ糖液5%	900mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓														
ドセタキセル点滴静注 ブドウ糖液5%	100mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間			↓														

備考：2クール目以降ゲムシタビンの溶解液がブドウ糖液5% 250mL、投与時間が1時間30分の場合もあり

レジメン名	GC													更新日						
														2020/3/18						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	21												
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓		↓														
ゲムシタビン点滴静注用 ブドウ糖液5%	1000mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓														
カルボプラチン注射液 生理食塩液	AUC=4 500mL	点滴末梢	1時間30分	↓																

備考：

# 婦人科

レジメン名	Gem単独													更新日					
														2020/3/18					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	8	・	15	・	28									
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓											
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓		↓		↓											
ゲムシタビン点滴静注用 ブドウ糖液5%	1000mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓		↓											

備考：

レジメン名	weekly CDDP40mg/m <sup>2</sup> (CCRT)													更新日					
														2020/3/18					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	3	・	7											
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓															
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	3mg/100mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓															
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	40mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間	↓															
ラクテック注	500mL	点滴末梢	2時間	×2	×2	↓													
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓													

備考：day2・3はデキサメタゾン内服

# 婦人科

レジメン名	Nogitecan1.25mg/m <sup>2</sup> day1~5+BEV														更新日	2020/3/18					
															1クール	21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	2	3	4	5	・	21											
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓	↓	↓													
生理食塩液 デキサート注射液	20mL 6.6mg	点滴末梢	ワンショット	↓	↓	↓	↓	↓													
ハイカムチン注射用 生理食塩液	1.25mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴末梢	30分	↓	↓	↓	↓	↓													
アバチン点滴静注用 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴末梢	30~90分	↓																	

備考：

レジメン名	weekly CDGP35mg/m <sup>2</sup> (CCRT)														更新日	2020/3/18					
															1クール	7日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	2	3	・	7													
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓																	
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	3mg/100mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																	
アクプラ静注用 生理食塩液	35mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴末梢	30分	↓																	
ラクテック注	500mL注	点滴末梢	2時間	×2	×2	↓															
ソルデム3 A輸液	500mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓															

備考： day2・3はデキサメタゾン内服

# 婦人科

レジメン名	AP													更新日	2020/3/18					
														1クール	21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	3	.	21												
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
アロキシ点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 19.8mg	点滴末梢	30分	↓																
ドキシソルピシン塩酸塩注射用 生理食塩液	60mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴末梢	30分	↓																
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	50mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	2時間	↓																
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	2時間	×3	×2	×2														
ソルデム3A輸液 ラシックス注	500mL 10mg	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓														

備考：

レジメン名	TP Tri-weekly+BEV													更新日	2020/3/18					
														1クール	21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	3	.	21												
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
アロキシ点滴静注 ガスター注射液 デキサート注射液	0.75mg/50mL 20mg 19.8mg	点滴末梢	15分	↓																
パクリタキセル注 生理食塩液	135mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	3時間	↓																
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	50mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	2時間	↓																
アバスチン点滴静注用 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴末梢	30~90分	↓																
ラクテック注	500mL	点滴末梢	2時間	×2	×2	↓														
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓														
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																

備考：

# 婦人科

レジメン名		卵巣癌・CPT11												更新日								
														1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	・	8	・	15	・	28												
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓														
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	3mg/100mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓		↓		↓														
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 生理食塩液	100mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	1時間30分	↓		↓		↓														

備考：

レジメン名		MTX 5days												更新日								
														1クール	14日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	3	4	5	・	14												
メソトレキセート〔注射用〕 注射用水（溶解用）	0.4mg/kg	筋肉注射	—	↓	↓	↓	↓	↓														

備考：

レジメン名		ACT-D pulse												更新日								
														1クール	14日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	・	14																
生理食塩液	50mL	点滴末梢	メイン	↓																		
コスメゲン静注 注射用水（溶解用） 生理食塩液	1.25mg/m <sup>2</sup> 20mL	点滴末梢	ワンショット	↓																		

備考：

# 婦人科

レジメン名	子宮頸癌・CPT11											更新日								
												2021/3/18								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	15	・	22	・	42								
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓										
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	3mg/100mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓		↓		↓		↓										
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 生理食塩液	100mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	1時間30分	↓		↓		↓		↓										

備考：

レジメン名	子宮頸癌 TC tri-weekly+BEV											更新日								
												2021/3/18								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 ガスター注射液 デキサート注射液	3mg/100mL 20mg 19.8mg	点滴末梢	30分	↓																
パクリタキセル注 ブドウ糖液5%	175mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	3時間	↓																
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
アバスチン点滴静注用 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴末梢	30~90分	↓																
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																

備考：



# 婦人科

レジメン名	TIP療法													更新日	2021/11/3												
														1クール	21日間												
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																							
				1	2	3	4	5	・	21																	
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓	↓	↓																			
グラニセトロン点滴静注 ガスター注射液 デキサート注射液	3mg/100mL 20mg 19.8mg	点滴末梢	30分	↓																							
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	3mg/100mL 3.3mg	点滴末梢	30分		↓	↓	↓	↓																			
パクリタキセル注 ブドウ糖液5%	175mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	3時間	↓																							
注射用イホマイド 生理食塩液	1g/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓	↓	↓																			
ウロミテキサン注 生理食塩液	200mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴末梢	30分	↓	↓	↓	↓	↓																			
20%マンニトール注射液	200ml	点滴末梢	30分	↓	↓	↓	↓	↓																			
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	20mg/m <sup>2</sup> 500ml	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓	↓	↓																			
ウロミテキサン注 生理食塩液	200mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴末梢	30分	↓	↓	↓	↓	↓																			
ウロミテキサン注 生理食塩液	200mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴末梢	30分	↓	↓	↓	↓	↓																			
ラクテックD輸液	500mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓	↓	↓																			
ラクテックD輸液	500mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓	↓	↓																			
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																							

備考：アプレピタントカプセル (day1-3)