

婦人科

レジメン名	TCweekly（7日間隔）																	更新日	2020/3/18		
																		1クール	7日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	7															
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓			7														
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL																				
ガスター注射液	20mg	点滴末梢	30分	↓																	
デキサート注射液	6.6mg																				
パクリタキセル注	80mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓																	
ブドウ糖液5%	250mL																				
カルボプラチン注射液	AUC=2	点滴末梢	1時間	↓																	
ブドウ糖液5%	250mL																				
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																	

備考：

レジメン名	TCweekly(3週1休)																更新日	2020/3/18			
																	1クール	28日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	8	・	15	・	28											
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓													
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL																				
ガスター注射液	20mg	点滴末梢	30分	↓		↓		↓													
デキサート注射液	6.6mg																				
パクリタキセル注	75mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓													
ブドウ糖液5%	250mL																				
カルボプラチン注射液	AUC=2	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓													
ブドウ糖液5%	250mL																				
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓													

備考：

婦人科

レジメン名		BEV(3 週毎)																更新日	2020/3/18
																		1クール	21日間
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
アバステン点滴静注用	15mg/kg	点滴末梢	30～90分	↓															
生理食塩液	100mL																		

備考：

レジメン名		Pembro+BEV(3 週毎)																更新日	2023/2/21
																		1クール	21日間
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		
アバステン点滴静注用	15mg/kg	点滴末梢	30～90分	↓															
生理食塩液	100mL																		

備考：

レジメン名		Pembro(3 週毎)																更新日	2023/2/21
																		1クール	21日間
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		

備考：

婦人科

レジメン名	PAOLA(BEV+Olaparib)																	更新日	2023/2/21	
																		1クール	21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
アバチン点滴静注用	15mg/kg	点滴末梢	30～90分	↓																
生理食塩液	100mL																			

備考：リムパーザ 300mg/回（600mg/日） 1日2回

レジメン名	TC tri-weekly																	更新日	2020/3/18		
																		1クール	21日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	21															
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓																	
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																	
ガスター注射液	20mg																				
デキサート注射液	19.8mg																				
パクリタキセル注	180mg/m ²	点滴末梢	3時間	↓																	
ブドウ糖液5%	500mL																				
カルボプラチン注射液	AUC=5	点滴末梢	1時間	↓																	
ブドウ糖液5%	250mL																				
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																	

備考：

婦人科

レジメン名	TC tri-weekly+BEV																	更新日	2020/3/18			
																		1クール	21日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	.	21																
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																		
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																		
ガスター注射液	20mg																					
デキサート注射液	19.8mg																					
パクリタキセル注	180mg/m ²	点滴末梢	3時間	↓																		
ブドウ糖液5%	500mL																					
カルボプラチン注射液	AUC=5	点滴末梢	1時間	↓																		
ブドウ糖液5%	250mL																					
アバチン点滴静注用	15mg/kg	点滴末梢	30～90分	↓																		
生理食塩液	100mL																					
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																		

備考：

レジメン名	TC tri-weekly+Pembro+BEV																	更新日	2023/2/21		
																		1クール	21日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	21															
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																	
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓																	
生理食塩液	100mL																				
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																	
ガスター注射液	20mg	点滴末梢	30分	↓																	
デキサート注射液	19.8mg																				
パクリタキセル注	175mg/m ²	点滴末梢	3時間	↓																	
生理食塩液	500mL																				
カルボプラチン注射液	AUC=5	点滴末梢	1時間	↓																	
生理食塩液	250mL																				
アバスチン点滴静注用	15mg/kg	点滴末梢	30～90分	↓																	
生理食塩液	100mL																				
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																	

備考：

婦人科

レジメン名	TC tri-weekly+Pembro																	更新日	2023/2/21			
																		1クール	21日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	.	21																
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																		
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓																		
生理食塩液	100mL																					
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																		
ガスター注射液	20mg																					
デキサート注射液	19.8mg																					
パクリタキセル注	175mg/m ²	点滴末梢	3時間	↓																		
生理食塩液	500mL																					
カルボプラチン注射液	AUC=5	点滴末梢	1時間	↓																		
生理食塩液	250mL																					
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																		

備考：

レジメン名	Triweekly TN																	更新日	2020/3/18			
																		1クール	21日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	.	21																
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓																		
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																		
ガスター注射液	20mg																					
デキサート注射液	19.8mg																					
パクリタキセル注	180mg/m ²	点滴末梢	3時間	↓																		
ブドウ糖液5%	500mL																					
アクブラ静注用	80mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓																		
生理食塩液	250mL																					
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																		

備考：

婦人科

レジメン名	TN+BEV																	更新日	2020/3/18				
																		1クール	21日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	.	21																	
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																			
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																			
ガスター注射液	20mg																						
デキサート注射液	19.8mg																						
パクリタキセル注	180mg/m ²	点滴末梢	3時間	↓																			
ブドウ糖液5%	500mL																						
アクブラ静注用	60mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓																			
生理食塩液	250mL																						
アバスチン点滴静注用	15mg/kg	点滴末梢	30～90分	↓																			
生理食塩液	100mL																						
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																			

備考：

レジメン名	GC+BEV																	更新日	2020/3/18	
																		1クール	21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	8	.	21												
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン			↓														
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓														
デキサート注射液	6.6mg																			
ゲムシタビン点滴静注用	1000mg/m ²	点滴末梢	30分	↓		↓														
ブドウ糖液 5 %	100mL																			
カルボプラチン注射液	AUC=4	点滴末梢	1時間	↓																
ブドウ糖液 5 %	250mL																			
アバスチン点滴静注用	15mg/kg	点滴末梢	30～90分	↓																
生理食塩液	100mL																			

備考：

婦人科

レジメン名	DC (75mg/m ²)																	更新日	2022/9/27	
																		1クール	21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓			21													
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																
ドセタキセル点滴静注 生理食塩液	75mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
カルボプラチン注射液 生理食塩液	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
ラクテック★D注	500mL	点滴末梢	2時間	↓																

備考：

レジメン名	DC+BEV																	更新日	2020/3/18	
																		1クール	21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓			21													
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																
ドセタキセル点滴静注 生理食塩液	60mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
カルボプラチン注射液 生理食塩液	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
アバスチン点滴静注用 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴末梢	30～90分	↓																

備考：

婦人科

レジメン名	weekly DC																	更新日	2020/3/18	
																		1クール	7日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	7														
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢																		
ドセタキセル点滴静注	30mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓																
ブドウ糖液5%	250mL																			
カルボプラチン注射液	AUC=2	点滴末梢	1時間	↓																
ブドウ糖液5%	250mL																			

備考：

レジメン名	weekly TN																	更新日	2020/3/18		
																		1クール	7日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	7															
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓																	
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																	
ガスター注射液	20mg																				
デキサート注射液	6.6mg																				
パクリタキセル注	80mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓																	
ブドウ糖液5%	250mL																				
アクブラ静注用	25mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓																	
ブドウ糖液5%	250mL																				
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																	

備考：

婦人科

レジメン名	CPT-N																		更新日	2020/3/18	
																			1クール	28日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	8	.	28													
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓															
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	30分	↓		↓															
デキサート注射液	6.6mg																				
イリノテカン塩酸塩点滴静注液	50mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓		↓															
生理食塩液	500mL																				
アクブラ静注用	60mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																	
生理食塩液	500mL																				
ラクテック★D注	500mL	点滴末梢	2時間	↓		↓															

備考：

レジメン名	CPT-CDDP 20mg/m2 day1.8.15																		更新日	2020/3/18	
																			1クール	28日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	8	.	15	.	28											
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓													
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	3mg/100mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓		↓		↓													
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 生理食塩液	60mg/m ² 500mL	点滴末梢	2時間	↓		↓		↓													
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	20mg/m ² 500mL	点滴末梢	2時間	↓		↓		↓													
ラクテック★D注	500mL	点滴末梢	2時間	↓		↓		↓													

備考：

婦人科

レジメン名		weekly PTX+BEV																更新日	2020/3/18
																		1クール	21日間
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	8	・	15	・	21									
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓											
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL																		
ガスター注射液	20mg	点滴末梢	30分	↓		↓		↓											
デキサート注射液	6.6mg																		
パクリタキセル注	80mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓											
ブドウ糖液5%	250mL																		
アバチン点滴静注用	15mg/kg	点滴末梢	30～90分	↓															
生理食塩液	100mL																		
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓											

備考：

レジメン名		PLD+BEV																更新日	2020/3/18
																		1クール	28日間
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	22	・	28											
ブドウ糖液5%	500mL	点滴末梢	メイン	↓															
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL																		
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	30分	↓															
ドキシル注	40mg/m ²	点滴末梢	1時間30分	↓															
ブドウ糖液5%	250mL																		
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓													
アバチン点滴静注用	15mg/kg	点滴末梢	30～90分	↓		↓													
生理食塩液	100mL																		

備考：ドキシルは4週間毎、アバチンは3～4週間毎の投与となるようスケジュール調整する。

婦人科

レジメン名	PLD+BEV 入院用 (BEV4週毎)																	更新日	2020/10/2		
																		1クール	29日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	2	・	29														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																	
アバチン点滴静注用	15mg/kg	点滴末梢	30～90分	↓																	
生理食塩液	100mL	点滴末梢																			
ブドウ糖液 5 %	500mL	点滴末梢	メイン		↓																
グラニセロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	30分		↓																
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢																			
ドキシル注	40mg/m ²	点滴末梢	1時間30分		↓																
ブドウ糖液 5 %	250mL	点滴末梢																			

備考：本レジメンを連続適用する場合、適宜インターバル1日短縮する。

レジメン名	PLD+BEV 外来用 (BEV4週毎)																	更新日	2020/10/2		
																		1クール	28日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	28															
ブドウ糖液 5 %	500mL	点滴末梢	メイン	↓			28														
グラニセロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																	
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢																			
ドキシル注	40mg/m ²	点滴末梢	1時間30分	↓																	
ブドウ糖液 5 %	250mL	点滴末梢																			
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																	
アバチン点滴静注用	15mg/kg	点滴末梢	30～90分	↓																	
生理食塩液	100mL	点滴末梢																			

備考：ドキシル初回は入院用レジメンを使用する。

婦人科

レジメン名	PLD																			更新日	2020/3/18	
																				1クール	28日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	.	28																
ブドウ糖液 5 %	500mL	点滴末梢	メイン	↓																		
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																		
ドキシル注 ブドウ糖液 5 %	50mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間30分	↓																		

備考：

レジメン名	PLD-C																			更新日	2020/3/18	
																				1クール	28日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	.	28																
ブドウ糖液 5 %	500mL	点滴末梢	メイン	↓			28															
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																		
ドキシル注 ブドウ糖液 5 %	30mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓																		
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液 5 %	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																		

備考：

婦人科

レジメン名	子宮肉腫GD																	更新日	2020/3/18	
																		1クール	21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	8	.	21												
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		21												
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	3mg/100mL 19.8mg	点滴末梢	30分			↓														
ゲムシタビン点滴静注用 ブドウ糖液5%	900mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓														
ドセタキセル点滴静注 ブドウ糖液5%	100mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間			↓														

備考：2クール目以降ゲムシタビンの溶解液がブドウ糖液5% 250mL、投与時間が1時間30分の場合もあり

レジメン名	GC																	更新日	2020/3/18	
																		1クール	21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	8	.	21												
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		21												
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓		↓														
ゲムシタビン点滴静注用 ブドウ糖液5%	1000mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓														
カルボプラチン注射液 生理食塩液	AUC=4 500mL	点滴末梢	1時間30分	↓																

備考：

婦人科

レジメン名	Gem単独																	更新日	2020/3/18	
																		1クール	28日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	15	・	28										
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓												
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓		↓		↓												
ゲムシタビン点滴静注用 ブドウ糖液 5 %	1000mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓		↓												

備考：

レジメン名	weekly CDDP40mg/m ² (CCRT)																	更新日	2020/3/18	
																		1クール	7日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	3	・	7												
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	3mg/100mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	40mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
ラクテック注	500mL	点滴末梢	2時間	×2	×2	↓														
ソルデム 3 A 輸液	500mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓														

備考：day2・3はデキサメタゾン内服

婦人科

レジメン名		Nogitecan1.25mg/m ² day1~5+BEV																更新日	2020/3/18
																		1クール	21日間
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	3	4	5	.	21									
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓	↓	↓											
生理食塩液	20mL	点滴末梢	ワンショット	↓	↓	↓	↓	↓											
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	ワンショット	↓	↓	↓	↓	↓											
ハイカムチン注射用	1.25mg/m ²	点滴末梢	30分	↓	↓	↓	↓	↓											
生理食塩液	100mL	点滴末梢	30分	↓	↓	↓	↓	↓											
アバスチン点滴静注用	15mg/kg	点滴末梢	30~90分	↓															
生理食塩液	100mL	点滴末梢	30~90分	↓															

備考：

レジメン名		weekly CDGP35mg/m ² (CCRT)																更新日	2020/3/18
																		1クール	7日間
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	3	.	7											
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓															
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓															
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	30分	↓															
アクブラ静注用	35mg/m ²	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL	点滴末梢	30分	↓															
ラクテック注	500mL	点滴末梢	2時間	×2	×2	↓													
ソルデム3 A輸液	500mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓													

備考：day2・3はデキサメタゾン内服

婦人科

レジメン名	AP																	更新日	2022/9/27	
																		1クール	21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	3	・	21												
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 19.8mg	点滴末梢	30分	↓																
ドキソルビシン塩酸塩注射用 生理食塩液	60mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓																
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	50mg/m ² 500mL	点滴末梢	2時間	↓																
ソルデム 3 A 輸液	500mL	点滴末梢	2時間	× 3	× 2	× 2														
ソルデム 3 A 輸液 ラシックス注	500mL 10mg	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓														

備考：

レジメン名	TP Tri-weekly+BEV																	更新日	2022/9/27	
																		1クール	21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	3	・	21												
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																
ガスター注射液	20mg																			
デキサート注射液	19.8mg																			
パクリタキセル注	135mg/m ²	点滴末梢	3時間	↓																
生理食塩液	500mL																			
シスプラチン点滴静注液	50mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																
生理食塩液	500mL																			
アバスチン点滴静注用	15mg/kg	点滴末梢	30～90分	↓																
生理食塩液	100mL																			
ラクテック注	500mL	点滴末梢	2時間	×2	×2	↓														
ソルデム 3 A 輸液	500mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓														
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																

備考：

婦人科

[illegible]

備考：

婦人科

レジメン名	TP Tri-weekly+Pembro+BEV																	更新日	2023/2/21			
																		1クール	21日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	.	21																
生理食塩液	2000mL	点滴末梢	メイン	↓																		
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓																		
生理食塩液	100mL																					
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																		
アロカリス点滴静注	235mg																					
ガスター注射液	20mg																					
デキサート注射液	19.8mg																					
パクリタキセル注	175mg/m ²	点滴末梢	3時間	↓																		
生理食塩液	500mL																					
硫酸Mg補正液	8mEq	点滴末梢	30分	↓																		
生理食塩液	100mL																					
シスプラチン点滴静注液	50mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																		
生理食塩液	500mL																					
アバスチン点滴静注用	15mg/kg	点滴末梢	30～90分	↓																		
生理食塩液	100mL																					
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																		

備考：

レジメン名	卵巣癌・CPT11																	更新日	##	
																		1クール	28日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	8	.	15	.	28										
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓												
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓		↓		↓												
デキサート注射液	6.6mg																			
イリノテカン塩酸塩点滴静注液	100mg/m ²	点滴末梢	1時間30分	↓		↓		↓												
生理食塩液	500mL																			

備考：

婦人科

レジメン名	MTX 5days																	更新日	2020/10/1		
																		1クール	14日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	2	3	4	5	・	14											
メソトレキセート〔注射用〕 注射用水（溶解用）	0.4mg/kg	筋肉注射	—	↓	↓	↓	↓	↓													

備考：

レジメン名	ACT-D pulse																	更新日	2020/10/1	
																		1クール	14日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	14														
生理食塩液	50mL	点滴末梢	メイン	↓																
コスメゲン静注	1.25mg/m ²	点滴末梢	ワンショット	↓																
注射用水（溶解用）																				
生理食塩液	20mL																			

備考：

レジメン名	子宮頸癌・CPT11																	更新日	2021/3/18	
																		1クール	42日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	15	・	22	・	42								
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓										
グラニセロン点滴静注 デキサート注射液	3mg/100mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓		↓		↓		↓										
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 生理食塩液	100mg/m ² 500mL	点滴末梢	1時間30分	↓		↓		↓		↓										

備考：

婦人科

レジメン名	子宮頸癌 TC tri-weekly+BEV																	更新日	2021/3/18	
																		1クール	21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																
ガスター注射液	20mg																			
デキサート注射液	19.8mg																			
パクリタキセル注	175mg/m ²	点滴末梢	3時間	↓																
ブドウ糖液5%	500mL																			
カルボプラチン注射液	AUC=5	点滴末梢	1時間	↓																
ブドウ糖液5%	250mL																			
アバスチン点滴静注用	15mg/kg	点滴末梢	30～90分	↓																
生理食塩液	100mL																			
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																

備考：

婦人科

レジメン名	TIP療法																			更新日	2021/11/3	
																				1クール	21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	3	4	5	・	21												
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓	↓	↓														
グラニセロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																		
ガスター注射液	20mg																					
デキサート注射液	19.8mg																					
グラニセロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分		↓	↓	↓	↓														
デキサート注射液	3.3mg																					
パクリタキセル注	175mg/m ²	点滴末梢	3時間	↓																		
ブドウ糖液5%	500mL																					
注射用イホマイド	1g/m ²	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓	↓	↓														
生理食塩液	500mL																					
ウロミテキサン注	200mg/m ²	点滴末梢	30分	↓	↓	↓	↓	↓														
生理食塩液	100mL																					
20%マンニトール注射液	200ml	点滴末梢	30分	↓	↓	↓	↓	↓														
シスプラチン点滴静注液	20mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓	↓	↓														
生理食塩液	500ml																					
ウロミテキサン注	200mg/m ²	点滴末梢	30分	↓	↓	↓	↓	↓														
生理食塩液	100mL																					
ウロミテキサン注	200mg/m ²	点滴末梢	30分	↓	↓	↓	↓	↓														
生理食塩液	100mL																					
ラクテックD輸液	500mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓	↓	↓														
ラクテックD輸液	500mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓	↓	↓														
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																		

備考：アプレピタントカプセル（day1-3）

婦人科

レジメン名	Gyn:LEAP																	更新日	2021/3/20	
																		1クール	21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
キイトルーダ点滴静注	200mg/body	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			
レンビマカプセル	20mg	内服	1日1回	連日内服																

備考：