

# 乳腺

レジメン名	MMK : AC(60, 600)			更新日																
				1クール	2022/9/27 21日間															
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg 9.9mg	点滴末梢	15分	↓																
ドキシルビシン塩酸塩注 生理食塩液	60mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴末梢	30分	↓																
注射用エンドキサン 生理食塩液	600mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間	↓																

備考：アプレピタントカプセル (day1-3)

レジメン名	MMK : AC(60, 600) (アロカリス)			更新日																
				1クール	2022/9/27 21日間															
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
パロノセトロン点滴静注 アロカリス点滴静注 デキサート注射液	0.75mg 235mg 9.9mg	点滴末梢	30分	↓																
ドキシルビシン塩酸塩注 生理食塩液	60mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴末梢	30分	↓																
注射用エンドキサン 生理食塩液	600mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間	↓																

備考：

# 乳腺

レジメン名	MMK : ddAC (ジーラスタ併用)				更新日															
					1クール	2022/9/27	14日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	14														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg 9.9mg	点滴末梢	15分	↓																
ドキシルピシン塩酸塩注 生理食塩液	60mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴末梢	30分	↓																
注射用エンドキサン 生理食塩液	600mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間	↓																

備考：day2～4の間でジーラスタ3.6mg皮下注、アプレピタントカプセル (day1-3)

レジメン名	MMK : ddAC (ジーラスタ併用・アロカリス使用)				更新日															
					1クール	2022/9/27	14日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	14														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
パロノセトロン点滴静注 アロカリス点滴静注 デキサート注射液	0.75mg 235mg 9.9mg	点滴末梢	30分	↓																
ドキシルピシン塩酸塩注 生理食塩液	60mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴末梢	30分	↓																
注射用エンドキサン 生理食塩液	600mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間	↓																

備考：day2～4の間でジーラスタ3.6mg皮下注

# 乳腺

レジメン名	MMK : TC(75, 600)				更新日		2020/3/18													
					1クール		21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	3mg/100mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓																
ドセタキセル点滴静注 生理食塩液	75mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
注射用エンドキサン 生理食塩液	600mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間	↓																

備考：

レジメン名	MMK : ddPTX (ジーラスト併用) (術後)				更新日		2020/3/18													
					1クール		14日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	14														
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液 ガスター注射液	1mg/50mL 16.5mg 20mg	点滴末梢	15分	↓																
パクリタキセル注 ブドウ糖液5%	175mg/m <sup>2</sup> 250ml	点滴末梢	3時間	↓																
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓																

備考：day2~4の間でジーラスト3.6mg皮下注

# 乳腺

レジメン名	MMK：ドセタキセル+パージェタ+トラスツズマブ													更新日	2021/11/24						
														1クール	21日間						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	21															
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																	
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓																	
パージェタ点滴静注 生理食塩液	840mg (2回目以降 420mg) 250mL	点滴末梢	1時間 (2回目以降 30分)	↓																	
トラスツズマブBS点滴静注用 生理食塩液	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg) 250mL	点滴末梢	1時間30分 (2回目以降 30~ 45分)	↓																	
ドセタキセル点滴静注 ブドウ糖液5%	70MG/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	1時間30分	↓																	

備考：

レジメン名	MMK：パージェタ+トラスツズマブ													更新日	2021/11/24						
														1クール	21日間						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	21															
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																	
パージェタ点滴静注 生理食塩液	840mg (2回目以降 420mg) 250mL	点滴末梢	1時間 (2回目以降 30分)	↓																	
トラスツズマブBS点滴静注用 生理食塩液	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg) 250mL	点滴末梢	1時間30分 (2回目以降 30~ 45分)	↓																	

備考：

# 乳腺

レジメン名	MMK：トラスツズマブ				更新日	2021/11/24													
					1クール	21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
トラスツズマブBS点滴静注用生理食塩液	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg) 250mL	点滴末梢	1時間30分 (2回目以降 30~45分)	↓															

備考：

レジメン名	MMK：パクリタキセル+パージェタ+トラスツズマブ				更新日	2021/11/24													
					1クール	21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	8	.	15	.	21									
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓															
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	メイン			↓		↓											
グラニセトロン点滴静注 ガスター注射液 デキサート注射液	1mg/50mL 20mg 備考参照	点滴末梢	15分	↓		↓		↓											
パージェタ点滴静注 生理食塩液	840mg (2回目以降 420mg) 250mL	点滴末梢	1時間 (2回目以降 30分)	↓															
トラスツズマブBS点滴静注用生理食塩液	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg) 250mL	点滴末梢	1時間30分 (2回目以降 30~45分)	↓															
パクリタキセル注 ブドウ糖液5%	80mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓											
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓											

備考：デキサート注射液はパクリタキセル投与1・2回目6.6mg 3回目3.3mg 4回目以降1.65mg

# 乳腺

レジメン名	MMK：パクリ（80）＋トラスツズマブ			更新日	2021/11/24													
				1クール	7日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日														
				1	.	7												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓														
グラニセトロン点滴静注 ガスター注射液 デキサート注射液	1mg/50mL 20mg 備考参照	点滴末梢	15分	↓														
トラスツズマブBS点滴静注用 生理食塩液	4mg/kg (2回目以降 2mg/kg) 250mL	点滴末梢	1時間30分 (2回目以降30～ 45分)	↓														
パクリタキセル注 ブドウ糖液5%	80mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間	↓														
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓														

備考：デキサート注射液はパクリタキセル投与1・2回目6.6mg 3回目3.3mg 4回目以降1.65mg

レジメン名	MMK：PAC（80）weekly			更新日	2020/3/17													
				1クール	7日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日														
				1	.	7												
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	メイン	↓														
グラニセトロン点滴静注 ガスター注射液 デキサート注射液	1mg/50mL 20mg 備考参照	点滴末梢	15分	↓														
パクリタキセル注 ブドウ糖液5%	80mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間	↓														
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓														

備考：デキサート注射液はパクリタキセル投与1・2回目6.6mg 3回目3.3mg 4回目以降1.65mg

# 乳腺

レジメン名	MMK：W-PAC+BV療法													更新日	2020/3/17				
														1クール	28日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	8	・	15	・	28									
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓											
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓											
ガスター注射液	20mg																		
デキサート注射液	備考参照																		
パクリタキセル注	90mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓											
ブドウ糖液5%	250mL																		
アバチン点滴静注用	10mg/kg	点滴末梢	30~90分	↓				↓											
生理食塩液	100mL																		
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓											

備考：デキサート注射液はパクリタキセル投与1・2回目6.6mg 3回目3.3mg 4回目以降1.65mg

レジメン名	MMK：カドサイラ													更新日	2020/3/18				
														1クール	21日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
カドサイラ点滴静注用	3.6mg/kg	点滴末梢	30~90分	↓															
生理食塩液	250mL																		

備考：

# 乳腺

レジメン名	MMK：アテゾリス <sup>マブ</sup> +ナブ <sup>パ</sup> クリタキセル											更新日	2020/3/19						
												1クール	28日間						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	8	・	15	・	28									
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓											
テセントリク点滴静注 生理食塩液	840mg 250mL	点滴末梢	30～60分	↓				↓											
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓											
アブラキサン点滴静注用 生理食塩液	100mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓		↓											

備考：



# 乳腺

レジメン名	MMK：エリブリン				更新日															
					1クール	2020/3/18	21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	21												
生理食塩液	50mL	点滴末梢	メイン	↓			↓													
生理食塩液 デキサート注射液	50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓			↓													
ハラヴェン静注 生理食塩液	1.4mg/m <sup>2</sup> 50mL	点滴末梢	5分	↓			↓													

備考：

レジメン名	MMK：エリブリン（1投1休）				更新日															
					1クール	2020/3/18	14日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	14														
生理食塩液	50mL	点滴末梢	メイン	↓																
生理食塩液 デキサート注射液	50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓																
ハラヴェン静注 生理食塩液	1.4MG/m <sup>2</sup> 50mL	点滴末梢	5分	↓																

備考：

# 乳腺

レジメン名	MMK：ビノレルビン 2投1休				更新日	2021/11/24													
					1クール	21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	8	・	21											
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓													
ロゼウス静注液	25MG/m <sup>2</sup>	点滴末梢	全開	↓		↓													
生理食塩液	50mL																		

備考：

レジメン名	MMK：ビノレルビン 1投1休				更新日	2021/11/24													
					1クール	14日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	14													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
ロゼウス静注液	25MG/m <sup>2</sup>	点滴末梢	全開	↓															
生理食塩液	50mL																		

備考：

# 乳腺

レジメン名	MMK : CMF (内服)				更新日															
					1クール	28日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	8	14	28													
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓		↓														
メソトレキセート 生理食塩液	40mg/m <sup>2</sup> 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓														
フルオロウラシル注 生理食塩液	600mg/m <sup>2</sup> 50mL	点滴末梢	20分	↓		↓														
エンドキサン錠	100mg	内服		day1-14内服																

備考：

レジメン名	MMK : CMF (注射)				更新日															
					1クール	28日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	8	28														
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓		↓														
メソトレキセート 生理食塩液	40mg/m <sup>2</sup> 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓														
注射用エンドキサン 生理食塩液	600mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間	↓		↓														
フルオロウラシル注 生理食塩液	600mg/m <sup>2</sup> 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓														

備考：

# 乳腺

レジメン名	MMK：エンハーツ				更新日	2022/9/27													
					1クール	21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	21													
ブドウ糖液 5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg 9.9mg	点滴末梢	15分	↓															
エンハーツ点滴静注 注射用水（溶解用） ブドウ糖液 5%	5.4mg/kg  100mL	点滴末梢	初回：90分 2回目以降 ：30分	↓															

備考：

# 乳腺

レジメン名	MMK CBDCA+GEM+Pembro														更新日	2021/11/24			
															1クール	21日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	8	・	21											
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓													
キイトルーダ点滴静注 生理食塩液	200mg 100mL	点滴末梢	30分	↓															
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓		↓													
ゲムシタビン点滴静注用 ブドウ糖液5%	1000mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓													
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=2 250mL	点滴末梢	1時間	↓		↓													

備考：

# 乳腺

レジメン名	MMK nab PTX+Pembro													更新日	2021/11/24						
														1クール	84日間						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	8	・	15	・	22	・	29	・	36	・	43	・	50	・	57	・
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓										↓						↓	
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン			↓		↓		↓		↓		↓					↓		
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓						↓											↓
生理食塩液	100mL														↓						
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓				↓		↓					↓		↓
アブラキサン点滴静注用	100mg/m <sup>2</sup>																				
生理食塩液	100mL		30分	↓		↓		↓				↓		↓					↓		↓

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				71	・	84															
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン																		
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																	
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分																		
生理食塩液	100mL																				
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																	
アブラキサン点滴静注用	100mg/m <sup>2</sup>																				
生理食塩液	100mL		30分	↓																	

備考：

# 乳腺

レジメン名	MMK PTX+Pembro (1回目)			更新日	2021/11/24																	
				1クール	84日間																	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	・	8	・	15	・	22	・	29	・	36	・	43	・	50	・	57	・	64
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓				↓		↓				↓		↓		
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン							↓												
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓						↓											↓	
生理食塩液	100mL													↓								
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																		
デキサート注射液	6.6mg				↓																	
ガスター注射液	20mg							↓														
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分																			
デキサート注射液	3.3mg							↓														
ガスター注射液	20mg																					
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分																			
デキサート注射液	1.65mg										↓		↓		↓					↓		↓
ガスター注射液	20mg																					
パクリタキセル注	90mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓				↓		↓		↓			↓		↓	
ブドウ糖液5%	250mL																					
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓				↓		↓		↓			↓		↓	

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				71	・	84																
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																		
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン																			
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分																			
生理食塩液	100mL																					
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																		
デキサート注射液	1.65mg																					
ガスター注射液	20mg																					
パクリタキセル注	90mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	1時間	↓																		
ブドウ糖液5%	250mL																					
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																		

備考：

# 乳腺

レジメン名	MMK PTX+Pembro (2回目以降)													更新日	2021/11/24							
														1クール	84日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	・	8	・	15	・	22	・	29	・	36	・	43	・	50	・	57	・	64
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓				↓		↓				↓		↓		
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン							↓												
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓						↓											↓	
生理食塩液	100mL													↓								
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓				↓		↓		↓				↓	↓	
デキサート注射液	1.65mg																					
ガスター注射液	20mg																					
パクリタキセル注	90mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓				↓		↓		↓				↓	↓	
ブドウ糖液5%	250mL																					
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓				↓		↓		↓				↓	↓	

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				71	・	84																	
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																			
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン																				
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分																				
生理食塩液	100mL																						
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																			
デキサート注射液	1.65mg																						
ガスター注射液	20mg																						
パクリタキセル注	90mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	1時間	↓																			
ブドウ糖液5%	250mL																						
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																			

備考：