

# 乳腺

| レジメン名       | MMK：AC(60, 600)      |      |      |     |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2022/9/27 |  |
|-------------|----------------------|------|------|-----|---|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|
|             |                      |      |      |     |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |  |
| 薬品名         | 投与量                  | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
|             |                      |      |      | 1   | . | 21 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液       | 250mL                | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   |    | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| パロノセトロン点滴静注 | 0.75mg               | 点滴末梢 | 15分  | ↓   |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| デキサート注射液    | 9.9mg                |      |      |     |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| ドキソルビシン塩酸塩注 | 60mg/m <sup>2</sup>  | 点滴末梢 | 30分  | ↓   |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液       | 100mL                |      |      |     |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 注射用エンドキサン   | 600mg/m <sup>2</sup> | 点滴末梢 | 1時間  | ↓   |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液       | 250mL                |      |      |     |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |

備考：アプレピタントカプセル（day1-3）

| レジメン名       | MMK：AC(60, 600)（アロカリス） |      |      |     |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2022/9/27 |  |  |
|-------------|------------------------|------|------|-----|---|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|--|
|             |                        |      |      |     |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |  |  |
| 薬品名         | 投与量                    | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
|             |                        |      |      | 1   | . | 21 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液       | 250mL                  | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   |    | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| パロノセトロン点滴静注 | 0.75mg                 | 点滴末梢 | 30分  | ↓   |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| アロカリス点滴静注   | 235mg                  |      |      |     |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| デキサート注射液    | 9.9mg                  |      |      |     |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| ドキソルビシン塩酸塩注 | 60mg/m <sup>2</sup>    | 点滴末梢 | 30分  | ↓   |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液       | 100mL                  |      |      |     |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 注射用エンドキサン   | 600mg/m <sup>2</sup>   |      |      |     |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液       | 250mL                  | 点滴末梢 | 1時間  | ↓   |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |

備考：

# 乳腺

| レジメン名                   | MMK：ddAC（ジーラスタ併用）             |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2022/9/27 |  |
|-------------------------|-------------------------------|------|------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|
|                         |                               |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 14日間      |  |
| 薬品名                     | 投与量                           | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
|                         |                               |      |      | 1   | . | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液                   | 250mL                         | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| パロノセトロン点滴静注<br>デキサート注射液 | 0.75mg<br>9.9mg               | 点滴末梢 | 15分  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| ドキソルビシン塩酸塩注<br>生理食塩液    | 60mg/m <sup>2</sup><br>100mL  | 点滴末梢 | 30分  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 注射用エンドキサン<br>生理食塩液      | 600mg/m <sup>2</sup><br>250mL | 点滴末梢 | 1時間  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |

備考：day2～4の間でジーラスタ3.6mg皮下注、アプレピタントカプセル（day1-3）

| レジメン名       | MMK：ddAC（ジーラスタ併用・アロカリス使用） |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2022/9/27 |  |
|-------------|---------------------------|------|------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|
|             |                           |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 14日間      |  |
| 薬品名         | 投与量                       | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
|             |                           |      |      | 1   | . | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液       | 250mL                     | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| パロノセトロン点滴静注 | 0.75mg                    | 点滴末梢 | 30分  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| アロカリス点滴静注   | 235mg                     |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| デキサート注射液    | 9.9mg                     |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| ドキソルビシン塩酸塩注 | 60mg/m <sup>2</sup>       | 点滴末梢 | 30分  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液       | 100mL                     |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 注射用エンドキサン   | 600mg/m <sup>2</sup>      | 点滴末梢 | 1時間  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液       | 250mL                     |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |

備考：day2～4の間でジーラスタ3.6mg皮下注

# 乳腺

| レジメン名                   | MMK：TC(75, 600)               |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2020/3/18 |  |
|-------------------------|-------------------------------|------|------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|
|                         |                               |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |  |
| 薬品名                     | 投与量                           | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
|                         |                               |      |      | 1   | . | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液                   | 500mL                         | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| グラニセトロン点滴静注<br>デキサート注射液 | 3mg/100mL<br>6.6mg            | 点滴末梢 | 15分  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| ドセタキセル点滴静注<br>生理食塩液     | 75mg/m <sup>2</sup><br>250mL  | 点滴末梢 | 1時間  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 注射用エンドキサン<br>生理食塩液      | 600mg/m <sup>2</sup><br>250mL | 点滴末梢 | 1時間  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |

備考：

| レジメン名       | MMK：ddPTX（ジーラスタ併用）（術後） |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2020/3/18 |  |
|-------------|------------------------|------|------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|
|             |                        |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 14日間      |  |
| 薬品名         | 投与量                    | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
|             |                        |      |      | 1   | . | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| ブドウ糖液5％     | 250mL                  | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| グラニセトロン点滴静注 | 1mg/50mL               | 点滴末梢 | 15分  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| デキサート注射液    | 16.5mg                 |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| ガスター注射液     | 20mg                   |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| パクリタキセル注    | 175mg/m <sup>2</sup>   | 点滴末梢 | 3時間  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| ブドウ糖液5％     | 250ml                  |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| レスタミンコーワ    | 50mg                   | 内服   | 投与前  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |

備考：day2～4の間でジーラスタ3.6mg皮下注

# 乳腺

| レジメン名       | MMK：PTX＋weeklyCBDCA＋Pembro |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2023/2/26 |  |  |
|-------------|----------------------------|------|------|-----|---|---|---|----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|--|
|             |                            |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |  |  |
| 薬品名         | 投与量                        | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
|             |                            |      |      | 1   | ・ | 8 | ・ | 15 | ・ | 21 |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液       | 500mL                      | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液       | 250mL                      | 点滴末梢 | メイン  |     |   | ↓ |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| キイトルーダ点滴静注  | 200mg                      | 点滴末梢 | 30分  | ↓   |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液       | 100mL                      |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| グラニセトロン点滴静注 | 1mg/50mL                   | 点滴末梢 | 15分  | ↓   |   | ↓ |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| デキサート注射液    | 6.6mg                      |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| ガスター注射液     | 20mg                       |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| パクリタキセル注    | 80mg/m <sup>2</sup>        | 点滴末梢 | 60分  | ↓   |   | ↓ |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液       | 250mL                      |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| カルボプラチン注射液  | AUC=1.5                    | 点滴末梢 | 60分  | ↓   |   | ↓ |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| ブドウ糖液 5 %   | 250mL                      |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| レスタミンコーワ    | 50mg                       | 内服   | 投与前  | ↓   |   | ↓ |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |

備考：

# 乳腺

| レジメン名       | MMK：PTX＋CBDCA＋Pembro（1回目） |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2023/2/26 |  |  |
|-------------|---------------------------|------|------|-----|---|---|---|----|---|----|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|--|
|             |                           |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |  |  |
| 薬品名         | 投与量                       | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
|             |                           |      |      | 1   | ・ | 8 | ・ | 15 | ・ | 21 |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液       | 500mL                     | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液       | 250mL                     | 点滴末梢 | メイン  |     |   | ↓ |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| キイトルーダ点滴静注  | 200mg                     | 点滴末梢 | 30分  | ↓   |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液       | 100mL                     |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| パロノセトロン点滴静注 | 0.75mg/50m                | 点滴末梢 | 15分  | ↓   |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| デキサート注射液    | L                         |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| ガスター注射液     | 6.6mg                     |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| グラニセトロン点滴静注 | 1mg/50mL                  | 点滴末梢 | 15分  |     |   | ↓ |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| デキサート注射液    | 6.6mg                     |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| ガスター注射液     | 20mg                      |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| グラニセトロン点滴静注 | 1mg/50mL                  | 点滴末梢 | 15分  |     |   |   |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| デキサート注射液    | 3.3mg                     |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| ガスター注射液     | 20mg                      |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| パクリタキセル注    | 80mg/m <sup>2</sup>       | 点滴末梢 | 60分  | ↓   |   | ↓ |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液       | 250mL                     |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| カルボプラチン注射液  | AUC=5                     | 点滴末梢 | 60分  | ↓   |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| ブドウ糖液 5 %   | 250mL                     |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| レスタミンコーワ    | 50mg                      | 内服   | 投与前  | ↓   |   | ↓ |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |

備考：

# 乳腺

| レジメン名       | MMK：PTX＋CBDCA＋Pembro（2回目以降） |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |    |  |  |  | 更新日  | 2023/2/26 |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------|------|------|-----|---|---|---|----|---|----|--|--|----|--|--|--|------|-----------|--|--|--|--|
|             |                             |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |    |  |  |  | 1クール | 21日間      |  |  |  |  |
| 薬品名         | 投与量                         | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |   |   |    |   |    |  |  |    |  |  |  |      |           |  |  |  |  |
|             |                             |      |      | 1   | ・ | 8 | ・ | 15 | ・ | 21 |  |  |    |  |  |  |      |           |  |  |  |  |
| 生理食塩液       | 500mL                       | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   |   | 8 |    |   | 15 |  |  | 21 |  |  |  |      |           |  |  |  |  |
| 生理食塩液       | 250mL                       | 点滴末梢 | メイン  |     |   |   | ↓ |    |   | ↓  |  |  |    |  |  |  |      |           |  |  |  |  |
| キイトルーダ点滴静注  | 200mg                       | 点滴末梢 | 30分  | ↓   |   |   |   |    |   |    |  |  |    |  |  |  |      |           |  |  |  |  |
| 生理食塩液       | 100mL                       |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |    |  |  |  |      |           |  |  |  |  |
| パロノセトロン点滴静注 | 0.75mg/50m                  | 点滴末梢 | 15分  | ↓   |   |   |   |    |   |    |  |  |    |  |  |  |      |           |  |  |  |  |
| デキサート注射液    | L                           |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |    |  |  |  |      |           |  |  |  |  |
| ガスター注射液     | 6.6mg                       |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |    |  |  |  |      |           |  |  |  |  |
| グラニセトロン点滴静注 | 1mg/50mL                    | 点滴末梢 | 15分  |     |   |   | ↓ |    |   | ↓  |  |  |    |  |  |  |      |           |  |  |  |  |
| デキサート注射液    | 1.65mg                      |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |    |  |  |  |      |           |  |  |  |  |
| ガスター注射液     | 20mg                        |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |    |  |  |  |      |           |  |  |  |  |
| パクリタキセル注    | 80mg/m <sup>2</sup>         | 点滴末梢 | 60分  | ↓   |   |   | ↓ |    |   | ↓  |  |  |    |  |  |  |      |           |  |  |  |  |
| 生理食塩液       | 250mL                       |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |    |  |  |  |      |           |  |  |  |  |
| カルボプラチン注射液  | AUC=5                       | 点滴末梢 | 60分  | ↓   |   |   |   |    |   |    |  |  |    |  |  |  |      |           |  |  |  |  |
| ブドウ糖液5％     | 250mL                       |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |    |  |  |  |      |           |  |  |  |  |
| レスタミンコーワ    | 50mg                        | 内服   | 投与前  | ↓   |   |   | ↓ |    |   | ↓  |  |  |    |  |  |  |      |           |  |  |  |  |

備考：

# 乳腺

| レジメン名       | MMK：AC+Pembro        |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2023/2/26 |  |  |
|-------------|----------------------|------|------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|--|
|             |                      |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |  |  |
| 薬品名         | 投与量                  | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
|             |                      |      |      | 1   | . | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液       | 500mL                | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| キイトルーダ点滴静注  | 200mg                | 点滴末梢 | 30分  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液       | 100mL                |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| パロノセトロン点滴静注 | 0.75mg/50m           | 点滴末梢 | 30分  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| アロカリス点滴静注   | L                    |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| デキサート注射液    | 235mg                |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| ドキソルビシン塩酸塩注 | 60mg/m <sup>2</sup>  | 点滴末梢 | 30分  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液       | 100mL                |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 注射用エンドキサン   | 600mg/m <sup>2</sup> | 点滴末梢 | 1時間  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液       | 250mL                |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |

備考：

| レジメン名      | MMK：Pembro（3週毎） |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2023/2/26 |  |
|------------|-----------------|------|------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|
|            |                 |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |  |
| 薬品名        | 投与量             | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
|            |                 |      |      | 1   | . | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液      | 100mL           | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| キイトルーダ点滴静注 | 200mg           | 点滴末梢 | 30分  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液      | 100mL           |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |

備考：

# 乳腺

| レジメン名                   | MMK：ドセタキセル+パージェタ+トラスツズマブ             |      |                                 |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2021/11/24 |  |  |
|-------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------------|--|--|
|                         |                                      |      |                                 |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間       |  |  |
| 薬品名                     | 投与量                                  | 投与方法 | 投与時間                            | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |  |  |
|                         |                                      |      |                                 | 1   | . | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |  |  |
| 生理食塩液                   | 250mL                                | 点滴末梢 | メイン                             | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |  |  |
| グラニセトロン点滴静注<br>デキサート注射液 | 1mg/50mL<br>6.6mg                    | 点滴末梢 | 15分                             | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |  |  |
| パージェタ点滴静注<br>生理食塩液      | 840mg<br>(2回目以降<br>420mg)<br>250mL   | 点滴末梢 | 1時間<br>(2回目以降<br>30分)           | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |  |  |
| トラスツズマブBS点滴静注用<br>生理食塩液 | 8mg/kg<br>(2回目以降<br>6mg/kg)<br>250mL | 点滴末梢 | 1時間30分<br>(2回目以降<br>30～<br>45分) | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |  |  |
| ドセタキセル点滴静注<br>ブドウ糖液5%   | 70MG/m <sup>2</sup><br>500mL         | 点滴末梢 | 1時間30分                          | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |  |  |

備考：

| レジメン名                   | MMK：パージェタ+トラスツズマブ                    |      |                                 |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2021/11/24 |  |
|-------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------------|--|
|                         |                                      |      |                                 |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間       |  |
| 薬品名                     | 投与量                                  | 投与方法 | 投与時間                            | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |  |
|                         |                                      |      |                                 | 1   | . | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |  |
| 生理食塩液                   | 250mL                                | 点滴末梢 | メイン                             | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |  |
| パージェタ点滴静注<br>生理食塩液      | 840mg<br>(2回目以降<br>420mg)<br>250mL   | 点滴末梢 | 1時間<br>(2回目以降<br>30分)           | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |  |
| トラスツズマブBS点滴静注用<br>生理食塩液 | 8mg/kg<br>(2回目以降<br>6mg/kg)<br>250mL | 点滴末梢 | 1時間30分<br>(2回目以降<br>30～<br>45分) | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |  |

備考：

# 乳腺

| レジメン名                   |                                      | MMK：トラスツズマブ |                             |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2021/11/24 |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------------|
|                         |                                      |             |                             |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間       |
| 薬品名                     | 投与量                                  | 投与方法        | 投与時間                        | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |
|                         |                                      |             |                             | 1   | ・ | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |
| 生理食塩液                   | 100mL                                | 点滴末梢        | メイン                         | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |
| トラスツズマブBS点滴静注用<br>生理食塩液 | 8mg/kg<br>(2回目以降<br>6mg/kg)<br>250mL | 点滴末梢        | 1時間30分<br>(2回目以降30～<br>45分) | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |

備考：

| レジメン名                              |                                      | MMK：パクリタキセル+パージェタ+トラスツズマブ |                             |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2021/11/24 |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----|---|---|---|----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|------|------------|
|                                    |                                      |                           |                             |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間       |
| 薬品名                                | 投与量                                  | 投与方法                      | 投与時間                        | 投与日 |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |            |
|                                    |                                      |                           |                             | 1   | ・ | 8 | ・ | 15 | ・ | 21 |  |  |  |  |  |  |  |      |            |
| 生理食塩液                              | 250mL                                | 点滴末梢                      | メイン                         | ↓   |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |            |
| ブドウ糖液 5 %                          | 250mL                                | 点滴末梢                      | メイン                         |     |   | ↓ |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |            |
| グラニセトロン点滴静注<br>ガスター注射液<br>デキサート注射液 | 1mg/50mL<br>20mg<br>備考参照             | 点滴末梢                      | 15分                         | ↓   |   | ↓ |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |            |
| パージェタ点滴静注<br>生理食塩液                 | 840mg<br>(2回目以降<br>420mg)<br>250mL   | 点滴末梢                      | 1時間<br>(2回目以降30分)           | ↓   |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |            |
| トラスツズマブBS点滴静注用<br>生理食塩液            | 8mg/kg<br>(2回目以降<br>6mg/kg)<br>250mL | 点滴末梢                      | 1時間30分<br>(2回目以降30～<br>45分) | ↓   |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |            |
| パクリタキセル注<br>ブドウ糖液 5 %              | 80mg/m <sup>2</sup><br>250mL         | 点滴末梢                      | 1時間                         | ↓   |   | ↓ |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |            |
| レスタミンコーワ                           | 50mg                                 | 内服                        | 投与前                         | ↓   |   | ↓ |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |            |

備考：デキサート注射液はパクリタキセル投与1・2回目6.6mg 3回目3.3mg 4回目以降1.65mg

# 乳腺

| レジメン名               |                                      | MMK：パクリ（80）＋トラスツズマブ |                             |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2021/11/24 |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------------|
|                     |                                      |                     |                             |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 7日間        |
| 薬品名                 | 投与量                                  | 投与方法                | 投与時間                        | 投与日 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |
|                     |                                      |                     |                             | 1   | . | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |
| 生理食塩液               | 250mL                                | 点滴末梢                | メイン                         | ↓   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |
| グラニセトロン点滴静注         | 1mg/50mL                             | 点滴末梢                | 15分                         | ↓   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |
| ガスター注射液             | 20mg                                 |                     |                             |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |
| デキサート注射液            | 備考参照                                 |                     |                             |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |
| トラスツズマブBS点滴静注用生理食塩液 | 4mg/kg<br>(2回目以降<br>2mg/kg)<br>250mL | 点滴末梢                | 1時間30分<br>(2回目以降<br>30～45分) | ↓   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |
| パクリタキセル注<br>ブドウ糖液5% | 80mg/m <sup>2</sup><br>250mL         | 点滴末梢                | 1時間                         | ↓   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |
| レスタミンコーワ            | 50mg                                 | 内服                  | 投与前                         | ↓   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |

備考：デキサート注射液はパクリタキセル投与1・2回目6.6mg 3回目3.3mg 4回目以降1.65mg

| レジメン名               |                              | MMK：PAC（80） weekly |      |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2020/3/17 |
|---------------------|------------------------------|--------------------|------|-----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|
|                     |                              |                    |      |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 7日間       |
| 薬品名                 | 投与量                          | 投与方法               | 投与時間 | 投与日 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
|                     |                              |                    |      | 1   | . | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| ブドウ糖液5%             | 250mL                        | 点滴末梢               | メイン  | ↓   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| グラニセトロン点滴静注         | 1mg/50mL                     | 点滴末梢               | 15分  | ↓   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| ガスター注射液             | 20mg                         |                    |      |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| デキサート注射液            | 備考参照                         |                    |      |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| パクリタキセル注<br>ブドウ糖液5% | 80mg/m <sup>2</sup><br>250mL | 点滴末梢               | 1時間  | ↓   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| レスタミンコーワ            | 50mg                         | 内服                 | 投与前  | ↓   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |

備考：デキサート注射液はパクリタキセル投与1・2回目6.6mg 3回目3.3mg 4回目以降1.65mg

# 乳腺

| レジメン名      | MMK：W-PAC+BV療法      |      |        |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2020/3/17 |  |
|------------|---------------------|------|--------|-----|---|---|---|----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|
|            |                     |      |        |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 28日間      |  |
| 薬品名        | 投与量                 | 投与方法 | 投与時間   | 投与日 |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
|            |                     |      |        | 1   | ・ | 8 | ・ | 15 | ・ | 28 |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液      | 250mL               | 点滴末梢 | メイン    | ↓   |   | ↓ |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| グラニセロン点滴静注 | 1mg/50mL            | 点滴末梢 | 15分    | ↓   |   | ↓ |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| ガスター注射液    | 20mg                |      |        |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| デキサート注射液   | 備考参照                |      |        |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| パクリタキセル注   | 90mg/m <sup>2</sup> | 点滴末梢 | 1時間    | ↓   |   | ↓ |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| ブドウ糖液5%    | 250mL               |      |        |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| アバスチン点滴静注用 | 10mg/kg             | 点滴末梢 | 30～90分 | ↓   |   |   |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液      | 100mL               |      |        |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| レスタミンコーワ   | 50mg                | 内服   | 投与前    | ↓   |   | ↓ |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |

備考：デキサート注射液はパクリタキセル投与1・2回目6.6mg 3回目3.3mg 4回目以降1.65mg

| レジメン名               | MMK：カドサイラ         |      |        |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2020/3/18 |  |  |  |  |
|---------------------|-------------------|------|--------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|--|--|--|
|                     |                   |      |        |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |  |  |  |  |
| 薬品名                 | 投与量               | 投与方法 | 投与時間   | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |  |
|                     |                   |      |        | 1   | ・ | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |  |
| 生理食塩液               | 100mL             | 点滴末梢 | メイン    | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |  |
| カドサイラ点滴静注用<br>生理食塩液 | 3.6mg/kg<br>250mL | 点滴末梢 | 30～90分 | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |  |

備考：

乳腺

[illegible]

備考：

# 乳腺

| レジメン名             | MMK：エリブリン                    |      |      |     |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2020/3/18 |  |
|-------------------|------------------------------|------|------|-----|---|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|
|                   |                              |      |      |     |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |  |
| 薬品名               | 投与量                          | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
|                   |                              |      |      | 1   | ・ | 8 | ・ | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液             | 50mL                         | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液<br>デキサート注射液 | 50mL<br>6.6mg                | 点滴末梢 | 15分  | ↓   |   | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| ハラヴェン静注<br>生理食塩液  | 1.4mg/m <sup>2</sup><br>50mL | 点滴末梢 | 5分   | ↓   |   | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |

備考：

| レジメン名    | MMK：エリブリン（1投1休）      |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2020/3/18 |  |
|----------|----------------------|------|------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|
|          |                      |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 14日間      |  |
| 薬品名      | 投与量                  | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
|          |                      |      |      | 1   | ・ | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液    | 50mL                 | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液    | 50mL                 | 点滴末梢 | 15分  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| デキサート注射液 | 6.6mg                |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| ハラヴェン静注  | 1.4MG/m <sup>2</sup> | 点滴末梢 | 5分   | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液    | 50mL                 |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |

備考：

# 乳腺

| レジメン名   | MMK：ビノレルビン 2投1休     |      |      |     |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2021/11/24 |  |
|---------|---------------------|------|------|-----|---|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------------|--|
|         |                     |      |      |     |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間       |  |
| 薬品名     | 投与量                 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |  |
|         |                     |      |      | 1   | ・ | 8 | ・ | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |  |
| 生理食塩液   | 100mL               | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |  |
| ロゼウス静注液 | 25MG/m <sup>2</sup> | 点滴末梢 | 全開   | ↓   |   | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |  |
| 生理食塩液   | 50mL                |      |      |     |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |  |

備考：

| レジメン名   | MMK：ビノレルビン 1投1休     |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2021/11/24 |  |  |
|---------|---------------------|------|------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------------|--|--|
|         |                     |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 14日間       |  |  |
| 薬品名     | 投与量                 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |  |  |
|         |                     |      |      | 1   | ・ | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |  |  |
| 生理食塩液   | 100mL               | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |  |  |
| ロゼウス静注液 | 25MG/m <sup>2</sup> |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |  |  |
| 生理食塩液   | 50mL                | 点滴末梢 | 全開   | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |  |  |

備考：

# 乳腺

| レジメン名                   | MMK：CMF（内服）                  |      |      |           |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2020/3/18 |  |
|-------------------------|------------------------------|------|------|-----------|---|---|---|----|---|----|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|
|                         |                              |      |      |           |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  | 1クール | 28日間      |  |
| 薬品名                     | 投与量                          | 投与方法 | 投与時間 | 投与日       |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
|                         |                              |      |      | 1         | ・ | 8 | ・ | 14 | ・ | 28 |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| ブドウ糖液5％                 | 250mL                        | 点滴末梢 | メイン  | ↓         |   | ↓ |   | 14 |   | 28 |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| グラニセトロン点滴静注<br>デキサート注射液 | 1mg/50mL<br>6.6mg            | 点滴末梢 | 15分  | ↓         |   | ↓ |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| メソトレキセート<br>生理食塩液       | 40mg/m <sup>2</sup><br>50mL  | 点滴末梢 | 15分  | ↓         |   | ↓ |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| フルオロウラシル注<br>生理食塩液      | 600mg/m <sup>2</sup><br>50mL | 点滴末梢 | 20分  | ↓         |   | ↓ |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| エンドキサン錠                 | 100mg                        | 内服   |      | day1-14内服 |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |      |           |  |

備考：

| レジメン名                   | MMK：CMF（注射）                   |      |      |     |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2020/3/18 |  |
|-------------------------|-------------------------------|------|------|-----|---|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|
|                         |                               |      |      |     |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 28日間      |  |
| 薬品名                     | 投与量                           | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
|                         |                               |      |      | 1   | ・ | 8 | ・ | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| ブドウ糖液5％                 | 250mL                         | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| グラニセトロン点滴静注<br>デキサート注射液 | 1mg/50mL<br>6.6mg             | 点滴末梢 | 15分  | ↓   |   | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| メソトレキセート<br>生理食塩液       | 40mg/m <sup>2</sup><br>50mL   | 点滴末梢 | 15分  | ↓   |   | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 注射用エンドキサン<br>生理食塩液      | 600mg/m <sup>2</sup><br>250mL | 点滴末梢 | 1時間  | ↓   |   | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| フルオロウラシル注<br>生理食塩液      | 600mg/m <sup>2</sup><br>50mL  | 点滴末梢 | 15分  | ↓   |   | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |

備考：

# 乳腺

| レジメン名                               | MMK：エンハーツ             |      |                         |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2022/9/27 |  |
|-------------------------------------|-----------------------|------|-------------------------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|
|                                     |                       |      |                         |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |  |
| 薬品名                                 | 投与量                   | 投与方法 | 投与時間                    | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
|                                     |                       |      |                         | 1   | . | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| ブドウ糖液 5 %                           | 100mL                 | 点滴末梢 | メイン                     | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| パロノセトロン点滴静注<br>デキサート注射液             | 0.75mg<br>9.9mg       | 点滴末梢 | 15分                     | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| エンハーツ点滴静注<br>注射用水（溶解用）<br>ブドウ糖液 5 % | 5.4mg/kg<br><br>100mL | 点滴末梢 | 初回：90分<br>2回目以降<br>：30分 | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |

備考：

| レジメン名                    | MMK CBDCA＋GEM＋Pembro |      |      |     |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2021/11/24 |  |
|--------------------------|----------------------|------|------|-----|---|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------------|--|
|                          |                      |      |      |     |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間       |  |
| 薬品名                      | 投与量                  | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |  |
|                          |                      |      |      | 1   | . | 8 | . | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |  |
| 生理食塩液                    | 500mL                | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   | ↓ |   | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |  |
| キイトルーダ点滴静注<br>生理食塩液      | 200mg<br>100mL       | 点滴末梢 | 30分  | ↓   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |  |
| グラニセトロン点滴静注<br>デキサート注射液  | 1mg/50mL<br>6.6mg    | 点滴末梢 | 15分  | ↓   |   | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |  |
| ゲムシタビン点滴静注用<br>ブドウ糖液 5 % | 1000mg/㎡<br>100mL    | 点滴末梢 | 30分  | ↓   |   | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |  |
| カルボプラチン注射液<br>ブドウ糖液 5 %  | AUC=2<br>250mL       | 点滴末梢 | 1時間  | ↓   |   | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |  |

備考：

# 乳腺

| レジメン名       | MMK nab PTX+Pembro   |      |      |     |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    | 更新日  | 2021/11/24 |   |    |   |    |   |
|-------------|----------------------|------|------|-----|---|---|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|------|------------|---|----|---|----|---|
|             |                      |      |      |     |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    | 1クール | 84日間       |   |    |   |    |   |
| 薬品名         | 投与量                  | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |      |            |   |    |   |    |   |
|             |                      |      |      | 1   | ・ | 8 | ・ | 15 | ・ | 22 | ・ | 29 | ・ | 36 | ・ | 43 | ・    | 50         | ・ | 57 | ・ | 64 | ・ |
| 生理食塩液       | 250mL                | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   |   | 8 |    |   | 15 |   |    |   | 22 |   |    |      |            |   |    |   | ↓  |   |
| 生理食塩液       | 100mL                | 点滴末梢 | メイン  |     |   |   | ↓ |    |   | ↓  |   |    | ↓ |    |   | ↓  |      |            |   |    | ↓ |    |   |
| キイトルーダ点滴静注  | 200mg                | 点滴末梢 | 30分  | ↓   |   |   |   |    |   | ↓  |   |    |   |    |   |    |      |            |   |    |   | ↓  |   |
| 生理食塩液       | 100mL                |      |      |     |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |      |            |   |    |   |    |   |
| グラニセトロン点滴静注 | 1mg/50mL             | 点滴末梢 | 15分  | ↓   |   |   | ↓ |    |   | ↓  |   |    | ↓ |    |   | ↓  |      |            |   |    | ↓ |    | ↓ |
| アブラキサン点滴静注用 | 100mg/m <sup>2</sup> | 点滴末梢 | 30分  | ↓   |   |   | ↓ |    |   |    |   | ↓  |   |    | ↓ |    |      |            |   |    | ↓ |    | ↓ |
| 生理食塩液       | 100mL                |      |      |     |   |   |   |    | ↓ |    |   |    |   |    |   |    | ↓    |            |   |    |   |    |   |

| 薬品名         | 投与量                  | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|----------------------|------|------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|             |                      |      |      | 71  | ・ | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生理食塩液       | 250mL                | 点滴末梢 | メイン  |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生理食塩液       | 100mL                | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| キイトルーダ点滴静注  | 200mg                | 点滴末梢 | 30分  |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生理食塩液       | 100mL                | 点滴末梢 | 30分  |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| グラニセトロン点滴静注 | 1mg/50mL             | 点滴末梢 | 15分  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| アブラキサン点滴静注用 | 100mg/m <sup>2</sup> | 点滴末梢 | 30分  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生理食塩液       | 100mL                | 点滴末梢 | 30分  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考：

# 乳腺

| レジメン名       | MMK PTX+Pembro（1回目） |      |      |     |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   | 更新日  | 2021/11/24 |    |   |    |   |  |
|-------------|---------------------|------|------|-----|---|---|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|------|------------|----|---|----|---|--|
|             |                     |      |      |     |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   | 1クール | 84日間       |    |   |    |   |  |
| 薬品名         | 投与量                 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |      |            |    |   |    |   |  |
|             |                     |      |      | 1   | ・ | 8 | ・ | 15 | ・ | 22 | ・ | 29 | ・ | 36 | ・ | 43 | ・ | 50   | ・          | 57 | ・ | 64 | ・ |  |
| 生理食塩液       | 250mL               | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   | ↓ |   | ↓  |   |    |   | ↓  |   | ↓  |   | ↓  |   |      |            | ↓  |   | ↓  |   |  |
| 生理食塩液       | 100mL               | 点滴末梢 | メイン  |     |   |   |   |    |   | ↓  |   |    |   |    |   |    |   |      |            |    |   |    |   |  |
| キイトルーダ点滴静注  | 200mg               | 点滴末梢 | 30分  | ↓   |   |   |   |    |   |    | ↓ |    |   |    |   | ↓  |   |      |            |    |   | ↓  |   |  |
| 生理食塩液       | 100mL               |      |      |     |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |      |            |    |   |    |   |  |
| グラニセトロン点滴静注 | 1mg/50mL            | 点滴末梢 | 15分  | ↓   |   | ↓ |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |      |            |    |   |    |   |  |
| デキサート注射液    | 6.6mg               |      |      |     |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |      |            |    |   |    |   |  |
| ガスター注射液     | 20mg                |      |      |     |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |      |            |    |   |    |   |  |
| グラニセトロン点滴静注 | 1mg/50mL            | 点滴末梢 | 15分  |     |   |   |   | ↓  |   |    |   |    |   |    |   |    |   |      |            |    |   |    |   |  |
| デキサート注射液    | 3.3mg               |      |      |     |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |      |            |    |   |    |   |  |
| ガスター注射液     | 20mg                |      |      |     |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |      |            |    |   |    |   |  |
| グラニセトロン点滴静注 | 1mg/50mL            | 点滴末梢 | 15分  |     |   |   |   |    |   |    |   | ↓  |   | ↓  |   | ↓  |   |      |            | ↓  |   | ↓  |   |  |
| デキサート注射液    | 1.65mg              |      |      |     |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |      |            |    |   |    |   |  |
| ガスター注射液     | 20mg                |      |      |     |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |      |            |    |   |    |   |  |
| パクリタキセル注    | 90mg/m <sup>2</sup> | 点滴末梢 | 1時間  | ↓   |   | ↓ |   | ↓  |   |    |   | ↓  |   | ↓  |   | ↓  |   |      |            | ↓  |   | ↓  |   |  |
| ブドウ糖液 5 %   | 250mL               |      |      |     |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |      |            |    |   |    |   |  |
| レスタミンコーワ錠   | 50mg                | 内服   | 投与前  | ↓   |   | ↓ |   | ↓  |   |    |   | ↓  |   | ↓  |   | ↓  |   |      |            | ↓  |   | ↓  |   |  |

| 薬品名         | 投与量      | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|----------|------|------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|             |          |      |      | 71  | ・ | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生理食塩液       | 250mL    | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生理食塩液       | 100mL    | 点滴末梢 | メイン  |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| キイトルーダ点滴静注  | 200mg    | 点滴末梢 | 30分  |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生理食塩液       | 100mL    |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| グラニセトロン点滴静注 | 1mg/50mL | 点滴末梢 | 15分  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| デキサート注射液    | 1.65mg   |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ガスター注射液     | 20mg     |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| パクリタキセル注    | 90mg/㎡   | 点滴末梢 | 1時間  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ブドウ糖液5%     | 250mL    |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| レスタミンコーワ錠   | 50mg     | 内服   | 投与前  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考：

# 乳腺

| レジメン名       | MMK PTX+Pembro（2回目以降） |      |      |     |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   | 更新日  | 2021/11/24 |    |   |    |   |  |
|-------------|-----------------------|------|------|-----|---|---|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|------|------------|----|---|----|---|--|
|             |                       |      |      |     |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   | 1クール | 84日間       |    |   |    |   |  |
| 薬品名         | 投与量                   | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |      |            |    |   |    |   |  |
|             |                       |      |      | 1   | ・ | 8 | ・ | 15 | ・ | 22 | ・ | 29 | ・ | 36 | ・ | 43 | ・ | 50   | ・          | 57 | ・ | 64 | ・ |  |
| 生理食塩液       | 250mL                 | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   | ↓ |   | ↓  |   |    |   | ↓  |   | ↓  |   | ↓  |   |      |            | ↓  |   | ↓  |   |  |
| 生理食塩液       | 100mL                 | 点滴末梢 | メイン  |     |   |   |   |    |   | ↓  |   |    |   |    |   |    |   |      |            |    |   |    |   |  |
| キイトルーダ点滴静注  | 200mg                 | 点滴末梢 | 30分  | ↓   |   |   |   |    |   | ↓  |   |    |   |    |   | ↓  |   |      |            |    |   | ↓  |   |  |
| 生理食塩液       | 100mL                 |      |      |     |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |      |            |    |   |    |   |  |
| グラニセトロン点滴静注 | 1mg/50mL              | 点滴末梢 | 15分  | ↓   |   | ↓ |   | ↓  |   |    |   | ↓  |   | ↓  |   | ↓  |   |      |            | ↓  |   | ↓  |   |  |
| デキサート注射液    | 1.65mg                |      |      |     |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |      |            |    |   |    |   |  |
| ガスター注射液     | 20mg                  |      |      |     |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |      |            |    |   |    |   |  |
| パクリタキセル注    | 90mg/m <sup>2</sup>   | 点滴末梢 | 1時間  | ↓   |   | ↓ |   | ↓  |   |    |   | ↓  |   | ↓  |   | ↓  |   |      |            | ↓  |   | ↓  |   |  |
| ブドウ糖液 5 %   | 250mL                 |      |      |     |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |      |            |    |   |    |   |  |
| レスタミンコーワ錠   | 50mg                  | 内服   | 投与前  | ↓   |   | ↓ |   | ↓  |   |    |   | ↓  |   | ↓  |   | ↓  |   |      |            | ↓  |   | ↓  |   |  |

| 薬品名         | 投与量      | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|----------|------|------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|             |          |      |      | 71  | ・ | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生理食塩液       | 250mL    | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生理食塩液       | 100mL    | 点滴末梢 | メイン  |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| キイトルーダ点滴静注  | 200mg    | 点滴末梢 | 30分  |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生理食塩液       | 100mL    |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| グラニセトロン点滴静注 | 1mg/50mL | 点滴末梢 | 15分  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| デキサート注射液    | 1.65mg   |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ガスター注射液     | 20mg     |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| パクリタキセル注    | 90mg/㎡   | 点滴末梢 | 1時間  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ブドウ糖液5%     | 250mL    |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| レスタミンコーワ錠   | 50mg     | 内服   | 投与前  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考：