



# 非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CDDP+Pemetrexed+Pembro													更新日						
														1クール	21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	3	4	・	21											
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL	点滴末梢																		
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	メイン		↓	↓														
ソルデム3A輸液	200mL	点滴末梢	メイン				↓													
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	↓																
硫酸Mg補正液	8mEq	点滴末梢																		
アロキシ点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																
デキサート注射液	9.9mg	点滴末梢																		
デキサート注射液	3.3mg	点滴末梢	15分		↓	↓	↓													
生理食塩液	50mL	点滴末梢																		
アリムタ注射液	500MG/m <sup>2</sup>	点滴末梢	10分以上	↓																
生理食塩液	50mL	点滴末梢																		
20%マンニトール注射液	200mL	点滴末梢	30分	↓																
シスプラチン点滴静注液	75mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	2時間	↓																
生理食塩液	500mL	点滴末梢																		
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	×2	↓															
アプレピタントカプセル		内服	指示通り	↓	↓	↓														

備考：アリムタ投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

レジメン名	NSCLC Pemetrexed+Pembro													更新日							
														1クール	21日間						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	21															
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																	
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓																	
生理食塩液	100mL	点滴末梢																			
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分	↓																	
生理食塩液	50mL	点滴末梢																			
アリムタ注射液	500mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	10分以上	↓																	
生理食塩液	50mL	点滴末梢																			

備考：アリムタ投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CBDCA+nab PTX+Pembro													更新日						
														2020/3/18						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	8	15	21													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン		↓		↓													
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																
デキサート注射液	6.6mg																			
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分		↓		↓													
生理食塩液	50mL																			
アブラキサン点滴静注用	100mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	30分	↓	↓		↓													
生理食塩液	100mL																			
カルボプラチン注射液	AUC=6	点滴末梢	1時間	↓																
ブドウ糖液5%	250mL																			

備考：

レジメン名	NSCLC CBDCA+PTX+Pembro													更新日							
														2021/11/24							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	21																
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓		21															
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓																	
生理食塩液	100mL																				
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																	
デキサート注射液	16.5mg																				
ガスター注射液	20mg																				
パクリタキセル注	200mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	3時間	↓																	
生理食塩液	500mL																				
カルボプラチン注射液	AUC=6	点滴末梢	1時間	↓																	
ブドウ糖液5%	250mL																				
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																	

備考：

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC Pembro(3週毎)				更新日	2021/3/20													
					1クール	21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
キイトルーダ点滴静注	200mg/body	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		

備考：

レジメン名	NSCLC Pembro(6週毎)				更新日	2021/3/23													
					1クール	42日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	42													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
キイトルーダ点滴静注	400mg/body	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		

備考：

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CBDCA+PTX+BEV+Atezo				更新日		2020/3/18															
					1クール		21日間															
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	.	21																
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																		
テセントリク点滴静注	1200mg	点滴末梢	30~60分	↓																		
生理食塩液	250mL																					
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																		
デキサート注射液	16.5mg	点滴末梢	30分	↓																		
ガスター注射液	20mg																					
パクリタキセル注	175mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	3時間	↓																		
生理食塩液	500mL																					
カルボプラチン注射液	AUC=6	点滴末梢	1時間	↓																		
ブドウ糖液5%	250mL																					
アバスチン点滴静注用	15mg/kg	点滴末梢	30~90分	↓																		
生理食塩液	100mL																					
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																		

備考：

レジメン名	NSCLC BEV+Atezo				更新日		2020/3/18															
					1クール		21日間															
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	.	21																
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																		
テセントリク点滴静注	1200mg	点滴末梢	30分	↓																		
生理食塩液	250mL																					
アバスチン点滴静注用	15mg/kg	点滴末梢	30分	↓																		
生理食塩液	100mL																					

備考：

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CBDCA+nabPTX+Atezo													更新日	2021/3/23					
														1クール	21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	8	15	21													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン			↓		↓												
テセントリク点滴静注	1200mg	点滴末梢	30~60分	↓																
生理食塩液	250mL																			
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分			↓		↓												
生理食塩液	50mL																			
アブラキサン点滴静注用	100mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	30分	↓		↓		↓												
生理食塩液	100mL																			
カルボプラチン注射液	AUC=6	点滴末梢	1時間	↓																
ブドウ糖液5%	250mL																			

備考：

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC Atezo				更新日	2020/3/13													
					1クール	21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
テセントリク点滴静注	1200mg	点滴末梢	30~60分	↓															
生理食塩液	250mL																		

備考：

レジメン名	NSCLC NIVO(240mg/body:2週毎)				更新日	2020/3/18													
					1クール	14日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	14													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
オブジーボ点滴静注	240mg	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		

備考：

レジメン名	NSCLC NIVO(480mg/body:4週毎)				更新日	2021/3/23													
					1クール	28日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	28													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
オブジーボ点滴静注	480mg	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		

備考：

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC NIVO+IPI													更新日					
														2021/11/24					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	15	・	29	・	42									
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓															
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン			↓		↓											
オプジーボ点滴静注	240mg	点滴末梢	30分	↓		↓		↓											
生理食塩液	100mL			↓															
ヤーボイ点滴静注液	1mg/kg	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	50mL																		

備考：

レジメン名	NSCLC Durvalumab													更新日					
														2020/3/13					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	14													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
イミフィンジ点滴静注	10mg/kg	点滴末梢	1時間	↓															
生理食塩液	100mL																		

備考：



# 非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CBDCA+Pemetrexed+BEV													更新日								
														2020/3/18								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	.	21																
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																		
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓																		
アリムタ注射液 生理食塩液	500mg/m <sup>2</sup> 50mL	点滴末梢	10分以上	↓																		
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=6 250mL	点滴末梢	1時間	↓																		
アバスタチン点滴静注用 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴末梢	30~90分	↓																		

備考：アリムタ投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

レジメン名	NSCLC Pemetrexed+BEV													更新日								
														2020/3/18								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	.	21																
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																		
生理食塩液 デキサート注射液	50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓																		
アリムタ注射液 生理食塩液	500mg/m <sup>2</sup> 50mL	点滴末梢	10分以上	↓																		
アバスタチン点滴静注用 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴末梢	30分	↓																		

備考：アリムタ投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CBDCA+Pemetrexed													更新日	2020/3/18								
														1クール	21日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																			
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																			
アリムタ注射液 生理食塩液	500mg/m <sup>2</sup> 50mL	点滴末梢	10分以上	↓																			
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																			

備考：アリムタ投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

レジメン名	NSCLC CDDP+Pemetrexed													更新日	2020/3/18								
														1クール	21日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																			
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	メイン		↓	↓																	
ソルデム3A輸液	200mL	点滴末梢	メイン				↓																
ソルデム3A輸液 硫酸Mg補正液	500mL 8mEq	点滴末梢	1時間	↓																			
アロキシ点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 9.9mg	点滴末梢	15分	↓																			
デキサート注射液 生理食塩液	3.3mg 50mL	点滴末梢	15分		↓	↓	↓																
アリムタ注射液 生理食塩液	500MG/m <sup>2</sup> 50mL	点滴末梢	10分以上	↓																			
20%マンニトール注射液	200mL	点滴末梢	30分	↓																			
シスプラチン点滴静注 生理食塩液	75mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	2時間	↓																			
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	×2	↓																		
アプレピタントカプセル		内服	指示通り	↓	↓	↓																	

備考：アリムタ投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC Pemetrexed				更新日	2020/3/18																		
					1クール	21日間																		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																				
デキサート注射液 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴末梢	15分	↓																				
アリムタ注射液 生理食塩液	500mg/m <sup>2</sup> 50mL	点滴末梢	10分以上	↓																				

備考：アリムタ投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CBDCA+nab PTX													更新日	2020/3/18							
														1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	8	15	21															
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓														
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	3mg/100mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																		
デキサート注射液 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴末梢	15分			↓		↓														
アブラキサン点滴静注用 カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	100mg/m <sup>2</sup> AUC=6 250mL	点滴末梢	30分 1時間	↓		↓		↓														

備考：

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CBDCA+PTX+BEV				更新日		2020/3/18													
					1クール		21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																
デキサート注射液	16.5mg																			
ガスター注射液	20mg																			
パクリタキセル注	200mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	3時間	↓																
生理食塩液	500mL																			
カルボプラチン注射液	AUC=6	点滴末梢	1時間	↓																
ブドウ糖液5%	250mL																			
アバチン点滴静注用	15mg/kg	点滴末梢	30~90分	↓																
生理食塩液	100mL																			
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																

備考：

レジメン名	NSCLC BEV				更新日		2020/3/18													
					1クール		21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
アバチン点滴静注用	15mg/kg	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			

備考：

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CBDCA+PTX				更新日		2020/3/18													
					1クール		21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液 ガスター注射液	1mg/50mL 16.5mg 20mg	点滴末梢	30分	↓																
パクリタキセル注 生理食塩液	200mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	3時間	↓																
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=6 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																

備考：

レジメン名	NSCLC weeklyCBDCA+PTX				更新日		2020/3/18													
					1クール		7日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	7														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液 ガスター注射液	1mg/50mL 9.9mg 20mg	点滴末梢	30分	↓																
パクリタキセル注 生理食塩液	40mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=2 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																

備考：放射線併用（6コースまで）

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CBDCA+DTX				更新日															
					1クール		21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																
ドセタキセル点滴静注 ブドウ糖液5%	60mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=6 250mL	点滴末梢	1時間	↓																

備考：





# 非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CDDP+DTX													更新日	2020/3/18										
														1クール	21日間										
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																					
				1	2	3	4	・	21																
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																					
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	メイン		↓	↓																			
ソルデム3A輸液	200mL	点滴末梢	メイン				↓																		
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	↓																					
硫酸Mg補正液	8mEq	点滴末梢	1時間	↓																					
アロキシ点滴静注	0.75mg	点滴末梢	15分	↓																					
デキサート注射液	9.9mg	点滴末梢	15分		↓	↓	↓																		
デキサート注射液	3.3mg	点滴末梢	15分		↓	↓	↓																		
生理食塩液	50mL	点滴末梢	15分		↓	↓	↓																		
ドセタキセル点滴静注	60mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	1時間	↓																					
生理食塩液	250mL	点滴末梢	1時間	↓																					
20%マンニトール注射液	200mL	点滴末梢	30分	↓																					
シスプラチン点滴静注液	80mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	2時間	↓																					
生理食塩液	500mL	点滴末梢	2時間	↓																					
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	×2	↓																				

備考：

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CBDCA+S-1				更新日	2020/3/18													
					1クール	21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	14	.	21											
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓															
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	1時間	↓															
カルボプラチン注射液	AUC=5	点滴末梢	1時間	↓															
ブドウ糖液5%	250mL																		
S-1	80mg/m <sup>2</sup>	内服	1日2回	day1~14服用															

備考：

レジメン名	NSCLC CDDP+S-1				更新日	2020/3/18													
					1クール	35日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	8	9	10	11	.	21	.	35						
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン			↓													
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	メイン				↓	↓											
ソルデム3A輸液	200mL	点滴末梢	メイン						↓										
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間			↓													
硫酸Mg補正液	8mEq	点滴末梢	1時間			↓													
アロキシ点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	15分			↓													
デキサート注射液	9.9mg	点滴末梢	15分																
デキサート注射液	3.3mg	点滴末梢	15分				↓	↓	↓										
生理食塩液	50mL																		
20%マンニトール注射液	200mL	点滴末梢	30分			↓													
シスプラチン点滴静注液	80mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	2時間			↓													
生理食塩液	500mL																		
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間			×2	↓												
S-1	80mg/m <sup>2</sup>	内服	1日2回	day1~21服用															
アプレピタントカプセル		内服	指示通り			↓	↓	↓											

備考：

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名		NSCLC BEV+Erl				更新日		2020/3/18												
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日															
生理食塩液		100mL	点滴末梢	メイン	↓	1	.	21												
アバスタン点滴静注用		15mg/kg	点滴末梢	30~90分	↓															
生理食塩液		100mL																		
タルセバ錠		150mg	内服	1日1回		連日内服														

備考：

レジメン名		NSCLC RAM+Erl				更新日		2021/11/24												
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日															
生理食塩液		250mL	点滴末梢	メイン	↓	1	.	14												
サイラムザ点滴静注液		10mg/kg	点滴末梢	30~60分	↓															
生理食塩液		250mL																		
タルセバ錠		150mg	内服	1日1回		連日内服														

備考：前投薬として抗ヒスタミン剤を使用（経口薬も可）

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CDDP+VNR				更新日		2020/3/18															
					1クール		21日間															
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	3	4	5	8	21												
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																		
ソルデム3 A輸液	500mL	点滴末梢	メイン		↓	↓																
ソルデム3 A輸液	200mL	点滴末梢	メイン				↓			↓												
ソルデム3 A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	↓																		
硫酸Mg補正液	8mEq	点滴末梢	1時間	↓																		
アロキシ点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																		
デキサート注射液	9.9mg	点滴末梢	15分		↓	↓	↓															
生理食塩液	50mL	点滴末梢	15分		↓	↓	↓															
ロゼウス静注液	25mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	全開	↓						↓												
生理食塩液	50mL	点滴末梢	全開	↓						↓												
20%マンニトール注射液	200mL	点滴末梢	30分	↓																		
シスプラチン点滴静注液	80mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	2時間	↓																		
生理食塩液	500mL	点滴末梢	2時間	↓																		
ソルデム3 A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	×2	×1																	

備考:

レジメン名	NSCLC GEM+VNR				更新日		2020/3/18															
					1クール		21日間															
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	8	21																
ソルデム3 A輸液	200mL	点滴末梢	メイン	↓		↓																
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分	↓		↓																
生理食塩液	50mL	点滴末梢	15分	↓		↓																
ロゼウス静注液	25mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	全開	↓		↓																
生理食塩液	50mL	点滴末梢	全開	↓		↓																
ゲムシタピン点滴静注	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	30分	↓		↓																
ブドウ糖液5%	100mL	点滴末梢	30分	↓		↓																

備考:

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC DTX													更新日						
														1クール	2020/3/18 21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
ソルデム3A輸液	200mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓																
ドセタキセル点滴静注 生理食塩液	60mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	2時間	↓																

備考：

レジメン名	NSCLC nab PTX													更新日						
														1クール	2021/11/24 21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	8	.	15	.	21										
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓												
デキサート注射液 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓												
アブラキサン点滴静注用 生理食塩液	100mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓		↓												

備考：

レジメン名	NSCLC GEM													更新日						
														1クール	2020/3/18 21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	8	.	21												
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
デキサート注射液 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓														
ゲムシタビン点滴静注 ブドウ糖液5%	1000mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓														

備考：

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名		NSCLC VNR												更新日		2020/3/18						
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
					1	.	8	.	21													
生理食塩液		100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓															
ロゼウス静注液		25mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	全開	↓		↓															
生理食塩液		50mL																				

備考：

レジメン名		NSCLC AMR(non-small)												更新日		2020/3/18						
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
					1	2	3	.	21													
生理食塩液		100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓															
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液		1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓	↓	↓															
カルセド注射用 生理食塩液		40MG/m <sup>2</sup> 50mL	点滴末梢	全開	↓	↓	↓															

備考：