

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CDDP+Pemetrexed+Pembro				更新日															
					1クール	2022/9/27	21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	3	4	・	21											
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			
ソルデム3 A輸液	500mL	点滴末梢	メイン		↓	↓														
ソルデム3 A輸液	200mL	点滴末梢	メイン				↓													
ソルデム3 A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	↓																
硫酸Mg補正液	8mEq	点滴末梢																		
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																
デキサート注射液	9.9mg	点滴末梢																		
デキサート注射液	3.3mg	点滴末梢	15分		↓	↓	↓													
生理食塩液	50mL																			
ペメトレキセド点滴静注液	500MG/m ²	点滴末梢	10分以上	↓																
生理食塩液	100mL																			
20%マンニトール注射液	200mL	点滴末梢	30分	↓																
シスプラチン点滴静注液	75mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																
生理食塩液	500mL																			
ソルデム3 A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	×2	↓															
アプレピタントカプセル		内服	指示通り	↓	↓	↓														

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

レジメン名	NSCLC Pemetrexed+Pembro				更新日																
					1クール	2020/3/18	21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	21															
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																	
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓																	
生理食塩液	100mL																				
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分	↓																	
生理食塩液	50mL																				
ペメトレキセド点滴静注液	500mg/m ²	点滴末梢	10分以上	↓																	
生理食塩液	100mL																				

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC Pembro(3週毎)				更新日															
					1クール	21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
キイトルーダ点滴静注	200mg/body	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			

備考：

レジメン名	NSCLC Pembro(6週毎)				更新日															
					1クール	42日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	42														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
キイトルーダ点滴静注	400mg/body	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			

備考：

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CBDCA+PTX+IPI+NIVO			更新日													
				1クール	2022/5/19 42日間												
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日													
				1	22	42											
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓											
オプジーボ点滴静注	360mg	点滴末梢	30分	↓		↓											
生理食塩液	100mL																
ヤーボイ点滴静注液	1mg/kg	点滴末梢	30分	↓													
生理食塩液	50mL																
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL																
デキサート注射液	16.5mg	点滴末梢	30分	↓		↓											
ガスター注射液	20mg																
パクリタキセル注	200mg/m ²	点滴末梢	3時間	↓		↓											
生理食塩液	500mL																
カルボプラチン注射液	AUC=6	点滴末梢	1時間	↓		↓											
ブドウ糖液5%	250mL																
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓		↓											

備考：

レジメン名	NSCLC CBDCA+PTX+BEV+Atezo			更新日													
				1クール	2020/3/18 21日間												
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日													
				1	21												
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓													
テセントリク点滴静注	1200mg	点滴末梢	30~60分	↓													
生理食塩液	250mL																
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL																
デキサート注射液	16.5mg	点滴末梢	30分	↓													
ガスター注射液	20mg																
パクリタキセル注	175mg/m ²	点滴末梢	3時間	↓													
生理食塩液	500mL																
カルボプラチン注射液	AUC=6	点滴末梢	1時間	↓													
ブドウ糖液5%	250mL																
ベバシズマブBS点滴静注	15mg/kg	点滴末梢	30~90分	↓													
生理食塩液	100mL																
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓													

備考：

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名		NSCLC Atezo				更新日		2020/3/13												
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日															
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓	1	.	21													
テセントリク点滴静注	1200mg	点滴末梢	30~60分	↓																
生理食塩液	250mL																			

備考：

レジメン名		NSCLC Atezo (術後)				更新日		2022/9/27												
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日															
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓	1	.	21													
テセントリク点滴静注	1200mg	点滴末梢	30~60分	↓																
生理食塩液	250mL																			

備考：最大16コース

レジメン名		NSCLC NIVO(240mg/body:2週毎)				更新日		2020/3/18												
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日															
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓	1	.	14													
オブジーボ点滴静注	240mg	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			

備考：

レジメン名		NSCLC NIVO(480mg/body:4週毎)				更新日		2021/3/23												
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日															
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓	1	.	28													
オブジーボ点滴静注	480mg	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			

備考：

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名		NSCLC IPI+NIVO(240mg/body:2週毎)							更新日	2021/11/24									
									1クール	42日間									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	15	・	29	・	42									
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓															
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン			↓		↓											
オプジーボ点滴静注	240mg	点滴末梢	30分	↓		↓		↓											
生理食塩液	100mL																		
ヤーボイ点滴静注液	1mg/kg	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	50mL																		

備考：

レジメン名		NSCLC IPI+NIVO(360mg/body:3週毎)							更新日	2021/11/24										
									1クール	42日間										
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	22	・	42												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン			↓														
オプジーボ点滴静注	360mg	点滴末梢	30分	↓		↓														
生理食塩液	100mL																			
ヤーボイ点滴静注液	1mg/kg	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	50mL																			

備考：

レジメン名		NSCLC Durvalumab							更新日	2020/3/13										
									1クール	14日間										
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	14														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
イミフィンジ点滴静注	10mg/kg	点滴末梢	1時間	↓																
生理食塩液	100mL																			

備考：

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CBDCA+Pemetrexed				更新日	2020/3/18																			
					1クール	21日間																			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																					
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																					
ペメトレキセド点滴静注液 生理食塩液	500mg/m ² 100mL	点滴末梢	10分以上	↓																					
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																					

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

レジメン名	NSCLC CDDP+Pemetrexed				更新日	2020/3/18																			
					1クール	21日間																			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																					
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	メイン		↓	↓																			
ソルデム3A輸液	200mL	点滴末梢	メイン				↓																		
ソルデム3A輸液 硫酸Mg補正液	500mL 8mEq	点滴末梢	1時間	↓																					
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 9.9mg	点滴末梢	15分	↓																					
デキサート注射液 生理食塩液	3.3mg 50mL	点滴末梢	15分		↓	↓	↓																		
ペメトレキセド点滴静注液 生理食塩液	500MG/m ² 100mL	点滴末梢	10分以上	↓																					
20%マンニトール注射液	200mL	点滴末梢	30分	↓																					
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	75mg/m ² 500mL	点滴末梢	2時間	↓																					
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	×2	↓																				
アプレピタントカプセル		内服	指示通り	↓	↓	↓																			

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名		NSCLC Pemetrexed											更新日	2020/3/18							
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																
					1	.	21														
生理食塩液		100mL	点滴末梢	メイン	↓																
デキサート注射液		6.6mg	点滴末梢	15分	↓																
生理食塩液		50mL																			
ペメトレキセド点滴静注液		500mg/m ²	点滴末梢	10分以上	↓																
生理食塩液		100mL																			

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

レジメン名		NSCLC CBDCA+nab PTX											更新日	2020/3/18							
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																
					1	.	8	.	15	.	21										
生理食塩液		250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓												
グラニセトロン点滴静注		3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																
デキサート注射液		6.6mg	点滴末梢	15分			↓		↓												
生理食塩液		50mL																			
アブラキサン点滴静注用		100mg/m ²	点滴末梢	30分	↓		↓		↓												
生理食塩液		100mL																			
カルボプラチン注射液		AUC=6	点滴末梢	1時間	↓																
ブドウ糖液5%		250mL																			

備考：

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名		NSCLC CBDCA+PTX												更新日	2020/3/18								
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
					1	.	21																
ラクテック注		500mL	点滴末梢	メイン	↓																		
グラニセトロン点滴静注		1mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																		
デキサート注射液		16.5mg																					
ガスター注射液		20mg																					
パクリタキセル注		200mg/m ²	点滴末梢	3時間	↓																		
生理食塩液		500mL																					
カルボプラチン注射液		AUC=6	点滴末梢	1時間	↓																		
ブドウ糖液5%		250mL																					
レスタミンコーワ錠		50mg	内服	投与前	↓																		

備考：

レジメン名		NSCLC weeklyCBDCA+PTX												更新日	2020/3/18								
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
					1	.	7																
生理食塩液		250mL	点滴末梢	メイン	↓																		
グラニセトロン点滴静注		1mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																		
デキサート注射液		9.9mg																					
ガスター注射液		20mg																					
パクリタキセル注		40mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓																		
生理食塩液		250mL																					
カルボプラチン注射液		AUC=2	点滴末梢	1時間	↓																		
ブドウ糖液5%		250mL																					
レスタミンコーワ錠		50mg	内服	投与前	↓																		

備考：放射線併用（6コースまで）

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC BEV+Erl			更新日	2020/3/18														
				1クール	21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
ベバシズマブBS点滴静注	15mg/kg	点滴末梢	30~90分	↓															
生理食塩液	100mL																		
タルセバ錠	150mg	内服	1日1回		連日内服														

備考：

レジメン名	NSCLC RAM+Erl			更新日	2021/11/24														
				1クール	14日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	14													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓															
サイラムザ点滴静注液	10mg/kg	点滴末梢	30~60分	↓															
タルセバ錠	150mg	内服	1日1回		連日内服														

備考：前投薬として抗ヒスタミン剤を使用（経口薬も可）

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名		NSCLC CDDP+VNR											更新日		2020/3/18						
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																
					1	2	3	4	5	8	21										
生理食塩液		500mL	点滴末梢	メイン	↓																
ソルデム3A輸液		500mL	点滴末梢	メイン		↓	↓														
ソルデム3A輸液		200mL	点滴末梢	メイン				↓			↓										
ソルデム3A輸液 硫酸Mg補正液		500mL 8mEq	点滴末梢	1時間	↓																
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液		0.75mg/50mL 9.9mg	点滴末梢	15分	↓																
デキサート注射液 生理食塩液		3.3mg 50mL	点滴末梢	15分		↓	↓	↓													
ロゼウス静注液 生理食塩液		25mg/m ² 50mL	点滴末梢	全開	↓						↓										
20%マンニトール注射液		200mL	点滴末梢	30分	↓																
シスプラチン点滴静注 生理食塩液		80mg/m ² 500mL	点滴末梢	2時間	↓																
ソルデム3A輸液		500mL	点滴末梢	1時間	×2	×1															

備考：

レジメン名		NSCLC GEM+VNR											更新日		2020/3/18						
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																
					1	8	21														
ソルデム3A輸液		200mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
デキサート注射液 生理食塩液		6.6mg 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓														
ロゼウス静注液 生理食塩液		25mg/m ² 50mL	点滴末梢	全開	↓		↓														
ゲムシタピン点滴静注 ブドウ糖液5%		1000mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓														

備考：

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC DTX				更新日															
					1クール	2020/3/18	21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
ソルデム3 A 輸液	200mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓																
ドセタキセル点滴静注 生理食塩液	60mg/m ² 500mL	点滴末梢	2時間	↓																

備考：

レジメン名	NSCLC nab PTX				更新日															
					1クール	2021/11/24	21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	8	.	15	.	21										
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓			↓			↓										
デキサート注射液 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴末梢	15分	↓			↓			↓										
アブラキサン点滴静注用 生理食塩液	100mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓			↓			↓										

備考：

レジメン名	NSCLC GEM				更新日															
					1クール	2020/3/18	21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	8	.	21												
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓			↓													
デキサート注射液 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴末梢	15分	↓			↓													
ゲムシタピン点滴静注 ブドウ糖液5%	1000mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓			↓													

備考：

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC VNR				更新日															
					1クール		21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	21												
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
ロゼウス静注液	25mg/m ²	点滴末梢	全開	↓		↓														
生理食塩液	50mL																			

備考：

レジメン名	NSCLC AMR(non-small)				更新日															
					1クール		21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	3	・	21												
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓														
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓	↓	↓														
デキサート注射液	6.6mg																			
カルセド注射用	40MG/m ²	点滴末梢	全開	↓	↓	↓														
生理食塩液	50mL																			

備考：