

悪性胸膜中皮腫

レジメン名	CBDCA+Pemetrexed										更新日	2020/3/18								
											1クール	21日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢																		
アリムタ注射液	500mg/m ²	点滴末梢	10分	↓																
生理食塩液	50mL																			
カルボプラチン注射液	AUC=5	点滴末梢	1時間	↓																
ブドウ糖液 5%	250mL																			

備考：アリムタ投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタンで）。ビタミンB12 1mgの注射も7日前以前に行い、9週ごとに投与を継続。

レジメン名	中皮腫 NIVO(240mg/body:2週毎)										更新日	2021/11/26								
											1クール	14日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	14														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
オブジーボ点滴静注	240mg	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			

備考：

レジメン名	中皮腫 NIVO(480mg/body:4週毎)										更新日	2021/11/26								
											1クール	28日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	28														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
オブジーボ点滴静注	480mg	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			

備考：