悪性胸膜中皮腫

レジメン名	CBDCA＋Pemetrexed			更新日	2020/3/18
				1クール	21日間

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日 1	・	21																		
ソルデム３Ａ輸液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																				
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																				
ペメトレキセド点滴静注液 生理食塩液	500mg/㎡ 100mL	点滴末梢	10分以上	↓																				
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液５%	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																				

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタンで）。ビタミンB12 1mgの注射も7日前以前に行い、9週ごとに投与を継続。

レジメン名	中皮腫 NIVO(240mg/body:2週毎)			更新日	2021/11/26
				1クール	14日間

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日 1	・	14																		
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																				
オプジーボ点滴静注 生理食塩液	240mg 100mL	点滴末梢	30分	↓																				

備考：

レジメン名	中皮腫 NIVO(480mg/body:4週毎)			更新日	2021/11/26
				1クール	28日間

薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日 1	・	28																		
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																				
オプジーボ点滴静注 生理食塩液	480mg 100mL	点滴末梢	30分	↓																				

備考：