

悪性胸膜中皮腫

レジメン名	CBDCA+Pemetrexed				更新日															
					1クール		21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																
ペメトレキセド点滴静注液 生理食塩液	500mg/m ² 100mL	点滴末梢	10分以上	↓																
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタンで）。ビタミンB12 1mgの注射も7日前以前に行い、9週ごとに投与を継続。

レジメン名	中皮腫 NIVO(240mg/body:2週毎)				更新日															
					1クール		14日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	14														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
オブジーボ点滴静注 生理食塩液	240mg 100mL	点滴末梢	30分	↓																

備考：

レジメン名	中皮腫 NIVO(480mg/body:4週毎)				更新日															
					1クール		28日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	28														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
オブジーボ点滴静注 生理食塩液	480mg 100mL	点滴末梢	30分	↓																

備考：

