

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名		MM DLd-1											更新日		2020/3/18			
													1クール		28日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日														
				1	8	15	22	28										
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓								
ソル・コーテフ注射用 生理食塩液	300mg 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓		↓								
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 1L	点滴末梢	指示通り	↓														
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り			↓		↓		↓								
レブラミドカプセル	~25mg	内服		day1~21														

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日及び翌日に内服。
喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名		MM DLd-2											更新日		2020/3/25			
													1クール		28日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日														
				1	8	15	22	28										
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓								
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓		↓		↓		↓								
レブラミドカプセル	~25mg	内服		day1~21														

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日及び翌日に内服。
喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM DLd-3~6										更新日									
											2020/3/25									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	15	.	.	.	22	.	28								
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓			↓													
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓			↓													
レブラミドカプセル	~25mg	内服		day1~21																

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日及び翌日に内服。
喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM DLd-7~										更新日									
											2020/3/18									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	22	.	28								
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓																
レブラミドカプセル	~25mg	内服		day1~21																

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日及び翌日に内服。
喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名		MM DLd-1~2(SC)											更新日	2021/6/15							
													1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	8	15	22	28													
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓		↓		↓		↓											
レブラミドカプセル	~25mg	内服		day1~21																	

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日及び翌日に内服。
喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名		MM DLd-3~6(SC)											更新日	2021/6/15							
													1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	8	15	22	28													
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓		↓															
レブラミドカプセル	~25mg	内服		day1~21																	

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日及び翌日に内服。
喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名		MM DLd-7~(SC)											更新日	2021/6/15							
													1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	8	15	22	28													
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓																	
レブラミドカプセル	~25mg	内服		day1~21																	

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日及び翌日に内服。
喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名		MM DBd-1											更新日		2020/3/18							
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
					1	4	8	11	15	21												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓			↓		↓													
ソル・コーテフ注射用 生理食塩液	300mg 50mL	点滴末梢	15分	↓			↓		↓													
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 1L	点滴末梢	指示通り	↓																		
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り				↓		↓													
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓		↓	↓		↓													

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日・ベルケイド投与日及び翌日に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名		MM DBd-2~3											更新日		2020/3/18							
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
					1	4	8	11	15	21												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓			↓		↓													
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓			↓		↓													
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓		↓	↓		↓													

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日・ベルケイド投与日及び翌日に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM DBd-4~8											更新日								
												2020/3/18								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	4	8	11	21												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓																
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓		↓		↓		↓										

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日・ベルケイド投与日及び翌日に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM DBd-9~											更新日								
												2020/3/18								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	28															
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓																

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日と翌日に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM KdD-1(SC)													更新日	2021/6/15							
														1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	・	8	9	・	15	16	・	22	・	28							
ブドウ糖液5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓											
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液5%	20mg/m ² 40mL 100mL	点滴末梢	30分	↓	↓																	
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液5%	56mg/m ² 60mL 100mL	点滴末梢	30分				↓	↓		↓	↓											
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓			↓			↓			↓									

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠はday1.2、8.9、15.16、22.23に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM KdD-2(SC)													更新日	2021/6/15							
														1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	・	8	9	・	15	16	・	22	・	28							
ブドウ糖液5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓											
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液5%	56mg/m ² 60mL 100mL	点滴末梢	30分	↓	↓		↓	↓		↓	↓											
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓			↓			↓			↓									

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠はday1.2、8.9、15.16、22.23に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM KdD-3~6(SC)													更新日	2021/6/15							
														1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	・	8	9	・	15	16	・	28									
ブドウ糖液5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓											
カイプロリス点滴静注用 注射用水	56mg/m ² 60mL	点滴末梢	30分	↓	↓		↓	↓		↓	↓											
ブドウ糖液5%	100mL																					
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓							↓											

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠はday1.2、8.9、15.16、22.23に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM KdD-7~(SC)													更新日	2021/6/15							
														1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	・	8	9	・	15	16	・	28									
ブドウ糖液5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓											
カイプロリス点滴静注用 注射用水	56mg/m ² 60mL	点滴末梢	30分	↓	↓		↓	↓		↓	↓											
ブドウ糖液5%	100mL																					
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓																		

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠はday1.2、8.9、15.16、22.23に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM Dara-BMP-1													更新日	2020/3/18				
														1クール	42日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	4	8	11	15	22	25	29	32	36						
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓			↓				↓		↓			↓			↓
ソル・コーテフ注射用 生理食塩液	300mg 50mL	点滴末梢	15分	↓			↓												
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 1L	点滴末梢	指示通り	↓															
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り				↓				↓		↓			↓			↓
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射	—	↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓	
アルケラン錠	9mg/m ²	内服		day1~4															
プレドニン錠	60mg/m ²	内服		day2~4															

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM Dara-BMP-1(SC)				更新日														
					1クール	2021/6/15 42日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	4	8	11	15	22	25	29	32	36						
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓			↓				↓		↓			↓			↓
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓	
アルケラン錠	9mg/m ²	内服		day1~4															
プレドニン錠	60mg/m ²	内服		day2~4															

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM Dara-BMP-2~9(SC)				更新日														
					1クール	2021/6/15 42日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	4	8	22	29	42										
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓				↓											
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓		↓		↓		↓									
アルケラン錠	9mg/m ²	内服		day1~4															
プレドニン錠	60mg/m ²	内服		day2~4															

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM Dara-BMP-★10~(SC)				更新日														
					1クール	2021/6/15 28日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	28														
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓															

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM EPd-1										更新日								
											2020/3/26								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	8	15	22	28											
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓									
デキサート注射液 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓		↓									
エムプリシティ点滴静注用 注射用水 生理食塩液	10mg/kg 40mL 250mL	点滴末梢	指示通り	↓		↓		↓		↓									
ポマリストカプセル	1~4mg	内服	指示通り	day1~21															

備考：エムプリシティ投与前に抗ヒスタミン剤・ガスター注投与、カロナール錠内服。デキサメタゾン併用。

レジメン名	MM EPd-2										更新日								
											2020/3/26								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	8	15	22	28											
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓									
デキサート注射液 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓		↓									
エムプリシティ点滴静注用 注射用水 生理食塩液	10mg/kg 40mL 250mL	点滴末梢	指示通り	↓		↓		↓		↓									
ポマリストカプセル	1~4mg	内服	指示通り	day1~21															

備考：エムプリシティ投与前に抗ヒスタミン剤・ガスター注投与、カロナール錠内服。デキサメタゾン併用。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM EPd-3~				更新日	2020/3/26														
					1クール	28日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	21	.	28									
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分	↓																
生理食塩液	50mL																			
エムプリシティ点滴静注用	20mg/kg	点滴末梢	指示通り	↓																
注射用水	60mL																			
生理食塩液	250mL																			
ポマリストカプセル	1~4mg	内服	指示通り		day1~21															

備考：エムプリシティ投与前に抗ヒスタミン剤・ガスター注投与、カロナール錠内服。デキサメタゾン併用。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM ELd-1 (Elotuzumab-1)				更新日	2020/3/26														
					1クール	28日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	8	15	22	28												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓										
ソル・コーテフ注射用 生理食塩液	100mg 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓		↓										
エムプリシティ点滴静注用 注射用水 生理食塩液	10mg/kg 40mL 250mL	点滴末梢	指示通り	↓		↓		↓		↓										
レブラミドカプセル	~25mg	内服	指示通り	day1~21																

備考：エムプリシティ投与前に抗ヒスタミン剤・ガスター注投与、カロナール錠内服。デキサメタゾン併用。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM ISaPd-1										更新日									
											1クール		28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	8	15	22	28												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓										
デキサート注射液 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓		↓										
サークリサ点滴静注 生理食塩液	10mg/kg 250mL	点滴末梢	指示通り	↓		↓		↓		↓										
ポマリストカプセル	~4mg 1日1回	内服	指示通り	day1~21																

備考：サークリサ投与前に解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤・H2受容体拮抗剤等を投与。デキサメタゾン併用。

レジメン名	MM ISaPd-2~										更新日									
											1クール		28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	15	22	28													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
サークリサ点滴静注 生理食塩液	10mg/kg 250mL	点滴末梢	指示通り	↓		↓														
ポマリストカプセル	~4mg 1日1回	内服	指示通り	day1~21																

備考：サークリサ投与前に解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤・H2受容体拮抗剤等を投与。デキサメタゾン併用。