

Ph陽性急性リンパ性白血病(Ph+ALL)

レジメン名	Ph+ALL208寛解導入1(15~59歳 D1~7)							更新日	2020/3/17			
								1クール	7日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日								
				1	2	3	4	5	6	7		
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	中心静脈	1時間	↓								day8以降は寛解導入2に移行
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	中心静脈	1時間		↓	↓						
ダウノマイシン静注用 生理食塩液	60mg/m ² 100mL	中心静脈	1時間	↓	↓	↓						
注射用エンドキサン 生理食塩液	1200mg/m ² 500mL	中心静脈	3時間	↓								
オンコビン注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	中心静脈	ワンショット	↓								
ソルデム3A輸液 メイロン7%	500mL 10mL	中心静脈	メイン	×6	×6	×6	×2					
ソルデム3A輸液	500mL	中心静脈	メイン				×3	×4	×3	×3		
プレドニン錠	60mg/m ²	内服	朝食後	day1~7								

備考:

レジメン名	Ph+ALL208寛解導入2(15~59歳 D8~42)											更新日	2020/3/17							
												1クール	35日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	8	15	22	35												
生理食塩液	100mL	中心静脈	メイン	↓		↓		↓												
オンコビン注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	中心静脈	ワンショット	↓		↓		↓												
キロサイド注 メソトレキセート〔注射用〕 デキサート注射液 生理食塩液	40mg 15mg 3.3mg 2mL	脳脊髄腔 注射																		
プレドニン錠	60mg/m ²	内服	朝食後	day1~14																
イマチニブ錠	600mg	内服		day1~35																

備考: プレドニン錠はday14まで内服後、1週間で漸減中止。day32~35はダイフェン錠の内服をしない。

Ph陽性急性リンパ性白血病(Ph+ALL)

レジメン名	Ph+ALL208地固め (1, 3, 5, 7)(15-59歳)											更新日	2020/4/1																							
												1クール	28日間																							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																																
				1	2	3	4	・	・	22	・	28																								
ソルデム3 A 輸液 メイロン7%	500mL 40mL	中心静脈	メイン	×1																																
ソルデム3 A 輸液 メイロン7%	500mL 20mL	中心静脈	メイン	×3	×4	×4	×3																													
ソルデム3 A 輸液	500mL	中心静脈	メイン				↓																													
アロキシ点滴静注	0.75mg	中心静脈	指示通り	↓																																
ソル・メドロール静注用 生理食塩液	50mg 20mL	中心静脈	ワンショット	×2	×2	×2																														
メソトレキセート 生理食塩液	100mg/m ² 250mL	中心静脈	1時間	↓																																
メソトレキセート 生理食塩液	900mg/m ² 500mL	中心静脈	23時間	↓																																
シタラビン点滴静注液 生理食塩液	2000mg/m ² 500mL	中心静脈	3時間		↓	↓																														
シタラビン点滴静注液 生理食塩液	2000mg/m ² 500mL	中心静脈	3時間		↓	↓																														
キロサイド注 メソトレキセート〔注射用〕 デキサート注射液 生理食塩液	40mg 15mg 3.3mg 2mL	脳脊髄腔注射		↓																																
ロイコボリン注	15mg	中心静脈	ワンショット		×1	×4	×3																													
生食点眼液 フルメトロン点眼液0.02%	両眼 1回2滴	点眼	1日4回		day2開始																															
イマチニブ錠	600mg	内服					day4~21																													

備考：

Ph陽性急性リンパ性白血病(Ph+ALL)

レジメン名	Ph+ALL208地固め (2, 4. 6. 8)											更新日	2020/4/1							
												1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	.	.	8	.	22	.	28								
ソルデム3A輸液	200mL	点滴末梢	メイン	↓																
プレドニン グラニセトロン点滴静注液	60mg/m ² 3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																
ダウノマイシン静注用 生理食塩液	60mg/m ² 100mL	点滴末梢	1時間	↓																
オンコピン注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	点滴末梢	ワンショット	↓																
注射用エンドキサン 生理食塩液	1200mg/m ² 500mL	点滴末梢	3時間	↓																
キロサイド注 メソトレキセート〔注射用〕 デキサート注射液 生理食塩液	40mg 15mg 3.3mg 2mL	脳脊髄腔 注射		↓																
プレドニン錠	60mg/m ²	内服	朝食後		day2~7															
イマチニブ錠	600mg	内服			day2~21															

備考：プレドニン錠はday2~7まで内服後、1週間で漸減中止。day25~28はダイフェン錠の内服をしない。