

急性リンパ性白血病(ALL)

| レジメン名 | Ph+ALL208寛解導入1(15~59歳 D1~7) | | | | 投与日 | | | | | | | 更新日 | 2020/3/17 |
|---------------------|--------------------------------|------|--------|--------|-----|----|----|----|----|----|-----------------|------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | 1クール | 7日間 |
| 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | day8以降は寛解導入2に移行 | | |
| グラニセトロン点滴静注 | 3mg/100mL | 中心静脈 | 1時間 | ↓ | | | | | | | | | |
| グラニセトロン点滴静注 | 1mg/50mL | 中心静脈 | 1時間 | | ↓ | ↓ | | | | | | | |
| ダウノマイシン静注用 生理食塩液 | 60mg/m ² 100mL | 中心静脈 | 1時間 | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | |
| 注射用エンドキサン 生理食塩液 | 1200mg/m ² 500mL | 中心静脈 | 3時間 | ↓ | | | | | | | | | |
| オンコビン注射用 生理食塩液 | 1.3mg/m ² 20mL | 中心静脈 | ワンショット | ↓ | | | | | | | | | |
| ソルデム3A輸液 メイロン7% | 500mL 10mL | 中心静脈 | メイン | ×6 | ×6 | ×6 | ×2 | | | | | | |
| ソルデム3A輸液 | 500mL | 中心静脈 | メイン | | | | ×3 | ×4 | ×3 | ×3 | | | |
| プレドニン錠 | 60mg/m ² | 内服 | 朝食後 | day1~7 | | | | | | | | | |

備考:

| レジメン名 | Ph+ALL208寛解導入2(15~59歳 D8~42) | | | | 投与日 | | | | | | | | | | | | | | 更新日 | 2020/3/17 |
|--|------------------------------|------------|--------|---------|-----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1クール | 35日間 |
| 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 1 | 8 | 15 | 22 | 35 | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 100mL | 中心静脈 | メイン | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | | | | | | | | | | |
| オンコビン注射用 生理食塩液 | 1.3mg/m ² 20mL | 中心静脈 | ワンショット | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | | | | | | | | | | |
| キロサイド注 メソトレキセート〔注射用〕 デキサート注射液 生理食塩液 | 40mg 15mg 3.3mg 2mL | 脳脊髄腔 注射 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プレドニン錠 | 60mg/m ² | 内服 | 朝食後 | day1~14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イマチニブ錠 | 600mg | 内服 | | day1~35 | | | | | | | | | | | | | | | | |

備考: プレドニン錠はday14まで内服後、1週間で漸減中止。day32~35はダイフェン錠の内服をしない。

急性リンパ性白血病(ALL)

| レジメン名 | InO-1 | | | | 投与日 | | | | | | | | | | | | | | 更新日 | 2022/5/19 |
|--------------------|------------------------------|------|------|---|-----|----|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1クール | 28日間 |
| 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 1 | 8 | 15 | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 250mL | 点滴末梢 | メイン | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | | | | | | | | | | |
| ベスポンサ点滴静注用 注射用水 | 0.8mg/m ² 20mL | 点滴末梢 | 1時間 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベスポンサ点滴静注用 注射用水 | 0.5mg/m ² 20mL | 点滴末梢 | 1時間 | | | ↓ | | ↓ | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アセトアミノフェン錠 | 500mg | 内服 | 投与前 | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | | | | | | | | | | |
| d-クロルフェニラミン錠 | 2mg | 内服 | 投与前 | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | | | | | | | | | | |

備考：原則21日間。寛解が得られた場合は28日まで延長可能。 投与前に副腎皮質ステロイド（ソルコーテフなど）投与。

| レジメン名 | InO-2~6 | | | | 投与日 | | | | | | | | | | | | | | 更新日 | 2022/5/19 |
|--------------------|------------------------------|------|------|---|-----|----|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1クール | 28日間 |
| 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 1 | 8 | 15 | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 100mL | 点滴末梢 | メイン | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | | | | | | | | | | |
| ベスポンサ点滴静注用 注射用水 | 0.5mg/m ² 20mL | 点滴末梢 | 1時間 | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アセトアミノフェン錠 | 500mg | 内服 | 投与前 | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | | | | | | | | | | |
| d-クロルフェニラミン錠 | 2mg | 内服 | 投与前 | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | | | | | | | | | | |

備考：投与前に副腎皮質ステロイド（ソルコーテフなど）投与。