

急性骨髄性白血病(AML)

レジメン名	AML 地固め 1 (MA)													更新日	2020/3/17								
														1クール	28日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	2	3	4	5	6	・	28												
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	中心静脈	1時間	↓	↓	↓																	
キロサイド注 生理食塩液	200mg/m ² 500mL	中心静脈	24時間	↓	↓	↓	↓	↓															
ノバントロン注 生理食塩液	7mg/m ² 100mL	中心静脈	30分	↓	↓	↓																	
ソルデム3 A 輸液	500mL	中心静脈	メイン	×4	×4	×4	×4	×4	×1														

備考：

レジメン名	AML 地固め 2 (DA)													更新日	2020/3/30								
														1クール	21日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	2	3	4	5	6	・	21												
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	中心静脈	1時間	↓	↓	↓																	
キロサイド注 生理食塩液	200mg/m ² 500mL	中心静脈	24時間	↓	↓	↓	↓	↓															
ダウノマイシン静注用 生理食塩液	50mg/m ² 100mL	中心静脈	30分	↓	↓	↓																	
ソルデム3 A 輸液	500mL	中心静脈	メイン	×4	×4	×4	×4	×4	×1														

備考：

急性骨髄性白血病(AML)

レジメン名	AML サルベージCAG(SC)													更新日	2020/3/17					
														1クール	21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	21		
フィルグラスチムBS注シリンジ	200 μ g/m ²	皮下注射		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓				
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	中心静脈	1時間	↓	↓	↓	↓													
アクラシノン注射用 生理食塩液	14mg/m ² 100mL	中心静脈	1時間	↓	↓	↓	↓													
キロサイド注	10mg/m ²	皮下注射	12時間毎	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓				
キロサイド注	10mg/m ²	皮下注射	12時間毎	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓				
ソルデム3A輸液 メイロン7%	500mL 20mL	中心静脈	メイン	×3	×3	×3	×3	×3	×2											
ソルデム3A輸液	500mL	中心静脈	メイン						×1	×2	×2	×2	×2	×2	×2	×2	×2			

備考：

レジメン名	AML LDAC20(10日間)													更新日	2021/11/9					
														1クール	28日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	28						
キロサイド注	20mg/m ²	皮下注射		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							
ベネクレスト錠	100mg	内服	分1	↓																
ベネクレスト錠	200mg	内服	分1		↓															
ベネクレスト錠	400mg	内服	分1			↓														
ベネクレスト錠	600mg	内服	分1																	

備考：1クール目：ベネクレスト錠は用量漸増期あり。2クール目以降：ベネクレスト錠は1日目から維持投与量を服用。