

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	CHOP				更新日																					
					1クール	2020/3/13	21日間																			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																						
				1	2	3	4	5	・	21																
ソルデム 3 A 輸液	200mL	点滴末梢	メイン	↓																						
グラニセトロン点滴静注 プレドニン	3mg/100mL 100mg	点滴末梢	30分	↓																						
ドキシソルピシン塩酸塩注射用 生理食塩液	50mg/m ² 20mL	点滴末梢	ワンショット	↓																						
オンコピン注射用 生理食塩液	1.4mg/m ² 20mL	点滴末梢	ワンショット	↓																						
注射用エンドキサン 生理食塩液	750mg/m ² 250mL	点滴末梢	2時間	↓																						
プレドニン錠	100mg	内服	朝食後		↓	↓	↓	↓	↓																	

備考：

レジメン名	リツキシマブ+CHOP療法				更新日																					
					1クール	2020/3/25	21日間																			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																						
				1	2	3	4	5	・	21																
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																						
リツキシマブBS点滴静注 生理食塩液	375mg/m ² 500mL	点滴末梢	指示通り	↓																						
ソルデム 3 A 輸液	200mL	点滴末梢	メイン		↓																					
グラニセトロン点滴静注 プレドニン	3mg/100mL 100mg	点滴末梢	30分		↓																					
ドキシソルピシン塩酸塩注射用 生理食塩液	50mg/m ² 20mL	点滴末梢	ワンショット		↓																					
オンコピン注射用 生理食塩液	1.4mg/m ² 20mL	点滴末梢	ワンショット		↓																					
注射用エンドキサン 生理食塩液	750mg/m ² 250mL	点滴末梢	2時間		↓																					
プレドニン錠	100mg	内服	朝食後			↓	↓	↓	↓																	

備考：

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	G単剤				更新日															
					1クール		2020/3/25		56日間											
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	56														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
デキサート注射液	3.3mg	点滴末梢	15分	↓																
生理食塩液	50mL	点滴末梢	15分	↓																
ガザイバ点滴静注	1000mg	点滴末梢	指示通り	↓																
生理食塩液	250mL	点滴末梢	指示通り	↓																
カロナール錠	500mg 2錠	内服	治療時	↓																

備考：

レジメン名	G-CHOP療法1				更新日															
					1クール		2020/3/25		21日間											
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	3	4	5	.	8	.	15	.	21						
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
プレドニン	100mg	点滴末梢	15分	↓								↓		↓						
生理食塩液	50mL	点滴末梢	15分	↓								↓		↓						
ガザイバ点滴静注	1000mg	点滴末梢	指示通り	↓								↓		↓						
生理食塩液	250mL	点滴末梢	指示通り	↓								↓		↓						
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																
ドキシルピシン塩酸塩注射用	50mg/m ²	点滴末梢	ワンショット	↓																
生理食塩液	20mL	点滴末梢	ワンショット	↓																
オンコビン注射用	1.4mg/m ²	点滴末梢	ワンショット	↓																
生理食塩液	20mL	点滴末梢	ワンショット	↓																
注射用エンドキサン	750mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																
生理食塩液	250mL	点滴末梢	2時間	↓																
プレドニン錠	100mg	内服	朝食後		↓		↓		↓		↓									
カロナール錠	500mg 2錠	内服	治療時	↓								↓		↓						
ポララミン錠	2mg 1錠	内服	治療時	↓								↓		↓						

備考：前回投与でinfusion reaction発現がなければ、次回からポララミン錠の省略可。

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	G-CHOP療法2~8										更新日	2020/3/25							
											1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	3	4	5	・	21									
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓															
プレドニン	100mg	点滴末梢	15分	↓															
生理食塩液	50mL	点滴末梢																	
ガザイバ点滴静注	1000mg	点滴末梢	指示通り	↓															
生理食塩液	250mL	点滴末梢																	
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓															
ドキシルピシン塩酸塩注射用	50mg/m ²	点滴末梢	ワンショット	↓															
生理食塩液	20mL	点滴末梢																	
オンコピン注射用	1.4mg/m ²	点滴末梢	ワンショット	↓															
生理食塩液	20mL	点滴末梢																	
注射用エンドキサン	750mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓															
生理食塩液	250mL	点滴末梢																	
プレドニン錠	100mg	内服	朝食後		↓	↓	↓	↓											
カロナル錠	500mg 2錠	内服	治療時	↓															

備考：前回投与でinfusion reaction発現がなければ、次回からポララミン錠の省略可。

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	G-CVP療法1													更新日	2020/3/25					
														1クール	21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	3	4	5	8	15	21									
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓							↓		↓							
プレドニン	100mg	点滴末梢	15分	↓							↓		↓							
生理食塩液	50mL	点滴末梢	15分	↓							↓		↓							
ガザイバ点滴静注	1000mg	点滴末梢	指示通り	↓							↓		↓							
生理食塩液	250mL	点滴末梢	指示通り	↓							↓		↓							
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																
オンコビン注射用	1.4mg/m ²	点滴末梢	ワンショット	↓																
生理食塩液	20mL	点滴末梢	ワンショット	↓																
注射用エンドキサン	750mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																
生理食塩液	250mL	点滴末梢	2時間	↓																
プレドニン錠	100mg	内服	朝食後		↓	↓	↓	↓												
カロナール錠	500mg 2錠	内服	治療時	↓							↓		↓							
ポララミン錠	2mg 1錠	内服	治療時	↓							↓		↓							

備考：前回投与でinfusion reaction発現がなければ、次回からポララミン錠の省略可。

レジメン名	G-CVP療法2~8													更新日	2020/3/25					
														1クール	21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	3	4	5	21											
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
プレドニン	100mg	点滴末梢	15分	↓																
生理食塩液	50mL	点滴末梢	15分	↓																
ガザイバ点滴静注	1000mg	点滴末梢	指示通り	↓																
生理食塩液	250mL	点滴末梢	指示通り	↓																
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																
オンコビン注射用	1.4mg/m ²	点滴末梢	ワンショット	↓																
生理食塩液	20mL	点滴末梢	ワンショット	↓																
注射用エンドキサン	750mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																
生理食塩液	250mL	点滴末梢	2時間	↓																
プレドニン錠	100mg	内服	朝食後		↓	↓	↓	↓												
カロナール錠	500mg 2錠	内服	治療時	↓																

備考：前回投与でinfusion reaction発現がなければ、次回からポララミン錠の省略可。

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	GB療法1				投与日																				
					更新日		2020/3/25																		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	1	2	・	8	・	15	・	28														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓		↓																
デキサート注射液	16.5mg	点滴末梢	15分	↓			↓		↓																
生理食塩液	50mL	点滴末梢	15分	↓			↓		↓																
ガザイバ点滴静注	1000mg	点滴末梢	指示通り	↓			↓		↓																
生理食塩液	250mL	点滴末梢	指示通り	↓			↓		↓																
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓	↓																				
トリアキシン点滴静注液	90mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓	↓																				
生理食塩液	250mL	点滴末梢	1時間	↓	↓																				
カロナル錠	500mg 2錠	内服	治療時	↓			↓		↓																
ポララミン錠	2mg 1錠			↓																					

備考：前回投与でinfusion reaction発現がなければ、次回からポララミン錠の省略可。

レジメン名	GB療法2～6				投与日																				
					更新日		2020/3/25																		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	1	2	・	28																		
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓	↓																				
デキサート注射液	16.5mg	点滴末梢	15分	↓																					
生理食塩液	50mL	点滴末梢	15分	↓																					
ガザイバ点滴静注	1000mg	点滴末梢	指示通り	↓																					
生理食塩液	250mL	点滴末梢	指示通り	↓																					
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓	↓																				
トリアキシン点滴静注液	90mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓	↓																				
生理食塩液	250mL	点滴末梢	1時間	↓	↓																				
カロナル錠	500mg 2錠	内服	治療時	↓																					

備考：前回投与でinfusion reaction発現がなければ、次回からポララミン錠の省略可。

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	Pola-BR療法1													更新日	2021/6/15									
														1クール	21日間									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																				
				1	2	3	・	21																
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓																		
ポラミン注 ソル・コーテフ注射用	5mg 100mg	点滴末梢	15分	↓	↓																			
生理食塩液	50mL																							
リツキシマブBS点滴静注	375mg/m ²	点滴末梢	指示通り	↓																				
生理食塩液	500mL																							
ポライビー点滴静注用 注射用水	1.8mg/kg 20mL	点滴末梢	90分		↓																			
生理食塩液	100mL																							
デキサート注射液	3.3mg	点滴末梢	30分		↓	↓																		
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL																							
トリアキシン点滴静注液	90mg/m ²	点滴末梢	1時間		↓	↓																		
生理食塩液	250mL																							

備考：ST合剤とアシクロビルの使用。ポライビー投与前に解熱鎮痛薬、抗ヒスタミン剤、副腎皮質ホルモン剤を考慮

レジメン名	Pola-BR療法2～6													更新日	2021/6/15									
														1クール	21日間									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																				
				1	2	・	21																	
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓	↓																			
リツキシマブBS点滴静注	375mg/m ²	点滴末梢	指示通り	↓																				
生理食塩液	500mL																							
ポライビー点滴静注用 注射用水	1.8mg/kg 20mL	点滴末梢	30分	↓																				
生理食塩液	100mL																							
デキサート注射液	3.3mg	点滴末梢	30分	↓	↓																			
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL																							
トリアキシン点滴静注液	90mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓	↓																			
生理食塩液	250mL																							

備考：ST合剤とアシクロビルの使用。ポライビー投与前に解熱鎮痛薬、抗ヒスタミン剤、副腎皮質ホルモン剤を考慮

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	PTCL : Pralatrexate療法													更新日							
														2020/3/25							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	8	15	22	29	36	49											
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓		↓		↓							
ジフォルタ注射液	30mg/m ²	点滴末梢	全開投与	↓		↓		↓		↓		↓		↓							
生理食塩液	50mL																				

備考：ジフォルタ投与10日以上前よりフォリアミン0.25T/日を内服。10日以上前よりビタミンB12 1mgの筋注、8~10週ごとに投与。

レジメン名	PTCL : Bv-CHP療法													更新日							
														2020/3/25							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	2	3	4	5	21												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																	
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																	
プレドニン	100mg																				
ドキシソルピシン塩酸塩注射用	50mg/m ²	点滴末梢	ワンショット	↓																	
生理食塩液	20mL																				
注射用エンドキサン	750mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																	
生理食塩液	250mL																				
アドセトリス点滴静注用	1.8mg/kg	点滴末梢	30分	↓																	
注射用水	40mL																				
生理食塩液	100or250mL		or1時間																		
プレドニン錠	100mg	内服	朝食後		↓	↓	↓	↓													

備考：アドセトリス初回投与前にinfusion reaction対策としてポララミン注+ソルコーテフ注投与

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	Denileukin Diftitox-1~8													更新日	2021/11/9							
														1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	3	4	5	・	21												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓	↓	↓														
生理食塩液 デキサート注射液	100mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓	↓	↓	↓	↓														
レミトロ点滴静注用 注射用水 生理食塩液	9μg/kg 20mL 100mL	点滴末梢	1時間	↓	↓	↓	↓	↓														
カロナール錠 ポラミン錠	500mg 1錠 2mg 1錠	内服	治療時	↓	↓	↓	↓	↓														

備考：

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	PCNSL : HD-MTX(3.5)													更新日	2020/3/26								
														1クール	14日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	2	3	4	5	・	14													
ソルデム 3 A 輸液 メイロン 7%	500mL 20mL	点滴末梢	メイン	×6	×6	×6	×6	×6															
グラニセトロン点滴静注液 リノロサル注射液	3mg/100mL 4mg	点滴末梢	30分	↓																			
メソトレキセート点滴静注液 生理食塩液	3500mg/m ² 500mL	点滴末梢	4時間	↓																			
ロイコボリン注	30mg	点滴末梢	ワンショット		×3	×4	×4	×2															

備考：メソトレキセート投与前にダイフェン錠の中止を確認

レジメン名	DeVIC療法													更新日	2020/3/30								
														1クール	21日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	2	3	・	21															
ソルデム 3 A 輸液 メイロン 7%	500mL 20mL	点滴末梢	メイン	↓																			
ブドウ糖液 5%	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓																	
デキサート注射液 グラニセトロン点滴静注液	33mg 3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓	↓	↓																	
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液 5%	300mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓																			
エトポシド点滴静注液 ブドウ糖液 5%	100mg/m ² 250mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓																	
ウロミテキサン注 注射用イホマイド 生理食塩液	300mg/m ² 1.5g/m ² 500mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓																	
ウロミテキサン注 ウロミテキサン注	300mg/m ² 300mg/m ²	点滴末梢	ワンショット	↓	↓	↓																	
ウロミテキサン注 ソルデム 3 A 輸液 メイロン 7%	300mg/m ² 500mL 10mL	点滴末梢	ワンショット メイン	↓	×2	×2																	

備考：

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	AuTo BuTT療法(64歳以下)													更新日	2020/10/1					
														1クール	28日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	・	・	・	・	・	28		
ソルデム3 A輸液	500mL	中心静脈	メイン	×3	×3	×3	×3	×3	×3	×2	×2	×2								
生理食塩液	500mL	中心静脈	24時間	↓	↓	↓	↓	↓	↓											
デキサート注射液	3.3mg	中心静脈	30分	↓	↓	↓	↓	↓	↓											
グラニセトロン点滴静注液	3mg/100mL																			
ブスルフェクス点滴静注	3.2mg/kg	中心静脈	3時間	↓	↓	↓	↓													
生理食塩液	5.4mL/kg																			
リサイオ点滴静注液	5mg/kg	中心静脈	2時間					↓	↓											
生理食塩液	250mL																			
幹細胞輸注																				
アプレピタントカプセル	初回125mg 2回目以降80mg	内服	治療時	↓	↓	↓	↓	↓	↓											
ビクロックス錠	200mg 4錠	内服	分2																	
フルコナゾールカプセル	100mg 4Cp	内服	分1																	

備考：ブスルフェクス抗癌薬を使用する（例：ベンゾジアゼピン系、フェニトイン、バルプロ酸、レベチラセタム）。

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	m-AuTo BuTT療法(65歳以上75歳未満)													更新日	2020/10/1				
														1クール	28日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	3	4	5	6	7	28			
ソルデム 3 A 輸液	500mL	中心静脈	メイン	×3	×3	×3	×3	×2	×2	×2									
生理食塩液	500mL	中心静脈	24時間	↓	↓	↓	↓			↓									
デキサート注射液 グラニセトロン点滴静注液	3.3mg 3mg/100mL	中心静脈	30分	↓	↓	↓	↓												
ブスルフェクス点滴静注 生理食塩液	3.2mg/kg 5.4mL/kg	中心静脈	3時間	↓	↓														
リサイオ点滴静注液 生理食塩液	5mg/kg 250mL	中心静脈	2時間			↓	↓												
幹細胞輸注										↓									
アプレピタントカプセル	初回125mg 2回目以降80mg	内服	治療時	↓	↓	↓	↓												
ビクロックス錠	200mg 4錠	内服	分2	↓ ※造血幹細胞移植7日前より施行後35日まで															
フルコナゾールカプセル	100mg 4Cp	内服	分1	↓ ※好中球数が1000を超えて1週間まで															

備考：ブスルフェクス抗癌薬を使用する（例：ベンゾジアゼピン系、フェニトイン、バルプロ酸、レベチラセタム）。