

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	CHOP																	更新日	2020/3/13	
																		1クール	21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	3	4	5	・	21										
ソルデム 3 A 輸液	200mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 プレドニン	3mg/100mL 100mg	点滴末梢	30分	↓																
ドキソルビシン塩酸塩注射用 生理食塩液	50mg/m ² 20mL	点滴末梢	ワンショット	↓																
オンコピン注射用 生理食塩液	1.4mg/m ² 20mL	点滴末梢	ワンショット	↓																
注射用エンドキサン 生理食塩液	750mg/m ² 250mL	点滴末梢	2時間	↓																
プレドニン錠	100mg	内服	朝食後		↓	↓	↓	↓												

備考：

レジメン名	リツキシマブ+CHOP療法																	更新日	2020/3/25				
																		1クール	21日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	2	3	4	5	・	21													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																			
リツキシマブBS点滴静注	375mg/m ²	点滴末梢	指示通り	↓																			
生理食塩液	500mL																						
ソルデム 3 A 輸液	200mL	点滴末梢	メイン		↓																		
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分		↓																		
プレドニン	100mg																						
ドキソルビシン塩酸塩注射用	50mg/m ²	点滴末梢	ワンショット		↓																		
生理食塩液	20mL																						
オンコピン注射用	1.4mg/m ²	点滴末梢	ワンショット		↓																		
生理食塩液	20mL																						
注射用エンドキサン	750mg/m ²	点滴末梢	2時間		↓																		
生理食塩液	250mL																						
プレドニン錠	100mg	内服	朝食後			↓	↓	↓	↓														

備考：

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	Pola-R-CHP療法																更新日	2023/2/21
																	1クール	21日間
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日														
				1	2	3	4	5	・	21								
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓														
プレドニン	100mg	点滴末梢	15分	↓														
生理食塩液	50mL	点滴末梢																
ポラミン注	5mg/mL	点滴末梢	ワンショット	↓														
リツキシマブBS点滴静注	375mg/m ²	点滴末梢	指示通り	↓														
生理食塩液	500mL																	
ポライビ一点滴静注用 注射用水	1.8mg/kg 20mL	点滴末梢	初回90分、以降30分まで短縮可能	↓														
生理食塩液	100mL																	
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓														
ドキソルビシン塩酸塩注射用	50mg/m ²	点滴末梢	ワンショット	↓														
生理食塩液	20mL																	
注射用エンドキサン	750mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓														
生理食塩液	250mL																	
プレドニン錠	100mg	内服	朝食後		↓	↓	↓	↓										

備考：6コース終了後、リツキシマブ単剤2回投与（計8回） ポライビー投与前に抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛剤の前投薬を考慮

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	G単剤				投与日															
					1	・	56													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間																	
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
デキサート注射液	3.3mg	点滴末梢	15分	↓																
生理食塩液	50mL	点滴末梢																		
ガザイバ点滴静注	1000mg	点滴末梢	指示通り	↓																
生理食塩液	250mL																			
カロナール錠	500mg 2錠	内服	治療時	↓																

備考：

レジメン名	G-CHOP療法1				投与日															
					1	2	3	4	5	・	8	・	15	・	21					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間																	
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓							↓		↓							
プレドニン	100mg	点滴末梢	15分	↓							↓		↓							
生理食塩液	50mL	点滴末梢																		
ガザイバ点滴静注	1000mg	点滴末梢	指示通り	↓							↓		↓							
生理食塩液	250mL																			
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																
ドキシルビシン塩酸塩注射用	50mg/m ²	点滴末梢	ワンショット	↓																
生理食塩液	20mL																			
オンコビン注射用	1.4mg/m ²	点滴末梢	ワンショット	↓																
生理食塩液	20mL																			
注射用エンドキサン	750mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																
生理食塩液	250mL																			
プレドニン錠	100mg	内服	朝食後		↓	↓	↓	↓	↓											
カロナール錠	500mg 2錠	内服	治療時	↓							↓		↓							
ポララミン錠	2mg 1錠																			

備考：前回投与でinfusion reaction発現がなければ、次回からポララミン錠の省略可。

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名		G-CHOP療法2～8																更新日	2020/3/25
																		1クール	21日間
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	3	4	5	・	21									
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓															
プレドニン	100mg	点滴末梢	15分	↓															
生理食塩液	50mL	点滴末梢																	
ガザイバ点滴静注	1000mg	点滴末梢	指示通り	↓															
生理食塩液	250mL	点滴末梢																	
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓															
ドキシソルビシン塩酸塩注射用	50mg/m ²	点滴末梢	ワンショット	↓															
生理食塩液	20mL	点滴末梢																	
オンコビン注射用	1.4mg/m ²	点滴末梢	ワンショット	↓															
生理食塩液	20mL	点滴末梢																	
注射用エンドキサン	750mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓															
生理食塩液	250mL	点滴末梢																	
プレドニン錠	100mg	内服	朝食後		↓	↓	↓	↓											
カロナール錠	500mg 2錠	内服	治療時	↓															

備考：前回投与でinfusion reaction発現がなければ、次回からポララミン錠の省略可。

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名		G-CVP療法1																更新日	2020/3/25
																		1クール	21日間
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	3	4	5	・	8	・	15	・	21					
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓						↓		↓							
プレドニン	100mg	点滴末梢	15分	↓						↓		↓							
生理食塩液	50mL	点滴末梢																	
ガザイバ点滴静注	1000mg	点滴末梢	指示通り	↓						↓		↓							
生理食塩液	250mL	点滴末梢																	
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓															
オンコビン注射用	1.4mg/m ²	点滴末梢	ワンショット	↓															
生理食塩液	20mL	点滴末梢																	
注射用エンドキサン	750mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓															
生理食塩液	250mL	点滴末梢																	
プレドニン錠	100mg	内服	朝食後		↓	↓	↓	↓											
カロナール錠	500mg 2錠	内服	治療時	↓						↓		↓							
ポララミン錠	2mg 1錠																		

備考：前回投与でinfusion reaction発現がなければ、次回からポララミン錠の省略可。

レジメン名		G-CVP療法2～8																更新日	2020/3/25
																		1クール	21日間
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	3	4	5	・	21									
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓															
プレドニン	100mg	点滴末梢	15分	↓															
生理食塩液	50mL	点滴末梢																	
ガザイバ点滴静注	1000mg	点滴末梢	指示通り	↓															
生理食塩液	250mL	点滴末梢																	
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓															
オンコビン注射用	1.4mg/m ²	点滴末梢	ワンショット	↓															
生理食塩液	20mL	点滴末梢																	
注射用エンドキサン	750mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓															
生理食塩液	250mL	点滴末梢																	
プレドニン錠	100mg	内服	朝食後		↓	↓	↓	↓											
カロナール錠	500mg 2錠	内服	治療時	↓															

備考：前回投与でinfusion reaction発現がなければ、次回からポララミン錠の省略可。

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	Bendamustine療法																	更新日	2022/5/19		
																		1クール	21日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	2	・	21														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓	↓																
デキサート注射液	3.3mg	点滴末梢	30分	↓	↓																
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL																				
トレアキシン点滴静注	120mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓	↓																
生理食塩液	250mL																				

備考：

レジメン名	Bendamustine-R療法																	更新日	2022/5/19					
																		1クール	28日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																				
				1	2	・	28																	
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓	↓																			
デキサート注射液	3.3mg																							
ポララミン注	5mg	点滴末梢	30分	↓																				
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL																							
デキサート注射液	3.3mg	点滴末梢	30分		↓																			
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL																							
トレアキシン点滴静注	90mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓	↓																			
生理食塩液	250mL																							
リツキシマブBS点滴静注	375mg/m ²	点滴末梢	指示通り	↓																				
生理食塩液	500mL																							

備考：ST合剤とアシクロビルの使用。

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	GB療法1																更新日	2020/3/25				
																	1クール	28日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	・	8	・	15	・	28											
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓		↓		28											
デキサート注射液	16.5mg	点滴末梢	15分	↓			↓		↓													
生理食塩液	50mL																					
ガザイバ点滴静注	1000mg	点滴末梢	指示通り	↓			↓		↓													
生理食塩液	250mL																					
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓	↓																	
トレアキシン点滴静注液	90mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓	↓																	
生理食塩液	250mL																					
カロナール錠	500mg 2錠	内服	治療時	↓			↓		↓													
ポララミン錠	2mg 1錠																					

備考：前回投与でinfusion reaction発現がなければ、次回からポララミン錠の省略可。

レジメン名	GB療法2～6																更新日	2020/3/25		
																	1クール	28日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	・	28													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓	↓															
デキサート注射液	16.5mg	点滴末梢	15分	↓																
生理食塩液	50mL	点滴末梢	15分	↓																
ガザイバ点滴静注	1000mg	点滴末梢	指示通り	↓																
生理食塩液	250mL	点滴末梢	指示通り	↓																
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓	↓															
トレアキシン点滴静注液	90mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓	↓															
生理食塩液	250mL	点滴末梢	1時間	↓	↓															
カロナール錠	500mg 2錠	内服	治療時	↓																

備考：前回投与でinfusion reaction発現がなければ、次回からポララミン錠の省略可。

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	Pola-BR療法1																	更新日	2021/6/15		
																		1クール	21日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	1	2	3	・	21													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓															
ポララミン注	5mg	点滴末梢	15分	↓	↓																
ソル・コーテフ注射用	100mg																				
生理食塩液	50mL																				
リツキシマブBS点滴静注	375mg/m ²	点滴末梢	指示通り	↓																	
生理食塩液	500mL																				
ポライビー点滴静注用	1.8mg/kg																				
注射用水	20mL	点滴末梢	90分		↓																
生理食塩液	100mL																				
デキサート注射液	3.3mg																				
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分		↓	↓															
トレアキシン点滴静注液	90mg/m ²																				
生理食塩液	250mL																				

備考：ST合剤とアシクロビルの使用。ポライビー投与前に解熱鎮痛薬、抗ヒスタミン剤、副腎皮質ホルモン剤を考慮

レジメン名	Pola-BR療法2～6																	更新日	2021/6/15				
																		1クール	21日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	2	・	21																
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓	↓																		
リツキシマブBS点滴静注	375mg/m ²	点滴末梢	指示通り	↓																			
生理食塩液	500mL																						
ポライビー点滴静注用	1.8mg/kg																						
注射用水	20mL	点滴末梢	30分	↓																			
生理食塩液	100mL																						
デキサート注射液	3.3mg	点滴末梢	30分	↓	↓																		
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL																						
トレアキシン点滴静注液	90mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓	↓																		
生理食塩液	250mL																						

備考：ST合剤とアシクロビルの使用。ポライビー投与前に解熱鎮痛薬、抗ヒスタミン剤、副腎皮質ホルモン剤を考慮

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	PTCL：Pralatrexate療法														更新日	2020/3/25					
															1クール	49日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	8	・	15	・	22	・	29	・	36	・	49					
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓		↓			49						
ジフォルタ注射液	30mg/m ²	点滴末梢	全開投与	↓		↓		↓		↓		↓									
生理食塩液	50mL	点滴末梢	全開投与	↓		↓		↓		↓		↓									

備考：ジフォルタ投与10日以上前よりフォリアミン0.25T/日を内服。10日以上前よりビタミンB12 1mgの筋注、8～10週ごとに投与。

レジメン名	PTCL：Bv-CHP療法																	更新日	2020/3/25	
																		1クール	21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	3	4	5	・	21										
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																
プレドニン	100mg	点滴末梢																		
ドキソルビシン塩酸塩注射用	50mg/m ²	点滴末梢	ワンショット	↓																
生理食塩液	20mL																			
注射用エンドキサン	750mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																
生理食塩液	250mL																			
アドセトリス点滴静注用	1.8mg/kg	点滴末梢	30分	↓																
注射用水	40mL																			
生理食塩液	100or250mL		or1時間	↓																
プレドニン錠	100mg	内服	朝食後		↓	↓	↓	↓	↓											

備考：アドセトリス初回投与前にinfusion reaction対策としてボララミン注+ソルコーテフ注投与

非ホジキンリンパ腫(NHL)

[illegible]

備考：

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	PCNSL：HD-MTX(3.5)														更新日	2020/3/26
															1クール	14日間
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日												
				1	2	3	4	5	・	14						
ソルデム 3 A 輸液 メイロン 7 %	500mL 20mL	点滴末梢	メイン	× 6	× 6	× 6	× 6	× 6								
グラニセトロン点滴静注液 リノロサル注射液	3mg/100mL 4mg	点滴末梢	30分	↓												
メソトレキセート点滴静注液 生理食塩液	3500mg/m ² 500mL	点滴末梢	4時間	↓												
ロイコボリン注	30mg	点滴末梢	ワンショット		× 3	× 4	× 4	× 2								

備考：メソトレキセート投与前にダイフェン錠の中止を確認

レジメン名	DeVIC療法														更新日	2020/3/30
															1クール	21日間
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日												
				1	2	3	・	21								
ソルデム 3 A 輸液 メイロン 7 %	500mL 20mL	点滴末梢	メイン	↓												
ブドウ糖液 5 %	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓										
デキサート注射液 グラニセトロン点滴静注液	33mg 3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓	↓	↓										
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液 5 %	300mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓												
エトキシド点滴静注液 ブドウ糖液 5 %	100mg/m ² 250mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓										
ウロミテキサン注	300mg/m ²	点滴末梢	ワンショット	↓	↓	↓										
注射用イホマイド 生理食塩液	1.5g/m ² 500mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓										
ウロミテキサン注	300mg/m ²	点滴末梢	ワンショット	↓	↓	↓										
ウロミテキサン注	300mg/m ²	点滴末梢	ワンショット	↓	↓	↓										
ソルデム 3 A 輸液 メイロン 7 %	500mL 10mL	点滴末梢	メイン	↓	× 2	× 2										

備考：

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	GCD療法																更新日	2023/2/21					
																	1クール	21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	2	3	4	・	8	・	21												
ソルデム 3 A 輸液	200mL	点滴末梢	メイン	↓																			
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン						↓														
グラニセトロン点滴静注液	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓					↓														
ゲムシタビン点滴静注用 ブドウ糖液 5 %	1000mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓					↓														
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液 5 %	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																			
デカドロン錠	40mg	内服	朝食後	↓	↓	↓	↓																

備考：

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	m-AuTo BuTT療法(65歳以上75歳未満)																更新日	2020/10/1										
																	1クール	28日間										
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																								
				1	2	3	4	5	6	7	.	.	.	.	.	28												
ソルデム 3 A 輸液	500mL	中心静脈	メイン	×3	×3	×3	×3	×2	×2	×2																		
生理食塩液	500mL	中心静脈	24時間	↓	↓	↓	↓			↓																		
デキサート注射液	3.3mg	中心静脈	30分	↓	↓	↓	↓																					
グラニセトロン点滴静注液	3mg/100mL	中心静脈	30分	↓	↓	↓	↓																					
ブスルフェクス点滴静注	3.2mg/kg	中心静脈	3時間	↓	↓																							
生理食塩液	5.4mL/kg	中心静脈	3時間	↓	↓																							
リサイオ点滴静注液	5mg/kg	中心静脈	2時間			↓	↓																					
生理食塩液	250mL	中心静脈	2時間			↓	↓																					
幹細胞輸注										↓																		
アプレピタントカプセル	初回125mg 2回目以降80mg	内服	治療時	↓	↓	↓	↓																					
ビクロックス錠	200mg 4錠	内服	分2	※造血幹細胞移植7日前より施行後35日まで																								
フルコナゾールカプセル	100mg 4Cp	内服	分1	↓ ※好中球数が1000を超えて1週間まで																								

備考：ブスルフェクス抗癌薬を使用する（例：ベンゾジアゼピン系、フェニトイン、バルプロ酸、レベチラセタム）。