

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名		MM DLd-1											更新日						
													2020/3/18						
													1クール		28日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	8	15	22	28											
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓									
ソル・コーテフ注射用 生理食塩液	300mg 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓		↓									
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 1L	点滴末梢	指示通り	↓															
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り			↓		↓		↓									
レブラミドカプセル	~25mg	内服		day1~21															

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日及び翌日に内服。
喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名		MM DLd-2											更新日						
													2020/3/25						
													1クール		28日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	8	15	22	28											
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓									
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓		↓		↓		↓									
レブラミドカプセル	~25mg	内服		day1~21															

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日及び翌日に内服。
喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM DLd-3~6										更新日									
											2020/3/25									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	15	.	.	.	22	.	28								
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓			↓													
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓			↓													
レブラミドカプセル	~25mg	内服		day1~21																

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日及び翌日に内服。
喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM DLd-7~										更新日									
											2020/3/18									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	22	.	28								
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓																
レブラミドカプセル	~25mg	内服		day1~21																

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日及び翌日に内服。
喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名		MM DLd-1~2(SC)											更新日	2021/6/15							
													1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	8	.	15	.	22	.	28									
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓		↓		↓		↓											
レブラミドカプセル	~25mg	内服		day1~21																	

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日及び翌日に内服。
喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名		MM DLd-3~6(SC)											更新日	2021/6/15							
													1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	.	15	.	.	22	.	28									
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓			↓														
レブラミドカプセル	~25mg	内服		day1~21																	

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日及び翌日に内服。
喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名		MM DLd-7~(SC)											更新日	2021/6/15							
													1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	22	.	28									
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓																	
レブラミドカプセル	~25mg	内服		day1~21																	

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日及び翌日に内服。
喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名		MM DBd-1											更新日		2020/3/18						
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																
					1	4	8	11	15	21											
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓			↓			↓											
ソル・コーテフ注射用 生理食塩液	300mg 50mL	点滴末梢	15分	↓			↓			↓											
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 1L	点滴末梢	指示通り	↓																	
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り				↓			↓											
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓		↓		↓													

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日・ベルケイド投与日及び翌日に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名		MM DBd-2~3											更新日		2020/3/18						
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																
					1	4	8	11	15	21											
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓			↓			↓											
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓			↓			↓											
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓		↓		↓													

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日・ベルケイド投与日及び翌日に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM DBd-4~8											更新日								
												2020/3/18								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	4	8	11	21												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓																
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓		↓		↓		↓										

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日・ベルケイド投与日及び翌日に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM DBd-9~											更新日								
												2020/3/18								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	28															
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓																

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日と翌日に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM DBd-1~3(SC)				更新日														
					1クール	2021/6/15 21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	4	8	11	15	21										
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓			↓				↓								
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓		↓		↓		↓									

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日・ベルケイド投与日及び翌日に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM DBd-4~8(SC)				更新日														
					1クール	2021/6/15 21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	4	8	11	21											
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓															
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓		↓		↓		↓									

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日・ベルケイド投与日及び翌日に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM DBd-9~(SC)				更新日														
					1クール	2021/6/15 28日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	28														
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓															

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	AL DCyBorD-1~2										更新日									
											2022/5/19									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	8	15	22	28												
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓		↓		↓		↓										
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓		↓		↓		↓										
生理食塩液	50mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓										
注射用エンドキサン 生理食塩液	300mg/m ² 100mL	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓		↓										

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠は20mg/body (day1.2、8.9、15.16、22.23)。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。エンドキサン (300mg/m²：最大500mg/週) は経口投与も可。

レジメン名	AL DCyBorD-3~6										更新日									
											2022/5/19									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	8	15	22	28												
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓				↓												
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓		↓		↓		↓										
生理食塩液	50mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓										
注射用エンドキサン 生理食塩液	300mg/m ² 100mL	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓		↓										

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠は20mg/body (day1.2、8、15.16、22)。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。エンドキサン (300mg/m²：最大500mg/週) は経口投与も可。

レジメン名	AL DCyBorD-7~										更新日									
											2022/5/19									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	28															
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓																

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠は20mg/body (day1)喘息、COPD患者はモンテルカスト内服

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名		MM KdD-1												更新日	2021/3/21																										
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																																				
					1	2	・	8	9	・	15	16	・	22	・	28																									
ブドウ糖液 5%		100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓																													
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液 5%		20mg/m ² 40mL 100mL	点滴末梢	30分	↓	↓																																			
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液 5%		56mg/m ² 60mL 100mL	点滴末梢	30分				↓	↓		↓	↓																													
生理食塩液		250mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓			↓						↓																								
ソル・コーテフ注射用 生理食塩液		300mg 50mL	点滴末梢	15分	↓	↓																																			
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液		8mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓	↓																																			
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液		16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り				↓			↓						↓																								

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はday1.2、8.9、15.16、22.23に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名		MM KdD-2												更新日	2021/3/21																											
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																																					
					1	2	・	8	9	・	15	16	・	22	・	28																										
ブドウ糖液 5%		100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓																														
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液 5%		56mg/m ² 60mL 100mL	点滴末梢	30分	↓	↓		↓	↓		↓	↓																														
生理食塩液		250mL	点滴末梢	メイン	↓			↓			↓						↓																									
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液		16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓			↓			↓						↓																									

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はday1.2、8.9、15.16、22.23に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM KdD-3~6													更新日					
														1クール	28日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	8	9	15	16	28									
ブドウ糖液5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓								
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液5%	56mg/m ² 60mL 100mL	点滴末梢	30分	↓	↓		↓	↓		↓	↓								
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓						↓									
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓						↓									

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はday1.2、8.9、15.16、22.23に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM KdD-7~													更新日					
														1クール	28日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	8	9	15	16	28									
ブドウ糖液5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓								
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液5%	56mg/m ² 60mL 100mL	点滴末梢	30分	↓	↓		↓	↓		↓	↓								
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓															
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓															

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はday1.2、8.9、15.16、22.23に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM KdD-1(SC)													更新日	2021/6/15							
														1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	・	8	9	・	15	16	・	22	・	28							
ブドウ糖液5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓											
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液5%	20mg/m ² 40mL 100mL	点滴末梢	30分	↓	↓																	
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液5%	56mg/m ² 60mL 100mL	点滴末梢	30分				↓	↓		↓	↓											
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓			↓			↓			↓									

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠はday1.2、8.9、15.16、22.23に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM KdD-2(SC)													更新日	2021/6/15							
														1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	・	8	9	・	15	16	・	22	・	28							
ブドウ糖液5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓											
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液5%	56mg/m ² 60mL 100mL	点滴末梢	30分	↓	↓		↓	↓		↓	↓											
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓			↓			↓			↓									

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠はday1.2、8.9、15.16、22.23に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM KdD-3~6(SC)													更新日	2021/6/15							
														1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	・	8	9	・	15	16	・	28									
ブドウ糖液5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓											
カイプロリス点滴静注用 注射用水	56mg/m ² 60mL	点滴末梢	30分	↓	↓		↓	↓		↓	↓											
ブドウ糖液5%	100mL																					
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓						↓												

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠はday1.2、8.9、15.16、22.23に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM KdD-7~(SC)													更新日	2021/6/15							
														1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	・	8	9	・	15	16	・	28									
ブドウ糖液5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓											
カイプロリス点滴静注用 注射用水	56mg/m ² 60mL	点滴末梢	30分	↓	↓		↓	↓		↓	↓											
ブドウ糖液5%	100mL																					
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓																		

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠はday1.2、8.9、15.16、22.23に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM Dara-BMP-1													更新日	2020/3/18			
														1クール	42日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日														
				1	4	8	11	15	22	25	29	32	36					
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓			↓			↓	↓			↓			↓	
ソル・コーテフ注射用 生理食塩液	300mg 50mL	点滴末梢	15分	↓			↓											
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 1L	点滴末梢	指示通り	↓														
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り				↓			↓	↓			↓			↓	
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射	—	↓	↓	↓	↓			↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
アルケラン錠	9mg/m ²	内服		day1~4														
プレドニン錠	60mg/m ²	内服		day2~4														

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名		MM Dara-BMP-2~9											更新日							
													2020/3/18	42日間						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	4	8	22	29	42											
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓					↓											
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓					↓											
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓			↓		↓		↓									
アルケラン錠	9mg/m ²	内服		day1~4																
プレドニン錠	60mg/m ²	内服		day2~4																

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名		MM Dara-BMP-★10~											更新日							
													2020/3/26	28日間						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	28															
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓																

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM Dara-BMP-1(SC)													更新日	2021/6/15				
														1クール	42日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	4	8	11	15	22	25	29	32	36						
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓			↓				↓		↓			↓			↓
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓	
アルケラン錠	9mg/m ²	内服		day1~4															
プレドニン錠	60mg/m ²	内服		day2~4															

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM Dara-BMP-2~9(SC)													更新日	2021/6/15				
														1クール	42日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	4	8	22	29	42										
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓					↓										
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓				↓		↓		↓							
アルケラン錠	9mg/m ²	内服		day1~4															
プレドニン錠	60mg/m ²	内服		day2~4															

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM Dara-BMP-★10~(SC)													更新日	2021/6/15				
														1クール	28日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	28														
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓															

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM EPd-1													更新日								
														2020/3/26								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	8	15	22	28														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓												
デキサート注射液 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓		↓												
エムプリシティ点滴静注用 注射用水 生理食塩液	10mg/kg 40mL 250mL	点滴末梢	指示通り	↓		↓		↓		↓												
ポマリストカプセル	1~4mg	内服	指示通り	day1~21																		

備考：エムプリシティ投与前に抗ヒスタミン剤・ガスター注投与、カロナール錠内服。デキサメタゾン併用。

レジメン名	MM EPd-2													更新日								
														2020/3/26								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	8	15	22	28														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓												
デキサート注射液 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓		↓												
エムプリシティ点滴静注用 注射用水 生理食塩液	10mg/kg 40mL 250mL	点滴末梢	指示通り	↓		↓		↓		↓												
ポマリストカプセル	1~4mg	内服	指示通り	day1~21																		

備考：エムプリシティ投与前に抗ヒスタミン剤・ガスター注投与、カロナール錠内服。デキサメタゾン併用。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM EPd-3~				更新日	2020/3/26														
					1クール	28日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	21	.	28									
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分	↓																
生理食塩液	50mL																			
エムプリシティ点滴静注用	20mg/kg	点滴末梢	指示通り	↓																
注射用水	60mL																			
生理食塩液	250mL																			
ポマリストカプセル	1~4mg	内服	指示通り	day1~21																

備考：エムプリシティ投与前に抗ヒスタミン剤・ガスター注投与、カロナール錠内服。デキサメタゾン併用。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	Carfilzomib- 1			更新日	2020/3/31																						
				1クール	28日間																						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																							
				1	2	・	8	9	・	15	16	・	21	・	28												
ブドウ糖液 5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓																
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液 5%	20mg/m ² 40mL 100mL	点滴末梢	10分	↓	↓																						
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液 5%	27mg/m ² 40mL 100mL	点滴末梢	10分				↓	↓		↓	↓																
レブラミドカプセル	~25mg	内服	指示通り	day1~21																							

備考：デキサメタゾン40mg/day 1日1回 day1,8,15,22(カイプロリス投与前)併用

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名		Carfilzomib- 2~12												更新日	2020/3/31				
														1クール	28日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	・	8	9	・	15	16	・	21	・	28				
ブドウ糖液5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓								
カイプロリス点滴静注用注射用水 ブドウ糖液5%	27mg/m ² 40mL 100mL	点滴末梢	10分	↓	↓		↓	↓		↓	↓								
レブラミドカプセル	~25mg	内服	指示通り	day1~21															

備考：デキサメタゾン40mg/day 1日1回 day1,8,15,22(カイプロリス投与前)併用

レジメン名		Carfilzomib-13~												更新日	2020/3/31				
														1クール	28日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	・	15	16	・	21	・	28							
ブドウ糖液5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓											
カイプロリス点滴静注用注射用水 ブドウ糖液5%	27mg/m ² 40mL 100mL	点滴末梢	10分	↓	↓		↓	↓											
レブラミドカプセル	~25mg	内服	指示通り	day1~21															

備考：デキサメタゾン40mg/day 1日1回 day1,8,15,22(カイプロリス投与前)併用

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM ELd-1 (Elotuzumab-1)				更新日	2020/3/26													
					1クール	28日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	8	15	22	28											
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓									
ソル・コーテフ注射用 生理食塩液	100mg 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓		↓									
エムプリシティ点滴静注用 注射用水 生理食塩液	10mg/kg 40mL 250mL	点滴末梢	指示通り	↓		↓		↓		↓									
レブラミドカプセル	~25mg	内服	指示通り	day1~21															

備考：エムプリシティ投与前に抗ヒスタミン剤・ガスター注投与、カロナール錠内服。デキサメタゾン併用。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名		MM ELd-2 (Elotuzumab-2)						更新日		2020/3/26														
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
					1	8	15	22	28															
生理食塩液		250mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓	↓																
ソル・コーテフ注射用 生理食塩液		100mg 50mL	点滴末梢	15分	↓	↓	↓	↓																
エムプリシティ点滴静注用 注射用水 生理食塩液		10mg/kg 40mL 250mL	点滴末梢	指示通り	↓	↓	↓	↓																
レブラミドカプセル		~25mg	内服	指示通り	day1~21																			

備考：エムプリシティ投与前に抗ヒスタミン剤・ガスター注投与、カロナール錠内服。デキサメタゾン併用。

レジメン名		MM ELd-3~ (Elotuzumab-3~)						更新日		2020/3/26													
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
					1	15	21	28															
生理食塩液		250mL	点滴末梢	メイン	↓	↓																	
ソル・コーテフ注射用 生理食塩液		100mg 50mL	点滴末梢	15分	↓	↓																	
エムプリシティ点滴静注用 注射用水 生理食塩液		10mg/kg 40mL 250mL	点滴末梢	指示通り	↓	↓																	
レブラミドカプセル		~25mg	内服	指示通り	day1~21																		

備考：エムプリシティ投与前に抗ヒスタミン剤・ガスター注投与、カロナール錠内服。デキサメタゾン併用。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	高用量Carfilzomib- 1													更新日	2020/3/31						
														1クール	28日間						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	2	.	8	9	.	15	16	.	28								
ブドウ糖液 5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓										
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液 5%	20mg/m ² 40mL 100mL	点滴末梢	30分	↓	↓																
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液 5%	56mg/m ² 60mL 100mL	点滴末梢	30分				↓	↓		↓	↓										

備考：デキサメタゾン20mg/day 1日1回 day1,2,8,9,15,16,22,23併用

レジメン名	高用量Carfilzomib- 2~													更新日	2020/3/31						
														1クール	28日間						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	2	.	8	9	.	15	16	.	28								
ブドウ糖液 5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓										
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液 5%	56mg/m ² 60mL 100mL	点滴末梢	30分	↓	↓		↓	↓		↓	↓										

備考：デキサメタゾン20mg/day 1日1回 day1,2,8,9,15,16,22,23併用

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM ISaPd-1										更新日									
											2021/3/21									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	8	15	22	28												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓										
デキサート注射液 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓		↓										
サークリサ点滴静注 生理食塩液	10mg/kg 250mL	点滴末梢	指示通り	↓		↓		↓		↓										
ポマリストカプセル	~4mg 1日1回	内服	指示通り	day1~21																

備考：サークリサ投与前に解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤・H2受容体拮抗剤等を投与。デキサメタゾン併用。

レジメン名	MM ISaPd-2~										更新日									
											2021/3/21									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	15	22	28													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
サークリサ点滴静注 生理食塩液	10mg/kg 250mL	点滴末梢	指示通り	↓		↓														
ポマリストカプセル	~4mg 1日1回	内服	指示通り	day1~21																

備考：サークリサ投与前に解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤・H2受容体拮抗剤等を投与。デキサメタゾン併用。