

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

| レジメン名       |                      | NSCLC（術前）CBDCA+PTX+NIVO |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2025/3/24 |
|-------------|----------------------|-------------------------|------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|
|             |                      |                         |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |
| 薬品名         | 投与量                  | 投与方法                    | 投与時間 | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
|             |                      |                         |      | 1   | . | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液       | 500mL                | 点滴末梢                    | メイン  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| オブジーボ点滴静注   | 360mg                | 点滴末梢                    | 30分  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液       | 100mL                |                         |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| パロノセトロン点滴静注 | 0.75mg/50mL          | 点滴末梢                    | 30分  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| デキサート注射液    | 16.5mg               | 点滴末梢                    | 30分  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| ガスター注射液     | 20mg                 |                         |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| パクリタキセル注    | 200mg/m <sup>2</sup> | 点滴末梢                    | 3時間  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液       | 500mL                |                         |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| カルボプラチン注射液  | AUC=6                | 点滴末梢                    | 1時間  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| ブドウ糖液5%     | 250mL                |                         |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| レスタミンコーワ錠   | 50mg                 | 内服                      | 投与前  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |

備考：術前最大3コース

| レジメン名        |                      | NSCLC（術前）CBDCA+PEM+NIVO |       |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2025/3/24 |
|--------------|----------------------|-------------------------|-------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|
|              |                      |                         |       |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |
| 薬品名          | 投与量                  | 投与方法                    | 投与時間  | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
|              |                      |                         |       | 1   | . | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液        | 500mL                | 点滴末梢                    | メイン   | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| オブジーボ点滴静注    | 360mg                | 点滴末梢                    | 30分   | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液        | 100mL                |                         |       |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| パロノセトロン点滴静注  | 0.75mg/50mL          | 点滴末梢                    | 15分   | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| デキサート注射液     | 9.9mg                | 点滴末梢                    | 15分   | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| ペメトレキシド点滴静注液 | 500mg/m <sup>2</sup> | 点滴末梢                    | 10分以上 | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液        | 100mL                |                         |       |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| カルボプラチン注射液   | AUC=5                | 点滴末梢                    | 1時間   | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| ブドウ糖液5%      | 250mL                |                         |       |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |

備考：ペメトレキシド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。術前最大3コース

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

| レジメン名          | NSCLC（術前）CDDP＋PEM＋Pembro |      |       |     |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2025/3/28 |  |  |
|----------------|--------------------------|------|-------|-----|---|---|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|--|
|                |                          |      |       |     |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |  |  |
| 薬品名            | 投与量                      | 投与方法 | 投与時間  | 投与日 |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
|                |                          |      |       | 1   | 2 | 3 | 4 | ・ | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液          | 500mL                    | 点滴末梢 | メイン   | ↓   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| キイトルーダ点滴静注     | 200mg                    | 点滴末梢 | 30分   | ↓   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液          | 100mL                    | 点滴末梢 |       |     |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| ソルデム3 A 輸液     | 500mL                    | 点滴末梢 | メイン   |     | ↓ | ↓ |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| ソルデム3 A 輸液     | 200mL                    | 点滴末梢 | メイン   |     |   |   | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| ソルデム3 A 輸液     | 500mL                    | 点滴末梢 | 1時間   | ↓   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 硫酸M g 補正液      | 8mEq                     |      |       |     |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| パロノセトロン点滴静注    | 0.75mg/50mL              | 点滴末梢 | 30分   | ↓   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| アロカリス点滴静注      | 235mg                    | 点滴末梢 |       |     |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| デキサート注射液       | 9.9mg                    |      |       |     |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| デキサート注射液       | 6.6mg                    | 点滴末梢 | 15分   |     | ↓ | ↓ | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液          | 50mL                     |      |       |     |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| ペメトレキセド点滴静注液   | 500mg/m <sup>2</sup>     | 点滴末梢 | 10分以上 | ↓   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液          | 100mL                    |      |       |     |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 2 0 %マンニトール注射液 | 200mL                    | 点滴末梢 | 30分   | ↓   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| シスプラチン点滴静注液    | 75mg/m <sup>2</sup>      | 点滴末梢 | 2時間   | ↓   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液          | 500mL                    |      |       |     |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| ソルデム3 A 輸液     | 500mL                    | 点滴末梢 | 1時間   | ×2  | ↓ |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。術前最大4コース。

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

| レジメン名      | NSCLC（術後）Pembro(3週毎) |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2025/3/28 |  |
|------------|----------------------|------|------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|
|            |                      |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |  |
| 薬品名        | 投与量                  | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
|            |                      |      |      | 1   | . | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液      | 100mL                | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| キイトルーダ点滴静注 | 200mg/body           | 点滴末梢 | 30分  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液      | 100mL                |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |

備考：術前補助療法を実施後、術後補助療法として投与。最大13コース。

| レジメン名      | NSCLC（術後）Pembro(6週毎) |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2025/3/28 |  |
|------------|----------------------|------|------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|
|            |                      |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 42日間      |  |
| 薬品名        | 投与量                  | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
|            |                      |      |      | 1   | . | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液      | 100mL                | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| キイトルーダ点滴静注 | 400mg/body           | 点滴末梢 | 30分  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液      | 100mL                |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |

備考：術前補助療法を実施後、術後補助療法として投与。最大7コース。

非小細胞肺癌(NSCLC)

| レジメン名        | NSCLC CBDCA＋PEM＋Durva＋Treme |      |       |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2025/3/24 |  |  |
|--------------|-----------------------------|------|-------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|--|
|              |                             |      |       |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |  |  |
| 薬品名          | 投与量                         | 投与方法 | 投与時間  | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
|              |                             |      |       | 1   | . | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液        | 500mL                       | 点滴末梢 | メイン   | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| イジユド点滴静注     | 75mg                        | 点滴末梢 | 1時間   | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液        | 100mL                       |      |       |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| イミフィンジ点滴静注   | 1500mg                      | 点滴末梢 | 1時間   | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液        | 100mL                       |      |       |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| パロノセトロン点滴静注  | 0.75mg/50mL                 | 点滴末梢 | 15分   | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| デキサート注射液     | 9.9mg                       |      |       |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| ペメトレキシド点滴静注液 | 500mg/m <sup>2</sup>        | 点滴末梢 | 10分以上 | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液        | 100mL                       |      |       |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| カルボプラチン注射液   | AUC=6                       | 点滴末梢 | 1時間   | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| ブドウ糖液 5%     | 250mL                       |      |       |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |

備考：ペメトレキシド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。4コースまで施行。次はPEM+Durva+Treme維持（初回）へ。

非小細胞肺癌(NSCLC)

| レジメン名        | NSCLC PEM+Durva+Treme維持（初回） |      |       |     |   |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2024/7/25 |  |  |
|--------------|-----------------------------|------|-------|-----|---|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|--|
|              |                             |      |       |     |   |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 56日間      |  |  |
| 薬品名          | 投与量                         | 投与方法 | 投与時間  | 投与日 |   |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
|              |                             |      |       | 1   | . | 29 | .  | 56 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液        | 100mL                       | 点滴末梢 | メイン   | ↓   |   |    | 29 |    | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液        | 250mL                       | 点滴末梢 | メイン   |     |   | ↓  |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| イジユド点滴静注     | 75mg                        | 点滴末梢 | 1時間   |     |   | ↓  |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液        | 100mL                       |      |       |     |   |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| イミフィンジ点滴静注   | 1500mg                      | 点滴末梢 | 1時間   | ↓   |   | ↓  |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液        | 100mL                       |      |       |     |   |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| デキサート注射液     | 6.6mg                       | 点滴末梢 | 15分   | ↓   |   | ↓  |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液        | 50mL                        |      |       |     |   |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| ペメトレキセド点滴静注液 | 500mg/m <sup>2</sup>        | 点滴末梢 | 10分以上 | ↓   |   | ↓  |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液        | 100mL                       |      |       |     |   |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。本レジメンは1回のみ。次はPEM+Durva維持（2回目以降）へ。イジユドは前レジメンを含み合計5回投与で終了。

| レジメン名        | NSCLC PEM+Durva維持（2回目以降） |      |       |     |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2024/7/25 |  |  |
|--------------|--------------------------|------|-------|-----|---|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|--|
|              |                          |      |       |     |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 28日間      |  |  |
| 薬品名          | 投与量                      | 投与方法 | 投与時間  | 投与日 |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
|              |                          |      |       | 1   | . | 28 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液        | 100mL                    | 点滴末梢 | メイン   | ↓   |   |    | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| イミフィンジ点滴静注   | 1500mg                   | 点滴末梢 | 1時間   | ↓   |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液        | 100mL                    |      |       |     |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| デキサート注射液     | 6.6mg                    | 点滴末梢 | 15分   | ↓   |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液        | 50mL                     |      |       |     |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| ペメトレキセド点滴静注液 | 500mg/m <sup>2</sup>     | 点滴末梢 | 10分以上 | ↓   |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液        | 100mL                    |      |       |     |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。本レジメンはPEM+Durva+Treme維持（初回）投与後から使用する。

非小細胞肺癌(NSCLC)

| レジメン名       | NSCLC CBDCA＋nab PTX＋Durva＋Treme |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2025/3/24 |  |
|-------------|---------------------------------|------|------|-----|---|---|---|----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|
|             |                                 |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |  |
| 薬品名         | 投与量                             | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
|             |                                 |      |      | 1   | ・ | 8 | ・ | 15 | ・ | 21 |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液       | 500mL                           | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液       | 100mL                           | 点滴末梢 | メイン  |     |   | ↓ |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| イジユド点滴静注    | 75mg                            | 点滴末梢 | 1時間  | ↓   |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液       | 100mL                           |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| イミフィンジ点滴静注  | 1500mg                          | 点滴末梢 | 1時間  | ↓   |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液       | 100mL                           |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| パロノセトロン点滴静注 | 0.75mg/50mL                     | 点滴末梢 | 15分  | ↓   |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| デキサート注射液    | 9.9mg                           |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| デキサート注射液    | 6.6mg                           | 点滴末梢 | 15分  |     |   | ↓ |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液       | 50mL                            |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| アブラキサン点滴静注用 | 100mg/m <sup>2</sup>            | 点滴末梢 | 30分  | ↓   |   | ↓ |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液       | 100mL                           |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| カルボプラチン注射液  | AUC=6                           | 点滴末梢 | 1時間  | ↓   |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| ブドウ糖液 5 %   | 250mL                           |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |

備考：4コースまで施行。次はDurva＋Treme維持（初回）へ

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

| レジメン名      | NSCLC Durva＋Treme維持（初回） |      |      |     |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2024/6/25 |  |
|------------|-------------------------|------|------|-----|---|----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|
|            |                         |      |      |     |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 56日間      |  |
| 薬品名        | 投与量                     | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
|            |                         |      |      | 1   | ・ | 29 | ・ | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液      | 100mL                   | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| イジユド点滴静注   | 75mg                    | 点滴末梢 | 1時間  |     |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液      | 100mL                   |      |      |     |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| イミフィンジ点滴静注 | 1500mg                  | 点滴末梢 | 1時間  | ↓   |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液      | 100mL                   |      |      |     |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |

備考：本レジメンは1回のみ。次はDurva維持（2回目以降）へ。イジユドは前レジメンを含み合計5回投与で終了。

| レジメン名      | NSCLC Durva維持（2回目以降） |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2024/6/25 |  |
|------------|----------------------|------|------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|
|            |                      |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 28日間      |  |
| 薬品名        | 投与量                  | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
|            |                      |      |      | 1   | ・ | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液      | 100mL                | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| イミフィンジ点滴静注 | 1500mg               | 点滴末梢 | 1時間  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液      | 100mL                |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |

備考：本レジメンはDurva＋Treme維持（初回）投与後から使用する。

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

| レジメン名        | NSCLC CBDCA+Pemetrexed+Pembro |      |       |     |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2025/3/28 |  |  |
|--------------|-------------------------------|------|-------|-----|---|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|--|
|              |                               |      |       |     |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |  |  |
| 薬品名          | 投与量                           | 投与方法 | 投与時間  | 投与日 |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
|              |                               |      |       | 1   | . | 21 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液        | 500mL                         | 点滴末梢 | メイン   | ↓   |   |    | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| キイトルーダ点滴静注   | 200mg                         | 点滴末梢 | 30分   | ↓   |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液        | 100mL                         |      |       |     |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| パロノセトロン点滴静注  | 0.75mg/50mL                   | 点滴末梢 | 15分   | ↓   |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| デキサート注射液     | 9.9mg                         |      |       |     |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| ペメトレキシド点滴静注液 | 500mg/m <sup>2</sup>          | 点滴末梢 | 10分以上 | ↓   |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液        | 100mL                         |      |       |     |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| カルボプラチン注射液   | AUC=5                         | 点滴末梢 | 1時間   | ↓   |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| ブドウ糖液 5 %    | 250mL                         |      |       |     |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |

備考：ペメトレキセド投与 7 日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を 7 日前以前より開始、 9 週毎に投与継続。

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

| レジメン名        |                      | NSCLC CDDP+Pemetrexed+Pembro |       |     |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2025/3/28 |
|--------------|----------------------|------------------------------|-------|-----|---|---|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|
|              |                      |                              |       |     |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |
| 薬品名          | 投与量                  | 投与方法                         | 投与時間  | 投与日 |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
|              |                      |                              |       | 1   | 2 | 3 | 4 | ・ | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液        | 500mL                | 点滴末梢                         | メイン   | ↓   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| キイトルーダ点滴静注   | 200mg                | 点滴末梢                         | 30分   | ↓   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液        | 100mL                | 点滴末梢                         |       |     |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| ソルデム3 A 輸液   | 500mL                | 点滴末梢                         | メイン   |     | ↓ | ↓ |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| ソルデム3 A 輸液   | 200mL                | 点滴末梢                         | メイン   |     |   |   | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| ソルデム3 A 輸液   | 500mL                | 点滴末梢                         | 1時間   | ↓   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 硫酸Mg 補正液     | 8mEq                 | 点滴末梢                         |       |     |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| パロノセトロン点滴静注  | 0.75mg/50mL          | 点滴末梢                         | 15分   | ↓   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| デキサート注射液     | 9.9mg                | 点滴末梢                         |       |     |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| デキサート注射液     | 6.6mg                | 点滴末梢                         | 15分   |     | ↓ | ↓ | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液        | 50mL                 | 点滴末梢                         |       |     |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| ペメトレキセド点滴静注  | 500MG/m <sup>2</sup> | 点滴末梢                         | 10分以上 | ↓   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液        | 100mL                | 点滴末梢                         |       |     |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 20%マンニトール注射液 | 200mL                | 点滴末梢                         | 30分   | ↓   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| シスプラチン点滴静注   | 75mg/m <sup>2</sup>  | 点滴末梢                         | 2時間   | ↓   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液        | 500mL                | 点滴末梢                         |       |     |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| ソルデム3 A 輸液   | 500mL                | 点滴末梢                         | 1時間   | ×2  | ↓ |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。  
（制吐剤）アプレピタント、オランザピン併用

| レジメン名       |                      | NSCLC Pemetrexed+Pembro |       |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2020/3/18 |
|-------------|----------------------|-------------------------|-------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|
|             |                      |                         |       |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |
| 薬品名         | 投与量                  | 投与方法                    | 投与時間  | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
|             |                      |                         |       | 1   | ・ | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液       | 100mL                | 点滴末梢                    | メイン   | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| キイトルーダ点滴静注  | 200mg                | 点滴末梢                    | 30分   | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液       | 100mL                | 点滴末梢                    |       |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| デキサート注射液    | 6.6mg                | 点滴末梢                    | 15分   | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液       | 50mL                 | 点滴末梢                    |       |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| ペメトレキセド点滴静注 | 500mg/m <sup>2</sup> | 点滴末梢                    | 10分以上 | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液       | 100mL                | 点滴末梢                    |       |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

| レジメン名       | NSCLC CBDCA+nab PTX+Pembro |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2025/3/24 |  |  |
|-------------|----------------------------|------|------|-----|---|---|---|----|---|----|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|--|
|             |                            |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |  |  |
| 薬品名         | 投与量                        | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
|             |                            |      |      | 1   | ・ | 8 | ・ | 15 | ・ | 21 |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液       | 250mL                      | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液       | 100mL                      | 点滴末梢 | メイン  |     |   | ↓ |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| キイトルーダ点滴静注  | 200mg                      | 点滴末梢 | 30分  | ↓   |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液       | 100mL                      |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| パロノセトロン点滴静注 | 0.75mg/50mL                | 点滴末梢 | 15分  | ↓   |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| デキサート注射液    | 9.9mg                      |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| デキサート注射液    | 6.6mg                      | 点滴末梢 | 15分  |     |   | ↓ |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液       | 50mL                       |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| アブラキサン点滴静注用 | 100mg/m <sup>2</sup>       | 点滴末梢 | 30分  | ↓   |   | ↓ |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液       | 100mL                      |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| カルボプラチン注射液  | AUC=6                      | 点滴末梢 | 1時間  | ↓   |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| ブドウ糖液 5 %   | 250mL                      |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |

備考：

| レジメン名       | NSCLC CBDCA+PTX+Pembro |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2025/3/28 |  |  |
|-------------|------------------------|------|------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|--|
|             |                        |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |  |  |
| 薬品名         | 投与量                    | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
|             |                        |      |      | 1   | ・ | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液       | 500mL                  | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| キイトルーダ点滴静注  | 200mg                  | 点滴末梢 | 30分  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液       | 100mL                  |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| パロノセトロン点滴静注 | 0.75mg/50mL            | 点滴末梢 | 30分  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| デキサート注射液    | 16.5mg                 |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| ガスター注射液     | 20mg                   |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| パクリタキセル注    | 200mg/m <sup>2</sup>   | 点滴末梢 | 3時間  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| 生理食塩液       | 500mL                  |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| カルボプラチン注射液  | AUC=6                  | 点滴末梢 | 1時間  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| ブドウ糖液 5 %   | 250mL                  |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| レスタミンコーワ錠   | 50mg                   | 内服   | 投与前  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |

備考：

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

| レジメン名      | NSCLC Pembro( 3 週毎) |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2021/3/20 |  |  |  |  |  |
|------------|---------------------|------|------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|--|--|--|--|
|            |                     |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |  |  |  |  |  |
| 薬品名        | 投与量                 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |  |  |
|            |                     |      |      | 1   | . | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |  |  |
| 生理食塩液      | 100mL               | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |  |  |
| キイトルーダ点滴静注 | 200mg/body          | 点滴末梢 | 30分  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |  |  |
| 生理食塩液      | 100mL               |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |  |  |

備考：

| レジメン名      | NSCLC Pembro( 6 週毎) |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2021/3/23 |  |  |  |  |  |
|------------|---------------------|------|------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|--|--|--|--|
|            |                     |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 42日間      |  |  |  |  |  |
| 薬品名        | 投与量                 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |  |  |
|            |                     |      |      | 1   | . | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |  |  |
| 生理食塩液      | 100mL               | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |  |  |
| キイトルーダ点滴静注 | 400mg/body          | 点滴末梢 | 30分  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |  |  |
| 生理食塩液      | 100mL               |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |  |  |

備考：

非小細胞肺癌(NSCLC)

| レジメン名        | NSCLC CBDCA+PEM+IPI+NIVO |      |       |     |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2025/3/24 |  |  |  |
|--------------|--------------------------|------|-------|-----|---|----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|--|--|
|              |                          |      |       |     |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 42日間      |  |  |  |
| 薬品名          | 投与量                      | 投与方法 | 投与時間  | 投与日 |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
|              |                          |      |       | 1   | ・ | 22 | ・ | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| 生理食塩液        | 500mL                    | 点滴末梢 | メイン   | ↓   |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| オブジーボ点滴静注    | 360mg                    | 点滴末梢 | 30分   | ↓   |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| 生理食塩液        | 100mL                    |      |       |     |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| ヤーボイ点滴静注液    | 1mg/kg                   | 点滴末梢 | 30分   | ↓   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| 生理食塩液        | 50mL                     |      |       |     |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| パロノセトロン点滴静注  | 0.75mg/50mL              | 点滴末梢 | 15分   | ↓   |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| デキサート注射液     | 9.9mg                    |      |       |     |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| ペメトレキセド点滴静注液 | 500mg/m <sup>2</sup>     | 点滴末梢 | 10分以上 | ↓   |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| 生理食塩液        | 100mL                    |      |       |     |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| カルボプラチン注射液   | AUC=6                    | 点滴末梢 | 1時間   | ↓   |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| ブドウ糖液 5 %    | 250mL                    |      |       |     |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

| レジメン名        | NSCLC CDDP+PEM+IPI+NIVO |      |       |     |   |   |   |   |    |    |    |    |   |    |  |  |  |  |  | 更新日  | 2025/3/28 |  |
|--------------|-------------------------|------|-------|-----|---|---|---|---|----|----|----|----|---|----|--|--|--|--|--|------|-----------|--|
|              |                         |      |       |     |   |   |   |   |    |    |    |    |   |    |  |  |  |  |  | 1クール | 42日間      |  |
| 薬品名          | 投与量                     | 投与方法 | 投与時間  | 投与日 |   |   |   |   |    |    |    |    |   |    |  |  |  |  |  |      |           |  |
|              |                         |      |       | 1   | 2 | 3 | 4 | ・ | 22 | 23 | 24 | 25 | ・ | 42 |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液        | 500mL                   | 点滴末梢 | メイン   | ↓   |   |   |   |   |    | ↓  |    |    |   |    |  |  |  |  |  |      |           |  |
| オブジーボ点滴静注    | 360mg                   | 点滴末梢 | 30分   | ↓   |   |   |   |   |    | ↓  |    |    |   |    |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液        | 100mL                   |      |       |     |   |   |   |   |    |    |    |    |   |    |  |  |  |  |  |      |           |  |
| ヤーボイ点滴静注液    | 1mg/kg                  | 点滴末梢 | 30分   | ↓   |   |   |   |   |    |    |    |    |   |    |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液        | 50mL                    |      |       |     |   |   |   |   |    |    |    |    |   |    |  |  |  |  |  |      |           |  |
| ソルデム 3 A 輸液  | 500mL                   | 点滴末梢 | メイン   |     | ↓ | ↓ |   |   |    |    | ↓  | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |      |           |  |
| ソルデム 3 A 輸液  | 200mL                   | 点滴末梢 | メイン   |     |   |   | ↓ |   |    |    |    |    | ↓ |    |  |  |  |  |  |      |           |  |
| ソルデム 3 A 輸液  | 500mL                   | 点滴末梢 | 1時間   | ↓   |   |   |   |   |    | ↓  |    |    |   |    |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 硫酸M g 補正液    | 8mEq                    |      |       |     |   |   |   |   |    |    |    |    |   |    |  |  |  |  |  |      |           |  |
| パロノセトロン点滴静注  | 0.75mg/50mL             | 点滴末梢 | 15分   | ↓   |   |   |   |   |    | ↓  |    |    |   |    |  |  |  |  |  |      |           |  |
| デキサート注射液     | 9.9mg                   |      |       |     |   |   |   |   |    |    |    |    |   |    |  |  |  |  |  |      |           |  |
| デキサート注射液     | 6.6mg                   | 点滴末梢 | 15分   |     | ↓ | ↓ | ↓ |   |    |    | ↓  | ↓  | ↓ |    |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液        | 50mL                    |      |       |     |   |   |   |   |    |    |    |    |   |    |  |  |  |  |  |      |           |  |
| ペメトレキセド点滴静注液 | 500MG/m <sup>2</sup>    | 点滴末梢 | 10分以上 | ↓   |   |   |   |   |    | ↓  |    |    |   |    |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液        | 100mL                   |      |       |     |   |   |   |   |    |    |    |    |   |    |  |  |  |  |  |      |           |  |
| マンニトール S 注射液 | 200mL                   | 点滴末梢 | 30分   | ↓   |   |   |   |   |    | ↓  |    |    |   |    |  |  |  |  |  |      |           |  |
| シスプラチン点滴静注液  | 75mg/m <sup>2</sup>     | 点滴末梢 | 2時間   | ↓   |   |   |   |   |    | ↓  |    |    |   |    |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液        | 500mL                   |      |       |     |   |   |   |   |    |    |    |    |   |    |  |  |  |  |  |      |           |  |
| ソルデム 3 A 輸液  | 500mL                   | 点滴末梢 | 1時間   | ×2  | ↓ |   |   |   |    | ×2 | ↓  |    |   |    |  |  |  |  |  |      |           |  |

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。  
（制吐剤）アプレピタント、オランザピン併用

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

[illegible]

|     |
|-----|
| 備考： |
|-----|

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

| レジメン名         |                      | NSCLC CBDCA+PTX+BEV+Atezo |        |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2025/3/28 |
|---------------|----------------------|---------------------------|--------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|
|               |                      |                           |        |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |
| 薬品名           | 投与量                  | 投与方法                      | 投与時間   | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
|               |                      |                           |        | 1   | . | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液         | 500mL                | 点滴末梢                      | メイン    | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| テセントリク点滴静注    | 1200mg               | 点滴末梢                      | 30～60分 | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液         | 250mL                |                           |        |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| パロノセトロン点滴静注   | 0.75mg/50mL          | 点滴末梢                      | 30分    | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| デキサート注射液      | 16.5mg               | 点滴末梢                      | 30分    | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| ガスター注射液       | 20mg                 |                           |        |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| パクリタキセル注      | 175mg/m <sup>2</sup> | 点滴末梢                      | 3時間    | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液         | 500mL                |                           |        |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| カルボプラチン注射液    | AUC=6                | 点滴末梢                      | 1時間    | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| ブドウ糖液5%       | 250mL                |                           |        |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| ベバシズマブB S点滴静注 | 15mg/kg              | 点滴末梢                      | 30～90分 | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液         | 100mL                |                           |        |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| レスタミンコーワ錠     | 50mg                 | 内服                        | 投与前    | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |

備考：

| レジメン名         |         | NSCLC BEV+Atezo |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2020/3/18 |
|---------------|---------|-----------------|------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|
|               |         |                 |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |
| 薬品名           | 投与量     | 投与方法            | 投与時間 | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
|               |         |                 |      | 1   | . | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液         | 100mL   | 点滴末梢            | メイン  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| テセントリク点滴静注    | 1200mg  | 点滴末梢            | 30分  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液         | 250mL   |                 |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| ベバシズマブB S点滴静注 | 15mg/kg | 点滴末梢            | 30分  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液         | 100mL   |                 |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |

備考：

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

| レジメン名       |                      | NSCLC CBDCA+nabPTX+Atezo |        |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2025/3/24 |
|-------------|----------------------|--------------------------|--------|-----|---|---|---|----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|
|             |                      |                          |        |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |
| 薬品名         | 投与量                  | 投与方法                     | 投与時間   | 投与日 |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
|             |                      |                          |        | 1   | ・ | 8 | ・ | 15 | ・ | 21 |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液       | 250mL                | 点滴末梢                     | メイン    | ↓   |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液       | 100mL                | 点滴末梢                     | メイン    |     |   | ↓ |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| テセントリク点滴静注  | 1200mg               | 点滴末梢                     | 30～60分 | ↓   |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液       | 250mL                |                          |        |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| パロノセトロン点滴静注 | 0.75mg/50mL          | 点滴末梢                     | 15分    | ↓   |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| デキサート注射液    | 9.9mg                |                          |        |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| デキサート注射液    | 6.6mg                | 点滴末梢                     | 15分    |     |   | ↓ |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液       | 50mL                 |                          |        |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| アブラキサン点滴静注用 | 100mg/m <sup>2</sup> | 点滴末梢                     | 30分    | ↓   |   | ↓ |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液       | 100mL                |                          |        |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| カルボプラチン注射液  | AUC=6                | 点滴末梢                     | 1時間    | ↓   |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| ブドウ糖液5%     | 250mL                |                          |        |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |

備考：

| レジメン名      |        | NSCLC Atezo |        |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2020/3/13 |
|------------|--------|-------------|--------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|
|            |        |             |        |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |
| 薬品名        | 投与量    | 投与方法        | 投与時間   | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
|            |        |             |        | 1   | ・ | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液      | 100mL  | 点滴末梢        | メイン    | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| テセントリク点滴静注 | 1200mg | 点滴末梢        | 30～60分 | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液      | 250mL  |             |        |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |

備考：

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

| レジメン名      | NSCLC Atezo（術後） |      |        |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2022/9/27 |  |
|------------|-----------------|------|--------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|
|            |                 |      |        |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |  |
| 薬品名        | 投与量             | 投与方法 | 投与時間   | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
|            |                 |      |        | 1   | ・ | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液      | 100mL           | 点滴末梢 | メイン    | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| テセントリク点滴静注 | 1200mg          | 点滴末梢 | 30～60分 | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液      | 250mL           |      |        |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |

備考：最大16コース

| レジメン名     | NSCLC NIVO(240mg/body:2週毎) |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2020/3/18 |  |
|-----------|----------------------------|------|------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|
|           |                            |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 14日間      |  |
| 薬品名       | 投与量                        | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
|           |                            |      |      | 1   | ・ | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液     | 100mL                      | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| オブジーボ点滴静注 | 240mg                      | 点滴末梢 | 30分  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液     | 100mL                      |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |

備考：

| レジメン名     | NSCLC NIVO(480mg/body:4週毎) |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2021/3/23 |  |
|-----------|----------------------------|------|------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|
|           |                            |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 28日間      |  |
| 薬品名       | 投与量                        | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
|           |                            |      |      | 1   | ・ | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液     | 100mL                      | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| オブジーボ点滴静注 | 480mg                      | 点滴末梢 | 30分  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液     | 100mL                      |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |

備考：

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

| レジメン名     |        | NSCLC IPI+NIVO(240mg/body:2週毎) |      |     |   |    |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2021/11/24 |
|-----------|--------|--------------------------------|------|-----|---|----|---|----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|------|------------|
|           |        |                                |      |     |   |    |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 42日間       |
| 薬品名       | 投与量    | 投与方法                           | 投与時間 | 投与日 |   |    |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |            |
|           |        |                                |      | 1   | ・ | 15 | ・ | 29 | ・ | 42 |  |  |  |  |  |  |  |      |            |
| 生理食塩液     | 250mL  | 点滴末梢                           | メイン  | ↓   |   |    |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |            |
| 生理食塩液     | 100mL  | 点滴末梢                           | メイン  |     |   | ↓  |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |            |
| オプジーボ点滴静注 | 240mg  | 点滴末梢                           | 30分  | ↓   |   | ↓  |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |            |
| 生理食塩液     | 100mL  |                                |      |     |   |    |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |            |
| ヤーボイ点滴静注液 | 1mg/kg | 点滴末梢                           | 30分  | ↓   |   |    |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |            |
| 生理食塩液     | 50mL   |                                |      |     |   |    |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |            |

備考：

| レジメン名     |        | NSCLC IPI+NIVO(360mg/body:3週毎) |      |     |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2021/11/24 |
|-----------|--------|--------------------------------|------|-----|---|----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------------|
|           |        |                                |      |     |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 42日間       |
| 薬品名       | 投与量    | 投与方法                           | 投与時間 | 投与日 |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |
|           |        |                                |      | 1   | ・ | 22 | ・ | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |
| 生理食塩液     | 250mL  | 点滴末梢                           | メイン  | ↓   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |
| 生理食塩液     | 100mL  | 点滴末梢                           | メイン  |     |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |
| オプジーボ点滴静注 | 360mg  | 点滴末梢                           | 30分  | ↓   |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |
| 生理食塩液     | 100mL  |                                |      |     |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |
| ヤーボイ点滴静注液 | 1mg/kg | 点滴末梢                           | 30分  | ↓   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |
| 生理食塩液     | 50mL   |                                |      |     |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |

備考：

| レジメン名      |        | NSCLC Durvalumab維持（RT後） |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2024/7/25 |
|------------|--------|-------------------------|------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|
|            |        |                         |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 28日間      |
| 薬品名        | 投与量    | 投与方法                    | 投与時間 | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
|            |        |                         |      | 1   | ・ | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液      | 100mL  | 点滴末梢                    | メイン  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| イミフィンジ点滴静注 | 1500mg | 点滴末梢                    | 1時間  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液      | 100mL  |                         |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |

備考：投与期間は12ヶ月まで。

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

| レジメン名                    |                               | NSCLC CBDCA+Pemetrexed+BEV |        |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2025/3/28 |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|
|                          |                               |                            |        |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |
| 薬品名                      | 投与量                           | 投与方法                       | 投与時間   | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
|                          |                               |                            |        | 1   | . | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液                    | 500mL                         | 点滴末梢                       | メイン    | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| パロノセトロン点滴静注<br>デキサート注射液  | 0.75mg/50mL<br>9.9mg          | 点滴末梢                       | 15分    | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| ペメトレキセド点滴静注<br>生理食塩液     | 500mg/m <sup>2</sup><br>100mL | 点滴末梢                       | 10分以上  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| カルボプラチン注射液<br>ブドウ糖液 5 %  | AUC=6<br>250mL                | 点滴末梢                       | 1時間    | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| ベバシズマブ B S 点滴静注<br>生理食塩液 | 15mg/kg<br>100mL              | 点滴末梢                       | 30～90分 | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |

備考：ペメトレキセド投与 7 日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を 7 日前以前より開始、9 週毎に投与継続。

| レジメン名                    |                               | NSCLC Pemetrexed+BEV |       |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2020/3/18 |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------|-------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|
|                          |                               |                      |       |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |
| 薬品名                      | 投与量                           | 投与方法                 | 投与時間  | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
|                          |                               |                      |       | 1   | . | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液                    | 100mL                         | 点滴末梢                 | メイン   | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液<br>デキサート注射液        | 50mL<br>6.6mg                 | 点滴末梢                 | 15分   | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| ペメトレキセド点滴静注<br>生理食塩液     | 500mg/m <sup>2</sup><br>100mL | 点滴末梢                 | 10分以上 | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| ベバシズマブ B S 点滴静注<br>生理食塩液 | 15mg/kg<br>100mL              | 点滴末梢                 | 30分   | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |

備考：ペメトレキセド投与 7 日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を 7 日前以前より開始、9 週毎に投与継続。

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

| レジメン名                   | NSCLC CBDCA＋Pemetrexed        |      |       |     |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2025/3/28 |  |  |
|-------------------------|-------------------------------|------|-------|-----|---|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|--|
|                         |                               |      |       |     |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |  |  |
| 薬品名                     | 投与量                           | 投与方法 | 投与時間  | 投与日 |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
|                         |                               |      |       | 1   | ・ | 21 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| ソルデム 3 A 輸液             | 500mL                         | 点滴末梢 | メイン   | ↓   |   |    | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| パロノセトロン点滴静注<br>デキサート注射液 | 0.75mg/50mL<br>9.9mg          | 点滴末梢 | 30分   | ↓   |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| ペメトレキセド点滴静注液<br>生理食塩液   | 500mg/m <sup>2</sup><br>100mL | 点滴末梢 | 10分以上 | ↓   |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| カルボプラチン注射液<br>ブドウ糖液 5 % | AUC=5<br>250mL                | 点滴末梢 | 1時間   | ↓   |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

| レジメン名        | NSCLC CDDP+Pemetrexed |      |       |     |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2025/3/28 |  |
|--------------|-----------------------|------|-------|-----|---|---|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|
|              |                       |      |       |     |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |  |
| 薬品名          | 投与量                   | 投与方法 | 投与時間  | 投与日 |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
|              |                       |      |       | 1   | 2 | 3 | 4 | ・ | 21 |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液        | 500mL                 | 点滴末梢 | メイン   | ↓   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| ソルデム 3 A 輸液  | 500mL                 | 点滴末梢 | メイン   |     | ↓ | ↓ |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| ソルデム 3 A 輸液  | 200mL                 | 点滴末梢 | メイン   |     |   |   | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| ソルデム 3 A 輸液  | 500mL                 | 点滴末梢 | 1時間   | ↓   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 硫酸M g 補正液    | 8mEq                  | 点滴末梢 |       |     |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| パロノセトロン点滴静注  | 0.75mg/50mL           | 点滴末梢 | 15分   | ↓   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| デキサート注射液     | 9.9mg                 |      |       |     |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| デキサート注射液     | 6.6mg                 | 点滴末梢 | 15分   |     | ↓ | ↓ | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液        | 50mL                  |      |       |     |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| ペメトレキシド点滴静注液 | 500MG/m <sup>2</sup>  | 点滴末梢 | 10分以上 | ↓   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液        | 100mL                 |      |       |     |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 20%マンニトール注射液 | 200mL                 | 点滴末梢 | 30分   | ↓   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| シスプラチン点滴静注液  | 75mg/m <sup>2</sup>   | 点滴末梢 | 2時間   | ↓   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液        | 500mL                 |      |       |     |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| ソルデム 3 A 輸液  | 500mL                 | 点滴末梢 | 1時間   | ×2  | ↓ |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。  
（制吐剤）アプレピタント、オランザピン併用

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

| レジメン名        |                      | NSCLC Pemetrexed |       |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2020/3/18 |
|--------------|----------------------|------------------|-------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|
|              |                      |                  |       |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |
| 薬品名          | 投与量                  | 投与方法             | 投与時間  | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
|              |                      |                  |       | 1   | ・ | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液        | 100mL                | 点滴末梢             | メイン   | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| デキサート注射液     | 6.6mg                | 点滴末梢             | 15分   | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液        | 50mL                 |                  |       |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| ペメトレキセド点滴静注液 | 500mg/m <sup>2</sup> | 点滴末梢             | 10分以上 | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液        | 100mL                |                  |       |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

| レジメン名       |                      | NSCLC CBDCA+nab PTX |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2025/3/24 |
|-------------|----------------------|---------------------|------|-----|---|---|---|----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|
|             |                      |                     |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |
| 薬品名         | 投与量                  | 投与方法                | 投与時間 | 投与日 |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
|             |                      |                     |      | 1   | ・ | 8 | ・ | 15 | ・ | 21 |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液       | 250mL                | 点滴末梢                | メイン  | ↓   |   | ↓ |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| パロノセトロン点滴静注 | 0.75mg/50mL          | 点滴末梢                | 15分  | ↓   |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| デキサート注射液    | 9.9mg                |                     |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| デキサート注射液    | 6.6mg                | 点滴末梢                | 15分  |     |   | ↓ |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液       | 50mL                 |                     |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| アブラキサン点滴静注用 | 100mg/m <sup>2</sup> | 点滴末梢                | 30分  | ↓   |   | ↓ |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液       | 100mL                |                     |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| カルボプラチン注射液  | AUC=6                | 点滴末梢                | 1時間  | ↓   |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| ブドウ糖液5%     | 250mL                |                     |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |      |           |

備考：

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

| レジメン名         |                      | NSCLC CBDCA+PTX+BEV |        |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2025/3/28 |
|---------------|----------------------|---------------------|--------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|
|               |                      |                     |        |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |
| 薬品名           | 投与量                  | 投与方法                | 投与時間   | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
|               |                      |                     |        | 1   | . | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液         | 500mL                | 点滴末梢                | メイン    | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| パロノセトロン点滴静注   | 0.75mg/50mL          | 点滴末梢                | 30分    | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| デキサート注射液      | 16.5mg               | 点滴末梢                |        |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| ガスター注射液       | 20mg                 |                     |        |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| パクリタキセル注      | 200mg/m <sup>2</sup> | 点滴末梢                | 3時間    | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液         | 500mL                |                     |        |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| カルボプラチン注射液    | AUC=6                | 点滴末梢                | 1時間    | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| ブドウ糖液5%       | 250mL                |                     |        |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| ベバシズマブB S点滴静注 | 15mg/kg              | 点滴末梢                | 30～90分 | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液         | 100mL                |                     |        |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| レスタミンコーワ錠     | 50mg                 | 内服                  | 投与前    | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |

備考：

| レジメン名         |         | NSCLC BEV |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2020/3/18 |
|---------------|---------|-----------|------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|
|               |         |           |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |
| 薬品名           | 投与量     | 投与方法      | 投与時間 | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
|               |         |           |      | 1   | . | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液         | 100mL   | 点滴末梢      | メイン  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| ベバシズマブB S点滴静注 | 15mg/kg | 点滴末梢      | 30分  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液         | 100mL   |           |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |

備考：

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

| レジメン名       | NSCLC CBDCA+PTX      |      |      |     |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2025/3/28 |  |  |  |
|-------------|----------------------|------|------|-----|---|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|--|--|
|             |                      |      |      |     |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |  |  |  |
| 薬品名         | 投与量                  | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
|             |                      |      |      | 1   | . | 21 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| ラクテック注      | 500mL                | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   |    | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| パロノセトロン点滴静注 | 0.75mg/50mL          | 点滴末梢 | 30分  | ↓   |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| デキサート注射液    | 16.5mg               |      |      |     |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| ガスター注射液     | 20mg                 |      |      |     |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| パクリタキセル注    | 200mg/m <sup>2</sup> | 点滴末梢 | 3時間  | ↓   |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| 生理食塩液       | 500mL                |      |      |     |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| カルボプラチン注射液  | AUC=6                | 点滴末梢 | 1時間  | ↓   |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| ブドウ糖液5%     | 250mL                |      |      |     |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| レスタミンコーワ錠   | 50mg                 | 内服   | 投与前  | ↓   |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |

備考：

| レジメン名       | NSCLC weeklyCBDCA+PTX |      |      |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2020/3/18 |  |
|-------------|-----------------------|------|------|-----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|
|             |                       |      |      |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 7日間       |  |
| 薬品名         | 投与量                   | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
|             |                       |      |      | 1   | . | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液       | 250mL                 | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| グラニセトロン点滴静注 | 1mg/50mL              | 点滴末梢 | 30分  | ↓   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| デキサート注射液    | 9.9mg                 |      |      |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| ガスター注射液     | 20mg                  |      |      |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| パクリタキセル注    | 40mg/m <sup>2</sup>   | 点滴末梢 | 1時間  | ↓   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液       | 250mL                 |      |      |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| カルボプラチン注射液  | AUC=2                 | 点滴末梢 | 1時間  | ↓   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| ブドウ糖液 5 %   | 250mL                 |      |      |     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| レスタミンコーワ錠   | 50mg                  | 内服   | 投与前  | ↓   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |

備考：放射線併用（6コースまで）

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

| レジメン名       | NSCLC CBDCA+DTX     |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2025/3/24 |  |  |  |
|-------------|---------------------|------|------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|--|--|
|             |                     |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |  |  |  |
| 薬品名         | 投与量                 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
|             |                     |      |      | 1   | . | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| 生理食塩液       | 500mL               | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| パロノセトロン点滴静注 | 0.75mg/50mL         | 点滴末梢 | 15分  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| デキサート注射液    | 9.9mg               |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| ドセタキセル点滴静注  | 60mg/m <sup>2</sup> | 点滴末梢 | 1時間  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| ブドウ糖液 5 %   | 250mL               |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| カルボプラチン注射液  | AUC=6               | 点滴末梢 | 1時間  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| ブドウ糖液 5 %   | 250mL               |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |

備考：

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

| レジメン名          | NSCLC CDDP+DTX（RT併用） |      |      |     |   |   |   |   |     |   |    |    |   |    |  |  |  |  |  | 更新日  | 2025/3/28 |  |  |  |
|----------------|----------------------|------|------|-----|---|---|---|---|-----|---|----|----|---|----|--|--|--|--|--|------|-----------|--|--|--|
|                |                      |      |      |     |   |   |   |   |     |   |    |    |   |    |  |  |  |  |  | 1クール | 28日間      |  |  |  |
| 薬品名            | 投与量                  | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |   |   |   |     |   |    |    |   |    |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
|                |                      |      |      | 1   | 2 | 3 | 4 | ・ | 8   | 9 | 10 | 11 | ・ | 28 |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| 生理食塩液          | 500mL                | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   |   |   |   | ↓   |   |    |    |   |    |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| ソルデム 3 A 輸液    | 500mL                | 点滴末梢 | メイン  |     | ↓ | ↓ |   |   |     | ↓ | ↓  |    |   |    |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| ソルデム 3 A 輸液    | 200mL                | 点滴末梢 | メイン  |     |   |   | ↓ |   |     |   |    | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| ソルデム 3 A 輸液    | 500mL                | 点滴末梢 | 1時間  | ↓   |   |   |   |   | ↓   |   |    |    |   |    |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| 硫酸M g 補正液      | 8mEq                 |      |      |     |   |   |   |   |     |   |    |    |   |    |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| パロノセトロン点滴静注    | 0.75mg               | 点滴末梢 | 15分  | ↓   |   |   |   |   | ↓   |   |    |    |   |    |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| デキサート注射液       | 9.9mg                |      |      |     |   |   |   |   |     |   |    |    |   |    |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| デキサート注射液       | 6.6mg                | 点滴末梢 | 15分  |     | ↓ | ↓ | ↓ |   |     | ↓ | ↓  | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| 生理食塩液          | 50mL                 |      |      |     |   |   |   |   |     |   |    |    |   |    |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| ドセタキセル点滴静注     | 40MG/㎡               | 点滴末梢 | 1時間  | ↓   |   |   |   |   | ↓   |   |    |    |   |    |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| 生理食塩液          | 250mL                |      |      |     |   |   |   |   |     |   |    |    |   |    |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| 2 0 %マンニトール注射液 | 200mL                | 点滴末梢 | 30分  | ↓   |   |   |   |   | ↓   |   |    |    |   |    |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| シスプラチン点滴静注液    | 40mg/㎡               | 点滴末梢 | 2時間  | ↓   |   |   |   |   | ↓   |   |    |    |   |    |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| 生理食塩液          | 500mL                |      |      |     |   |   |   |   |     |   |    |    |   |    |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| ソルデム 3 A 輸液    | 500mL                | 点滴末梢 | 1時間  | × 2 | ↓ |   |   |   | × 2 | ↓ |    |    |   |    |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |

備考：2コースまで。ドセタキセル；ショックに注意。CCRT後、ICI維持を行う場合、インターバル短縮の可能性有り。  
（制吐剤）アプレピタント、オランザピン併用

非小細胞肺癌(NSCLC)

| レジメン名        | NSCLC CDDP+DTX      |      |      |     |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2025/3/28 |  |
|--------------|---------------------|------|------|-----|---|---|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|
|              |                     |      |      |     |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |  |
| 薬品名          | 投与量                 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
|              |                     |      |      | 1   | 2 | 3 | 4 | ・ | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液        | 500mL               | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| ソルデム3 A 輸液   | 500mL               | 点滴末梢 | メイン  |     | ↓ | ↓ |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| ソルデム3 A 輸液   | 200mL               | 点滴末梢 | メイン  |     |   |   | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| ソルデム3 A 輸液   | 500mL               | 点滴末梢 | 1時間  | ↓   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 硫酸M g 補正液    | 8mEq                | 点滴末梢 | 1時間  | ↓   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| パロノセトロン点滴静注  | 0.75mg              | 点滴末梢 | 15分  | ↓   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| デキサート注射液     | 9.9mg               | 点滴末梢 | 15分  |     | ↓ | ↓ | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| デキサート注射液     | 6.6mg               | 点滴末梢 | 15分  |     | ↓ | ↓ | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液        | 50mL                | 点滴末梢 | 15分  |     | ↓ | ↓ | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| ドセタキセル点滴静注   | 60mg/m <sup>2</sup> | 点滴末梢 | 1時間  | ↓   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液        | 250mL               | 点滴末梢 | 1時間  | ↓   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 20%マンニトール注射液 | 200mL               | 点滴末梢 | 30分  | ↓   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| シスプラチン点滴静注液  | 80mg/m <sup>2</sup> | 点滴末梢 | 2時間  | ↓   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液        | 500mL               | 点滴末梢 | 2時間  | ↓   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| ソルデム3 A 輸液   | 500mL               | 点滴末梢 | 1時間  | ×2  | ↓ |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |

備考：（制吐剤）アプレピタント、オランザピン併用

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

| レジメン名       |                     | NSCLC CBDCA+S-1 |      |           |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2025/3/28 |
|-------------|---------------------|-----------------|------|-----------|---|----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|
|             |                     |                 |      |           |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |
| 薬品名         | 投与量                 | 投与方法            | 投与時間 | 投与日       |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
|             |                     |                 |      | 1         | ・ | 14 | ・ | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液       | 100mL               | 点滴末梢            | メイン  | ↓         |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| パロノセトロン点滴静注 | 0.75mg/50mL         | 点滴末梢            | 15分  | ↓         |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| デキサート注射液    | 9.9mg               | 点滴末梢            |      |           |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| カルボプラチン注射液  | AUC=5               | 点滴末梢            | 1時間  | ↓         |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| ブドウ糖液5%     | 250mL               |                 |      |           |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| S-1         | 80mg/m <sup>2</sup> | 内服              | 1日2回 | day1~14服用 |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |

備考：

| レジメン名        |                     | NSCLC CDDP+S-1 |      |           |   |    |   |    |    |   |    |   |    |  |  |  |  | 更新日  | 2025/3/28 |
|--------------|---------------------|----------------|------|-----------|---|----|---|----|----|---|----|---|----|--|--|--|--|------|-----------|
|              |                     |                |      |           |   |    |   |    |    |   |    |   |    |  |  |  |  | 1クール | 35日間      |
| 薬品名          | 投与量                 | 投与方法           | 投与時間 | 投与日       |   |    |   |    |    |   |    |   |    |  |  |  |  |      |           |
|              |                     |                |      | 1         | ・ | 8  | 9 | 10 | 11 | ・ | 21 | ・ | 35 |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液        | 500mL               | 点滴末梢           | メイン  |           |   | ↓  |   |    |    |   |    |   |    |  |  |  |  |      |           |
| ソルデム3A輸液     | 500mL               | 点滴末梢           | メイン  |           |   |    | ↓ | ↓  |    |   |    |   |    |  |  |  |  |      |           |
| ソルデム3A輸液     | 200mL               | 点滴末梢           | メイン  |           |   |    |   |    | ↓  |   |    |   |    |  |  |  |  |      |           |
| ソルデム3A輸液     | 500mL               | 点滴末梢           | 1時間  |           |   | ↓  |   |    |    |   |    |   |    |  |  |  |  |      |           |
| 硫酸Mg補正液      | 8mEq                | 点滴末梢           |      |           |   |    |   |    |    |   |    |   |    |  |  |  |  |      |           |
| パロノセトロン点滴静注  | 0.75mg/50mL         | 点滴末梢           | 15分  |           |   | ↓  |   |    |    |   |    |   |    |  |  |  |  |      |           |
| デキサート注射液     | 9.9mg               |                |      |           |   |    |   |    |    |   |    |   |    |  |  |  |  |      |           |
| デキサート注射液     | 6.6mg               | 点滴末梢           | 15分  |           |   |    | ↓ | ↓  | ↓  |   |    |   |    |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液        | 50mL                |                |      |           |   |    |   |    |    |   |    |   |    |  |  |  |  |      |           |
| 20%マンニトール注射液 | 200mL               | 点滴末梢           | 30分  |           |   | ↓  |   |    |    |   |    |   |    |  |  |  |  |      |           |
| シスプラチン点滴静注液  | 80mg/m <sup>2</sup> | 点滴末梢           | 2時間  |           |   | ↓  |   |    |    |   |    |   |    |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液        | 500mL               |                |      |           |   |    |   |    |    |   |    |   |    |  |  |  |  |      |           |
| ソルデム3A輸液     | 500mL               | 点滴末梢           | 1時間  |           |   | ×2 | ↓ |    |    |   |    |   |    |  |  |  |  |      |           |
| S-1          | 80mg/m <sup>2</sup> | 内服             | 1日2回 | day1~21服用 |   |    |   |    |    |   |    |   |    |  |  |  |  |      |           |

備考：（制吐剤）アプレピタント、オランザピン併用

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

| レジメン名        | NSCLC CBDCA+PEM+Osimertinib |      |       |      |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2025/3/28 |  |  |  |
|--------------|-----------------------------|------|-------|------|---|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|--|--|
|              |                             |      |       |      |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |  |  |  |
| 薬品名          | 投与量                         | 投与方法 | 投与時間  | 投与日  |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
|              |                             |      |       | 1    | . | 21 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| ソルデム3 A 輸液   | 500mL                       | 点滴末梢 | メイン   | ↓    |   |    | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| パロノセトロン点滴静注  | 0.75mg/50mL                 | 点滴末梢 | 15分   | ↓    |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| デキサート注射液     | 9.9mg                       |      |       |      |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| ペメトレキセド点滴静注液 | 500mg/m <sup>2</sup>        | 点滴末梢 | 10分以上 | ↓    |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| 生理食塩液        | 100mL                       |      |       |      |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| カルボプラチン注射液   | AUC=5                       | 点滴末梢 | 1時間   | ↓    |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| ブドウ糖液 5 %    | 250mL                       |      |       |      |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |
| タグリッソ錠       | 80mg                        | 内服   | 1日1回  | 連日内服 |   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。最大4コース、以降維持療法へ。

| レジメン名        | NSCLC PEM+Osimertinib |      |       |      |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2025/3/28 |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------|------|-------|------|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|--|--|--|
|              |                       |      |       |      |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |  |  |  |  |
| 薬品名          | 投与量                   | 投与方法 | 投与時間  | 投与日  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |  |
|              |                       |      |       | 1    | . | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |  |
| 生理食塩液        | 100mL                 | 点滴末梢 | メイン   | ↓    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |  |
| デキサート注射液     | 6.6mg                 | 点滴末梢 | 15分   | ↓    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |  |
| 生理食塩液        | 50mL                  |      |       | ↓    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |  |
| ペメトレキシド点滴静注液 | 500mg/m <sup>2</sup>  | 点滴末梢 | 10分以上 | ↓    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |  |
| 生理食塩液        | 100mL                 |      |       | ↓    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |  |
| タグリッソ錠       | 80mg                  | 内服   | 1日1回  | 連日内服 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |  |  |

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

| レジメン名         |         | NSCLC BEV+Erl |        |      |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2020/3/18 |
|---------------|---------|---------------|--------|------|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|
|               |         |               |        |      |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |
| 薬品名           | 投与量     | 投与方法          | 投与時間   | 投与日  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液         | 100mL   | 点滴末梢          | メイン    | 1    | . | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| ベバシズマブB S点滴静注 | 15mg/kg | 点滴末梢          | 30～90分 | ↓    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液         | 100mL   |               |        | ↓    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| タルセバ錠         | 150mg   | 内服            | 1日1回   | 連日内服 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |

備考：

| レジメン名      |         | NSCLC RAM+Erl |        |      |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2021/11/24 |
|------------|---------|---------------|--------|------|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------------|
|            |         |               |        |      |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 14日間       |
| 薬品名        | 投与量     | 投与方法          | 投与時間   | 投与日  |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |
| 生理食塩液      | 250mL   | 点滴末梢          | メイン    | 1    | . | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |
| サイラムザ点滴静注液 | 10mg/kg | 点滴末梢          | 30～60分 | ↓    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |
| タルセバ錠      | 150mg   | 内服            | 1日1回   | 連日内服 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |            |

備考：前投薬として抗ヒスタミン剤を使用（経口薬も可）

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

| レジメン名        |                     | NSCLC CDDP＋VNR |      |     |    |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  | 更新日  | 2025/3/28 |
|--------------|---------------------|----------------|------|-----|----|---|---|---|---|---|---|----|--|--|--|--|--|------|-----------|
|              |                     |                |      |     |    |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |
| 薬品名          | 投与量                 | 投与方法           | 投与時間 | 投与日 |    |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |      |           |
|              |                     |                |      | 1   | 2  | 3 | 4 | 5 | ・ | 8 | ・ | 21 |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液        | 500mL               | 点滴末梢           | メイン  | ↓   |    |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |      |           |
| ソルデム3 A 輸液   | 500mL               | 点滴末梢           | メイン  |     | ↓  | ↓ |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |      |           |
| ソルデム3 A 輸液   | 200mL               | 点滴末梢           | メイン  |     |    |   | ↓ |   |   | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |      |           |
| ソルデム3 A 輸液   | 500mL               | 点滴末梢           | 1時間  | ↓   |    |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |      |           |
| 硫酸Mg 補正液     | 8mEq                | 点滴末梢           | 1時間  | ↓   |    |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |      |           |
| パロノセトロン点滴静注  | 0.75mg/50mL         | 点滴末梢           | 15分  | ↓   |    |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |      |           |
| デキサート注射液     | 9.9mg               | 点滴末梢           | 15分  |     |    |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |      |           |
| デキサート注射液     | 6.6mg               | 点滴末梢           | 15分  |     | ↓  | ↓ | ↓ |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液        | 50mL                | 点滴末梢           | 15分  |     | ↓  | ↓ | ↓ |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |      |           |
| ロゼウス静注液      | 25mg/m <sup>2</sup> | 点滴末梢           | 全開   | ↓   |    |   |   |   |   | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液        | 50mL                | 点滴末梢           | 全開   | ↓   |    |   |   |   |   | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |      |           |
| 20%マンニトール注射液 | 200mL               | 点滴末梢           | 30分  | ↓   |    |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |      |           |
| シスプラチン点滴静注液  | 80mg/m <sup>2</sup> | 点滴末梢           | 2時間  | ↓   |    |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液        | 500mL               | 点滴末梢           | 2時間  | ↓   |    |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |      |           |
| ソルデム3 A 輸液   | 500mL               | 点滴末梢           | 1時間  | ×2  | ×1 |   |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  |  |      |           |

備考：（制吐剤）アプレピタント、オランザピン併用

| レジメン名      |                       | NSCLC GEM＋VNR |      |     |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2020/3/18 |
|------------|-----------------------|---------------|------|-----|---|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|
|            |                       |               |      |     |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |
| 薬品名        | 投与量                   | 投与方法          | 投与時間 | 投与日 |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
|            |                       |               |      | 1   | ・ | 8 | ・ | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| ソルデム3 A 輸液 | 200mL                 | 点滴末梢          | メイン  | ↓   |   | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| デキサート注射液   | 6.6mg                 | 点滴末梢          | 15分  | ↓   |   | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液      | 50mL                  | 点滴末梢          | 15分  | ↓   |   | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| ロゼウス静注液    | 25mg/m <sup>2</sup>   | 点滴末梢          | 全開   | ↓   |   | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| 生理食塩液      | 50mL                  | 点滴末梢          | 全開   | ↓   |   | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| ゲムシタビン点滴静注 | 1000mg/m <sup>2</sup> | 点滴末梢          | 30分  | ↓   |   | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |
| ブドウ糖液5%    | 100mL                 | 点滴末梢          | 30分  | ↓   |   | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |

備考：

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

| レジメン名                   | NSCLC DTX                    |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2020/3/18 |  |  |
|-------------------------|------------------------------|------|------|-----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|--|
|                         |                              |      |      |     |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |  |  |
| 薬品名                     | 投与量                          | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
|                         |                              |      |      | 1   | ・ | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| ソルデム 3 A 輸液             | 200mL                        | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| グラニセトロン点滴静注<br>デキサート注射液 | 1mg/50mL<br>6.6mg            | 点滴末梢 | 15分  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |
| ドセタキセル点滴静注<br>生理食塩液     | 60mg/m <sup>2</sup><br>500mL | 点滴末梢 | 2時間  | ↓   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |  |

備考：

| レジメン名       | NSCLC nab PTX        |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2021/11/24 |  |
|-------------|----------------------|------|------|-----|---|---|---|----|---|----|--|--|--|--|--|--|------|------------|--|
|             |                      |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間       |  |
| 薬品名         | 投与量                  | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |      |            |  |
|             |                      |      |      | 1   | ・ | 8 | ・ | 15 | ・ | 21 |  |  |  |  |  |  |      |            |  |
| 生理食塩液       | 100mL                | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   | ↓ |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |      |            |  |
| デキサート注射液    | 6.6mg                | 点滴末梢 | 15分  | ↓   |   | ↓ |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |      |            |  |
| 生理食塩液       | 50mL                 |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |      |            |  |
| アブラキサン点滴静注用 | 100mg/m <sup>2</sup> | 点滴末梢 | 30分  | ↓   |   | ↓ |   | ↓  |   |    |  |  |  |  |  |  |      |            |  |
| 生理食塩液       | 100mL                |      |      |     |   |   |   |    |   |    |  |  |  |  |  |  |      |            |  |

備考：

| レジメン名      | NSCLC GEM             |      |      |     |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2020/3/18 |  |
|------------|-----------------------|------|------|-----|---|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|
|            |                       |      |      |     |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |  |
| 薬品名        | 投与量                   | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
|            |                       |      |      | 1   | ・ | 8 | ・ | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液      | 100mL                 | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| デキサート注射液   | 6.6mg                 | 点滴末梢 | 15分  | ↓   |   | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液      | 50mL                  |      |      |     |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| ゲムシタビン点滴静注 | 1000mg/m <sup>2</sup> | 点滴末梢 | 30分  | ↓   |   | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| ブドウ糖液 5 %  | 100mL                 |      |      |     |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |

備考：

# 非小細胞肺癌(NSCLC)

| レジメン名   | NSCLC VNR           |      |      |     |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2020/3/18 |  |
|---------|---------------------|------|------|-----|---|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|
|         |                     |      |      |     |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |  |
| 薬品名     | 投与量                 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
|         |                     |      |      | 1   | ・ | 8 | ・ | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液   | 100mL               | 点滴末梢 | メイン  | ↓   |   | ↓ |   | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| ロゼウス静注液 | 25mg/m <sup>2</sup> | 点滴末梢 | 全開   | ↓   |   | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液   | 50mL                |      |      |     |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |

備考：

| レジメン名                   | NSCLC AMR(non-small)        |      |      |     |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更新日  | 2020/3/18 |  |
|-------------------------|-----------------------------|------|------|-----|---|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|--|
|                         |                             |      |      |     |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1クール | 21日間      |  |
| 薬品名                     | 投与量                         | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
|                         |                             |      |      | 1   | 2 | 3 | ・ | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| 生理食塩液                   | 100mL                       | 点滴末梢 | メイン  | ↓   | ↓ | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| グラニセトロン点滴静注<br>デキサート注射液 | 1mg/50mL<br>6.6mg           | 点滴末梢 | 15分  | ↓   | ↓ | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |
| カルセド注射用<br>生理食塩液        | 40MG/m <sup>2</sup><br>50mL | 点滴末梢 | 全開   | ↓   | ↓ | ↓ |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |           |  |

備考：