

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC (術前) CBDCA+PTX+NIVO				更新日		2025/3/24													
					1クール		21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
オブジーボ点滴静注	360mg	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																
デキサート注射液	16.5mg	点滴末梢	30分	↓																
ガスター注射液	20mg																			
パクリタキセル注	200mg/m ²	点滴末梢	3時間	↓																
生理食塩液	500mL																			
カルボプラチン注射液	AUC=6	点滴末梢	1時間	↓																
ブドウ糖液5%	250mL																			
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																

備考：術前最大3コース

レジメン名	NSCLC (術前) CBDCA+PEM+NIVO				更新日		2025/3/24													
					1クール		21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
オブジーボ点滴静注	360mg	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																
デキサート注射液	9.9mg	点滴末梢	15分	↓																
ペメトレキセド点滴静注液	500mg/m ²	点滴末梢	10分以上	↓																
生理食塩液	100mL																			
カルボプラチン注射液	AUC=5	点滴末梢	1時間	↓																
ブドウ糖液5%	250mL																			

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。術前最大3コース

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC (術前) CDDP+PEM+Pembro													更新日	2025/3/28									
														1クール	21日間									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																				
				1	2	3	4	・	21															
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																				
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓																				
生理食塩液	100mL	点滴末梢																						
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	メイン		↓	↓																		
ソルデム3A輸液	200mL	点滴末梢	メイン				↓																	
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	↓																				
硫酸Mg補正液	8mEq	点滴末梢																						
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢																						
アロカリス点滴静注	235mg	点滴末梢	30分	↓																				
デキサート注射液	9.9mg																							
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分		↓	↓	↓																	
生理食塩液	50mL																							
ペメトレキセド点滴静注液	500mg/m ²	点滴末梢	10分以上	↓																				
生理食塩液	100mL																							
20%マンニトール注射液	200mL	点滴末梢	30分	↓																				
シスプラチン点滴静注液	75mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																				
生理食塩液	500mL																							
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	×2	↓																			

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。術前最大4コース。

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC（術後）Pembro(3週毎)				更新日															
					1クール		21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
キイトルーダ点滴静注	200mg/body	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			

備考：術前補助療法を実施後、術後補助療法として投与。最大13コース。

レジメン名	NSCLC（術後）Pembro(6週毎)				更新日															
					1クール		42日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	42														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
キイトルーダ点滴静注	400mg/body	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			

備考：術前補助療法を実施後、術後補助療法として投与。最大7コース。

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC PEM+Durva+Treme維持（初回）													更新日					
														1クール	2024/7/25 56日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	29	56													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン		↓														
イジユド点滴静注 生理食塩液	75mg 100mL	点滴末梢	1時間		↓														
イミフィンジ点滴静注 生理食塩液	1500mg 100mL	点滴末梢	1時間	↓	↓														
デキサート注射液 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴末梢	15分	↓	↓														
ペメトレキセド点滴静注液 生理食塩液	500mg/m ² 100mL	点滴末梢	10分以上	↓	↓														

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。本レジメンは1回のみ。次はPEM+Durva維持（2回目以降）へ。イジユドは前レジメンを含み合計5回投与で終了。

レジメン名	NSCLC PEM+Durva維持（2回目以降）													更新日					
														1クール	2024/7/25 28日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	28														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
イミフィンジ点滴静注 生理食塩液	1500mg 100mL	点滴末梢	1時間	↓															
デキサート注射液 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴末梢	15分	↓															
ペメトレキセド点滴静注液 生理食塩液	500mg/m ² 100mL	点滴末梢	10分以上	↓															

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。本レジメンはPEM+Durva+Treme維持（初回）投与後から使用する。

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CBDCA+nab PTX+Durva+Treme													更新日	2025/3/24					
														1クール	21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	8	15	21													
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン			↓		↓												
イジユド点滴静注	75mg	点滴末梢	1時間	↓																
生理食塩液	100mL	点滴末梢																		
イミフィンジ点滴静注	1500mg	点滴末梢	1時間	↓																
生理食塩液	100mL	点滴末梢																		
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																
デキサート注射液	9.9mg	点滴末梢																		
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分			↓		↓												
生理食塩液	50mL	点滴末梢																		
アブラキサン点滴静注用	100mg/m ²	点滴末梢	30分	↓		↓		↓												
生理食塩液	100mL	点滴末梢																		
カルボプラチン注射液	AUC=6	点滴末梢	1時間	↓																
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢																		

備考：4コースまで施行。次はDurva+Treme維持（初回）へ

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC Durva+Treme維持（初回）													更新日					
														1クール		2024/6/25			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	29	・	56											
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓													
イジユド点滴静注 生理食塩液	75mg 100mL	点滴末梢	1時間			↓													
イミフィンジ点滴静注 生理食塩液	1500mg 100mL	点滴末梢	1時間	↓		↓													

備考：本レジメンは1回のみ。次はDurva維持（2回目以降）へ。イジユドは前レジメンを含み合計5回投与で終了。

レジメン名	NSCLC Durva維持（2回目以降）													更新日					
														1クール		2024/6/25			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	28													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
イミフィンジ点滴静注 生理食塩液	1500mg 100mL	点滴末梢	1時間	↓															

備考：本レジメンはDurva+Treme維持（初回）投与後から使用する。

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC Pembro(3週毎)				更新日	2021/3/20														
					1クール	21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
キイトルーダ点滴静注	200mg/body	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			

備考：

レジメン名	NSCLC Pembro(6週毎)				更新日	2021/3/23														
					1クール	42日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	42														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
キイトルーダ点滴静注	400mg/body	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			

備考：

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CBDCA+PEM+IPI+NIVO													更新日	2025/3/24				
														1クール	42日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	22	42													
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓														
オブジーボ点滴静注 生理食塩液	360mg 100mL	点滴末梢	30分	↓	↓														
ヤーボイ点滴静注 生理食塩液	1mg/kg 50mL	点滴末梢	30分	↓															
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 9.9mg	点滴末梢	15分	↓	↓														
ペメトレキセド点滴静注 生理食塩液	500mg/m ² 100mL	点滴末梢	10分以上	↓	↓														
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=6 250mL	点滴末梢	1時間	↓	↓														

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CBDCA+PTX+IPI+NIVO													更新日	2025/3/24							
														1クール	42日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	22	42																
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓																
オブジーボ点滴静注	360mg	点滴末梢	30分	↓		↓																
生理食塩液	100mL																					
ヤーボイ点滴静注	1mg/kg	点滴末梢	30分	↓																		
生理食塩液	50mL																					
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分	↓		↓																
デキサート注射液	16.5mg																					
ガスター注射液	20mg																					
パクリタキセル注	200mg/m ²	点滴末梢	3時間	↓		↓																
生理食塩液	500mL																					
カルボプラチン注射液	AUC=6	点滴末梢	1時間	↓		↓																
ブドウ糖液5%	250mL																					
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓		↓																

備考：

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CBDCA+PTX+BEV+Atezo										更新日									
											1クール		21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
テセントリク点滴静注	1200mg	点滴末梢	30~60分	↓																
生理食塩液	250mL																			
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																
デキサート注射液	16.5mg	点滴末梢	30分	↓																
ガスター注射液	20mg																			
パクリタキセル注	175mg/m ²	点滴末梢	3時間	↓																
生理食塩液	500mL																			
カルボプラチン注射液	AUC=6	点滴末梢	1時間	↓																
ブドウ糖液5%	250mL																			
ベバシズマブBS点滴静注	15mg/kg	点滴末梢	30~90分	↓																
生理食塩液	100mL																			
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																

備考:

レジメン名	NSCLC BEV+Atezo										更新日									
											1クール		21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
テセントリク点滴静注	1200mg	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	250mL																			
ベバシズマブBS点滴静注	15mg/kg	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			

備考:

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名		NSCLC CBDCA+nabPTX+Atezo												更新日		2025/3/24			
														1クール		21日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	8	・	15	・	21									
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓															
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン			↓		↓											
テセントリク点滴静注	1200mg	点滴末梢	30~60分	↓															
生理食塩液	250mL	点滴末梢																	
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	15分	↓															
デキサート注射液	9.9mg	点滴末梢																	
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分			↓		↓											
生理食塩液	50mL	点滴末梢																	
アブラキサン点滴静注用	100mg/m ²	点滴末梢	30分	↓		↓		↓											
生理食塩液	100mL	点滴末梢																	
カルボプラチン注射液	AUC=6	点滴末梢	1時間	↓															
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢																	

備考：

レジメン名		NSCLC Atezo												更新日		2020/3/13			
														1クール		21日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
テセントリク点滴静注	1200mg	点滴末梢	30~60分	↓															
生理食塩液	250mL	点滴末梢																	

備考：

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC IPI+NIVO(240mg/body:2週毎)										更新日									
											1クール		42日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	15	.	29	.	42										
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン			↓		↓												
オプジーボ点滴静注	240mg	点滴末梢	30分	↓		↓		↓												
生理食塩液	100mL																			
ヤーボイ点滴静注液	1mg/kg	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	50mL																			

備考：

レジメン名	NSCLC IPI+NIVO(360mg/body:3週毎)										更新日									
											1クール		42日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	22	.	42												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン			↓														
オプジーボ点滴静注	360mg	点滴末梢	30分	↓		↓														
生理食塩液	100mL																			
ヤーボイ点滴静注液	1mg/kg	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	50mL																			

備考：

レジメン名	NSCLC Durvalumab維持 (RT後)										更新日									
											1クール		28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	28														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
イミフィンジ点滴静注	1500mg	点滴末梢	1時間	↓																
生理食塩液	100mL																			

備考：投与期間は12ヶ月まで。

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CBDCA+Pemetrexed+BEV													更新日						
														2025/3/28						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 9.9mg	点滴末梢	15分	↓																
ペメトレキセド点滴静注 生理食塩液	500mg/m ² 100mL	点滴末梢	10分以上	↓																
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=6 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
ベバシズマブBS点滴静注 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴末梢	30~90分	↓																

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

レジメン名	NSCLC Pemetrexed+BEV													更新日						
														2020/3/18						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
生理食塩液 デキサート注射液	50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓																
ペメトレキセド点滴静注 生理食塩液	500mg/m ² 100mL	点滴末梢	10分以上	↓																
ベバシズマブBS点滴静注 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴末梢	30分	↓																

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CDDP+DTX				更新日	2025/3/28														
					1クール	21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	3	4	・	21											
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	メイン		↓	↓														
ソルデム3A輸液	200mL	点滴末梢	メイン				↓													
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	↓																
硫酸Mg補正液	8mEq	点滴末梢	1時間	↓																
パロノセトロン点滴静注	0.75mg	点滴末梢	15分	↓																
デキサート注射液	9.9mg	点滴末梢	15分		↓	↓	↓													
生理食塩液	50mL	点滴末梢	15分		↓	↓	↓													
ドセタキセル点滴静注	60mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓																
生理食塩液	250mL	点滴末梢	1時間	↓																
20%マンニトール注射液	200mL	点滴末梢	30分	↓																
シスプラチン点滴静注液	80mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																
生理食塩液	500mL	点滴末梢	2時間	↓																
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	×2	↓															

備考：（制吐剤）アプレピタント、オランザピン併用

レジメン名	NSCLC T-DXd（アロカリス使用）				更新日	2025/7/18														
					1クール	21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
ブドウ糖液5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																
アロカリス点滴静注	235mg	点滴末梢	30分	↓																
デキサート注射液	9.9mg	点滴末梢	30分	↓																
エンハーツ点滴静注	5.4mg/kg	点滴末梢	初回：90分	↓																
注射用水（溶解用）		点滴末梢	2回目以降																	
ブドウ糖液5%	100mL	点滴末梢	：30分																	

備考：

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CBDCA+S-1				更新日	2025/3/28													
					1クール	21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	14	.	21											
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 9.9mg	点滴末梢	15分	↓															
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓															
S-1	80mg/m ²	内服	1日2回	day1~14服用															

備考：

レジメン名	NSCLC CDDP+S-1				更新日	2025/3/28													
					1クール	35日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	8	9	10	11	.	21	.	35						
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン			↓													
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	メイン				↓	↓											
ソルデム3A輸液	200mL	点滴末梢	メイン						↓										
ソルデム3A輸液 硫酸Mg補正液	500mL 8mEq	点滴末梢	1時間			↓													
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 9.9mg	点滴末梢	15分			↓													
デキサート注射液 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴末梢	15分				↓	↓	↓										
20%マンニトール注射液	200mL	点滴末梢	30分			↓													
シスプラチン点滴静注 生理食塩液	80mg/m ² 500mL	点滴末梢	2時間			↓													
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間			×2	↓												
S-1	80mg/m ²	内服	1日2回	day1~21服用															

備考：（制吐剤）アプレピタント、オランザピン併用

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC BEV+Erl				更新日														
					1クール	21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
ペバシズマブB S点滴静注	15mg/kg	点滴末梢	30~90分	↓															
生理食塩液	100mL																		
タルセバ錠	150mg	内服	1日1回		連日内服														

備考：

レジメン名	NSCLC RAM+Erl				更新日														
					1クール	14日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	14													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓															
サイラムザ点滴静注液	10mg/kg	点滴末梢	30~60分	↓															
タルセバ錠	150mg	内服	1日1回		連日内服														

備考：前投薬として抗ヒスタミン剤を使用（経口薬も可）

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC DTX													更新日						
														1クール	2020/3/18 21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
ソルデム3A輸液	200mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓																
ドセタキセル点滴静注 生理食塩液	60mg/m ² 500mL	点滴末梢	2時間	↓																

備考：

レジメン名	NSCLC nab PTX													更新日						
														1クール	2021/11/24 21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	8	.	15	.	21										
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓												
デキサート注射液 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓												
アブラキサン点滴静注用 生理食塩液	100mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓		↓												

備考：

レジメン名	NSCLC GEM													更新日						
														1クール	2020/3/18 21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	8	.	21												
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
デキサート注射液 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓														
ゲムシタビン点滴静注 ブドウ糖液5%	1000mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓														

備考：

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC VNR													更新日						
														2020/3/18						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	21												
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
ロゼウス静注液	25mg/m ²	点滴末梢	全開	↓		↓														
生理食塩液	50mL																			

備考：

レジメン名	NSCLC AMR(non-small)													更新日						
														2020/3/18						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	3	・	21												
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓														
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓	↓	↓														
カルセド注射用 生理食塩液	40MG/m ² 50mL	点滴末梢	全開	↓	↓	↓														

備考：