

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC (術前) CBDCA+PTX+NIVO													更新日						
														2025/3/24						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
オブジーボ点滴静注	360mg	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																
デキサート注射液	16.5mg	点滴末梢	30分	↓																
ガスター注射液	20mg																			
パクリタキセル注	200mg/m ²	点滴末梢	3時間	↓																
生理食塩液	500mL																			
カルボプラチン注射液	AUC=6	点滴末梢	1時間	↓																
ブドウ糖液5%	250mL																			
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																

備考：術前最大3コース

レジメン名	NSCLC (術前) CBDCA+PEM+NIVO													更新日						
														2025/3/24						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
オブジーボ点滴静注	360mg	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																
デキサート注射液	9.9mg	点滴末梢	15分	↓																
ペメトレキセド点滴静注液	500mg/m ²	点滴末梢	10分以上	↓																
生理食塩液	100mL																			
カルボプラチン注射液	AUC=5	点滴末梢	1時間	↓																
ブドウ糖液5%	250mL																			

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。術前最大3コース

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC（術後）Pembro(3週毎)				更新日															
					1クール		21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
キイトルーダ点滴静注	200mg/body	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			

備考：術前補助療法を実施後、術後補助療法として投与。最大13コース。

レジメン名	NSCLC（術後）Pembro(6週毎)				更新日															
					1クール		42日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	42														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
キイトルーダ点滴静注	400mg/body	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			

備考：術前補助療法を実施後、術後補助療法として投与。最大7コース。

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC (術前)CBDCA+PTX+Durva													更新日					
														1クール	21日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	21													
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓															
イミフィンジ点滴静注 生理食塩液	1500mg/body 100ml	点滴末梢	1時間	↓															
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液 ガスター注射液	0.75mg/50mL 16.5mg 20mg	点滴末梢	30分	↓															
パクリタキセル注 生理食塩液	200mg/m ² 500mL	点滴末梢	3時間	↓															
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=6 250mL	点滴末梢	1時間	↓															
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓															

備考：最大4コース。

レジメン名	NSCLC (術前)CBDCA+PEM+Durva													更新日					
														1クール	21日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	21													
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓															
イミフィンジ点滴静注 生理食塩液	1500mg/body 100ml	点滴末梢	1時間	↓															
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 9.9mg	点滴末梢	15分	↓															
ペメトレキセド点滴静注 生理食塩液	500mg/m ² 100mL	点滴末梢	10分以上	↓															
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓															
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓															

備考：最大4コース。ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC (術後)Durvalumab													更新日	2026/3/30				
														1クール	28日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	28													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
イミフィンジ点滴静注	1500mg/body	点滴末梢	1時間	↓															
生理食塩液	100mL																		

備考：術前補助療法(Durva+化学療法)を実施し、その後の術後補助療法として投与。最大12サイクル

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC PEM+Durva+Treme維持（初回）													更新日					
														1クール		2024/7/25			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	29	・	56											
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン			↓													
イジユド点滴静注	75mg	点滴末梢	1時間			↓													
生理食塩液	100mL																		
イミフィンジ点滴静注	1500mg	点滴末梢	1時間	↓		↓													
生理食塩液	100mL																		
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分	↓		↓													
生理食塩液	50mL																		
ペメトレキセド点滴静注液	500mg/m ²	点滴末梢	10分以上	↓		↓													
生理食塩液	100mL																		

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。本レジメンは1回のみ。次はPEM+Durva維持（2回目以降）へ。イジユドは前レジメンを含み合計5回投与で終了。

レジメン名	NSCLC PEM+Durva維持（2回目以降）													更新日					
														1クール		2024/7/25			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	28													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
イミフィンジ点滴静注	1500mg	点滴末梢	1時間	↓															
生理食塩液	100mL																		
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分	↓															
生理食塩液	50mL																		
ペメトレキセド点滴静注液	500mg/m ²	点滴末梢	10分以上	↓															
生理食塩液	100mL																		

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。本レジメンはPEM+Durva+Treme維持（初回）投与後から使用する。

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CBDCA+nab PTX+Durva+Treme													更新日	2025/3/24					
														1クール	21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	8	15	21													
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン		↓		↓													
イジユド点滴静注	75mg	点滴末梢	1時間	↓																
生理食塩液	100mL	点滴末梢																		
イミフィンジ点滴静注	1500mg	点滴末梢	1時間	↓																
生理食塩液	100mL	点滴末梢																		
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																
デキサート注射液	9.9mg	点滴末梢																		
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分		↓		↓													
生理食塩液	50mL	点滴末梢																		
アブラキサン点滴静注用	100mg/m ²	点滴末梢	30分	↓	↓		↓													
生理食塩液	100mL	点滴末梢																		
カルボプラチン注射液	AUC=6	点滴末梢	1時間	↓																
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢																		

備考：4コースまで施行。次はDurva+Treme維持（初回）へ

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC Durva+Treme維持（初回）													更新日					
														1クール		2024/6/25			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	29	.	56											
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓													
イジユド点滴静注 生理食塩液	75mg 100mL	点滴末梢	1時間			↓													
イミフィンジ点滴静注 生理食塩液	1500mg 100mL	点滴末梢	1時間	↓		↓													

備考：本レジメンは1回のみ。次はDurva維持（2回目以降）へ。イジユドは前レジメンを含み合計5回投与で終了。

レジメン名	NSCLC Durva維持（2回目以降）													更新日					
														1クール		2024/6/25			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	28													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
イミフィンジ点滴静注 生理食塩液	1500mg 100mL	点滴末梢	1時間	↓															

備考：本レジメンはDurva+Treme維持（初回）投与後から使用する。

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CBDCA+Pemetrexed+Pembro													更新日	2025/3/28								
														1クール	21日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																			
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓																			
生理食塩液	100mL	点滴末梢																					
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																			
デキサート注射液	9.9mg	点滴末梢																					
ペメトレキセド点滴静注液	500mg/m ²	点滴末梢	10分以上	↓																			
生理食塩液	100mL	点滴末梢																					
カルボプラチン注射液	AUC=5	点滴末梢	1時間	↓																			
ブドウ糖液5%	250mL																						

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CDDP+Pemetrexed+Pembro				更新日		2025/3/28															
					1クール		21日間															
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	3	4	・	21													
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																		
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓																		
生理食塩液	100mL	点滴末梢																				
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	メイン		↓	↓																
ソルデム3A輸液	200mL	点滴末梢	メイン				↓															
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	↓																		
硫酸Mg補正液	8mEq	点滴末梢																				
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																		
デキサート注射液	9.9mg	点滴末梢																				
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分		↓	↓	↓															
生理食塩液	50mL	点滴末梢																				
ペメトレキセド点滴静注	500MG/m ²	点滴末梢	10分以上	↓																		
生理食塩液	100mL	点滴末梢																				
20%マンニトール注射液	200mL	点滴末梢	30分	↓																		
シスプラチン点滴静注	75mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																		
生理食塩液	500mL	点滴末梢																				
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	×2	↓																	

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。
（制吐剤）アプレピタント、オランザピン併用

レジメン名	NSCLC Pemetrexed+Pembro				更新日		2020/3/18															
					1クール		21日間															
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	・	21																
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																		
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓																		
生理食塩液	100mL	点滴末梢																				
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分	↓																		
生理食塩液	50mL	点滴末梢																				
ペメトレキセド点滴静注	500mg/m ²	点滴末梢	10分以上	↓																		
生理食塩液	100mL	点滴末梢																				

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CBDCA+nab PTX+Pembro													更新日					
														2025/3/24					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	8	15	21												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓															
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン		↓		↓												
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL	点滴末梢	30分	↓															
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	15分	↓															
デキサート注射液	9.9mg	点滴末梢	15分			↓		↓											
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分			↓		↓											
生理食塩液	50mL	点滴末梢	15分			↓		↓											
アブラキサン点滴静注用	100mg/m ²	点滴末梢	30分	↓		↓		↓											
生理食塩液	100mL	点滴末梢	30分	↓		↓		↓											
カルボプラチン注射液	AUC=6	点滴末梢	1時間	↓															
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	1時間	↓															

備考：

レジメン名	NSCLC CBDCA+PTX+Pembro													更新日					
														2025/3/28					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓		21													
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL	点滴末梢	30分	↓															
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分	↓															
デキサート注射液	16.5mg	点滴末梢	30分	↓															
ガスター注射液	20mg	点滴末梢	30分	↓															
パクリタキセル注	200mg/m ²	点滴末梢	3時間	↓															
生理食塩液	500mL	点滴末梢	3時間	↓															
カルボプラチン注射液	AUC=6	点滴末梢	1時間	↓															
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	1時間	↓															
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓															

備考：

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC Pembro(3週毎)				更新日	2021/3/20													
					1クール	21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
キイトルーダ点滴静注	200mg/body	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		

備考：

レジメン名	NSCLC Pembro(6週毎)				更新日	2021/3/23													
					1クール	42日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	42													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
キイトルーダ点滴静注	400mg/body	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		

備考：

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CBDCA+PEM+IPI+NIVO													更新日	2025/3/24				
														1クール	42日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	22	42													
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓														
オプジーボ点滴静注 生理食塩液	360mg 100mL	点滴末梢	30分	↓	↓														
ヤーボイ点滴静注 生理食塩液	1mg/kg 50mL	点滴末梢	30分	↓															
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 9.9mg	点滴末梢	15分	↓	↓														
ペメトレキシド点滴静注 生理食塩液	500mg/m ² 100mL	点滴末梢	10分以上	↓	↓														
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=6 250mL	点滴末梢	1時間	↓	↓														

備考：ペメトレキシド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CBDCA+PTX+IPI+NIVO													更新日	2025/3/24				
														1クール	42日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	22	42													
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓														
オプジーボ点滴静注	360mg	点滴末梢	30分	↓	↓														
生理食塩液	100mL																		
ヤーボイ点滴静注	1mg/kg	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	50mL																		
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分	↓	↓														
デキサート注射液	16.5mg																		
ガスター注射液	20mg																		
パクリタキセル注	200mg/m ²	点滴末梢	3時間	↓	↓														
生理食塩液	500mL																		
カルボプラチン注射液	AUC=6	点滴末梢	1時間	↓	↓														
ブドウ糖液5%	250mL																		
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓	↓														

備考：

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CBDCA+PTX+BEV+Atezo				更新日		投与日																				
					1クール		21日間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
薬品名	投与量	投与方法	投与時間																								
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																							
テセントリク点滴静注	1200mg	点滴末梢	30~60分	↓																							
生理食塩液	250mL																										
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																							
デキサート注射液	16.5mg	点滴末梢	30分	↓																							
ガスター注射液	20mg																										
パクリタキセル注	175mg/m ²	点滴末梢	3時間	↓																							
生理食塩液	500mL																										
カルボプラチン注射液	AUC=6	点滴末梢	1時間	↓																							
ブドウ糖液5%	250mL																										
ベバシズマブBS点滴静注	15mg/kg	点滴末梢	30~90分	↓																							
生理食塩液	100mL																										
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																							

備考：

レジメン名	NSCLC BEV+Atezo				更新日		投与日																				
					1クール		21日間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
薬品名	投与量	投与方法	投与時間																								
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																							
テセントリク点滴静注	1200mg	点滴末梢	30分	↓																							
生理食塩液	250mL																										
ベバシズマブBS点滴静注	15mg/kg	点滴末梢	30分	↓																							
生理食塩液	100mL																										

備考：

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CBDCA+nabPTX+Atezo													更新日	2025/3/24					
														1クール	21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	8	15	21													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン			↓		↓												
テセントリク点滴静注	1200mg	点滴末梢	30~60分	↓																
生理食塩液	250mL																			
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																
デキサート注射液	9.9mg																			
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分			↓		↓												
生理食塩液	50mL																			
アブラキサン点滴静注用	100mg/m ²	点滴末梢	30分	↓		↓		↓												
生理食塩液	100mL																			
カルボプラチン注射液	AUC=6	点滴末梢	1時間	↓																
ブドウ糖液5%	250mL																			

備考：

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC Atezo維持（3週毎）				更新日	2026/4/23												
					1クール	21日間												
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日														
				1	.	21												
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓														
テセントリク点滴静注	1200mg	点滴末梢	30～60分	↓														
生理食塩液	250mL																	

備考：

レジメン名	NSCLC Atezo維持（4週毎）				更新日	2026/4/23												
					1クール	28日間												
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日														
				1	.	28												
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓														
テセントリク点滴静注	1680mg	点滴末梢	30～60分	↓														
生理食塩液	250mL																	

備考：

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC Atezo単剤（3週毎）				更新日															
					1クール		21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
テセントリク点滴静注	1200mg	点滴末梢	30～60分	↓																
生理食塩液	250mL																			

備考：

レジメン名	NSCLC Atezo単剤（4週毎）				更新日															
					1クール		28日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	28														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
テセントリク点滴静注	1680mg	点滴末梢	30～60分	↓																
生理食塩液	250mL																			

備考：

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC (術後) Atezo (3週毎)				更新日														
					1クール	21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
テセントリク点滴静注 生理食塩液	1200mg 250mL	点滴末梢	30~60分	↓															

備考：最大12ヶ月まで

レジメン名	NSCLC (術後) Atezo (4週毎)				更新日														
					1クール	28日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	28													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
テセントリク点滴静注 生理食塩液	1680mg 250mL	点滴末梢	30~60分	↓															

備考：最大12ヶ月まで

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC NIVO(240mg/body:2週毎)				更新日															
					1クール	2020/3/18	14日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	14														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
オプジーボ点滴静注	240mg	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			

備考：

レジメン名	NSCLC NIVO(480mg/body:4週毎)				更新日															
					1クール	2021/3/23	28日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	28														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
オプジーボ点滴静注	480mg	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			

備考：

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC IPI+NIVO(240mg/body:2週毎)													更新日					
														2021/11/24					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	15	・	29	・	42									
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓															
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン			↓		↓											
オプジーボ点滴静注	240mg	点滴末梢	30分	↓		↓		↓											
生理食塩液	100mL																		
ヤーボイ点滴静注液	1mg/kg	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	50mL																		

備考：

レジメン名	NSCLC IPI+NIVO(360mg/body:3週毎)													更新日					
														2021/11/24					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	22	・	42											
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓															
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン			↓													
オプジーボ点滴静注	360mg	点滴末梢	30分	↓		↓													
生理食塩液	100mL																		
ヤーボイ点滴静注液	1mg/kg	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	50mL																		

備考：

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC Durvalumab維持 (RT後)													更新日	2024/7/25			
														1クール	28日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日														
				1	.	28												
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓														
イミフィンジ点滴静注	1500mg	点滴末梢	1時間	↓														
生理食塩液	100mL																	

備考：投与期間は12ヶ月まで。

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CBDCA+Pemetrexed+BEV													更新日						
														2025/3/28						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 9.9mg	点滴末梢	15分	↓																
ペメトレキセド点滴静注液 生理食塩液	500mg/m ² 100mL	点滴末梢	10分以上	↓																
カルボプラチン注射液	AUC=6	点滴末梢	1時間	↓																
ベバシズマブBS点滴静注 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴末梢	30~90分	↓																

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

レジメン名	NSCLC Pemetrexed+BEV													更新日						
														2020/3/18						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
生理食塩液 デキサート注射液	50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓																
ペメトレキセド点滴静注液 生理食塩液	500mg/m ² 100mL	点滴末梢	10分以上	↓																
ベバシズマブBS点滴静注 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴末梢	30分	↓																

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CBDCA+Pemetrexed													更新日	2025/3/28							
														1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	.	21																
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																		
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 9.9mg	点滴末梢	30分	↓																		
ペメトレキセド点滴静注液 生理食塩液	500mg/m ² 100mL	点滴末梢	10分以上	↓																		
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																		

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

レジメン名	NSCLC CDDP+Pemetrexed													更新日	2025/3/28							
														1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	3	4	.	21													
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																		
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	メイン		↓	↓																
ソルデム3A輸液	200mL	点滴末梢	メイン				↓															
ソルデム3A輸液 硫酸Mg補正液	500mL 8mEq	点滴末梢	1時間	↓																		
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 9.9mg	点滴末梢	15分	↓																		
デキサート注射液 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴末梢	15分		↓	↓	↓															
ペメトレキセド点滴静注液 生理食塩液	500MG/m ² 100mL	点滴末梢	10分以上	↓																		
20%マンニトール注射液	200mL	点滴末梢	30分	↓																		
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	75mg/m ² 500mL	点滴末梢	2時間	↓																		
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	×2	↓																	

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC Pemetrexed				更新日	2020/3/18													
					1クール	21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	21														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分	↓															
生理食塩液	50mL																		
ペメトレキセド点滴静注液	500mg/m ²	点滴末梢	10分以上	↓															
生理食塩液	100mL																		

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CBDCA+nab PTX													更新日	2025/3/24				
														1クール	21日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	8	・	15	・	21									
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓											
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 9.9mg	点滴末梢	15分	↓															
デキサート注射液 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴末梢	15分			↓		↓											
アブラキサン点滴静注用 生理食塩液	100mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓		↓											
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=6 250mL	点滴末梢	1時間	↓															

備考：

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CBDCA+PEM+Osimertinib			更新日	2025/3/28														
				1クール	21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	21													
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	メイン	↓															
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 9.9mg	点滴末梢	15分	↓															
ペメトレキセド点滴静注液 生理食塩液	500mg/m ² 100mL	点滴末梢	10分以上	↓															
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓															
タグリッソ錠	80mg	内服	1日1回		連日内服														

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。最大4コース、以降維持療法へ。

レジメン名	NSCLC PEM+Osimertinib			更新日	2025/3/28														
				1クール	21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
デキサート注射液 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴末梢	15分	↓															
ペメトレキセド点滴静注液 生理食塩液	500mg/m ² 100mL	点滴末梢	10分以上	↓															
タグリッソ錠	80mg	内服	1日1回		連日内服														

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CBDCA+PEM+Amivantamab 1サイクル目 (≥80kg)				更新日		2026/3/16													
					1クール		21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	8	15	21												
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓		↓											
パロノセトロン点滴静注 ガスター注射液 デキサート注射液	0.75mg/50mL 20mg/2mL 19.8mg	点滴末梢	15分	↓																
デキサート注射液 生理食塩液	9.9mg 50mL	点滴末梢	15分		↓		↓		↓											
ペメトレキセド点滴静注 生理食塩液	500mg/m ² 100mL	点滴末梢	10分以上	↓																
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
ライブリバント点滴静注	350mg	点滴末梢	投与開始～ 120分	↓																
ライブリバント点滴静注	1400mg	点滴末梢	投与開始～ 120分		↓															
ライブリバント点滴静注 生理食塩液	1750mg 250mL	点滴末梢	65ml/hr				↓													
ライブリバント点滴静注 生理食塩液	1750mg 250mL	点滴末梢	85ml/hr						↓											
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓	↓		↓		↓											
カロナール錠	1000mg	内服	投与前	↓	↓		↓		↓											

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CBDCA+PEM+Amivantamab 2サイクル目 (80kg未満)				更新日		2026/3/16														
					1クール		21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	21															
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																	
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																	
ペメトレキセド点滴静注液	500mg/m ²	点滴末梢	10分以上	↓																	
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																	
ライブリバント点滴静注 生理食塩液	1400mg 250mL	点滴末梢	125ml/hr	↓																	
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																	
カロナール錠	1000mg	内服	投与前	↓																	

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

レジメン名	NSCLC CBDCA+PEM+Amivantamab 2サイクル目 (≥80kg)				更新日		2026/3/16														
					1クール		21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	21															
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																	
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																	
ペメトレキセド点滴静注液	500mg/m ²	点滴末梢	10分以上	↓																	
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																	
ライブリバント点滴静注 生理食塩液	1750mg 250mL	点滴末梢	125ml/hr	↓																	
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																	
カロナール錠	1000mg	内服	投与前	↓																	

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CBDCA+PEM+Amivantamab 3-4サイクル目 (80kg未満)				更新日		2026/3/16															
					1クール		21日間															
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	.	21																
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																		
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																		
ペメトレキセド点滴静注液	500mg/m ²	点滴末梢	10分以上	↓																		
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																		
ライブリバント点滴静注 生理食塩液	1750mg 250mL	点滴末梢	125ml/hr	↓																		
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																		
カロナール錠	1000mg	内服	投与前	↓																		

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

レジメン名	NSCLC CBDCA+PEM+Amivantamab 3-4サイクル目 (≥80kg)				更新日		2026/3/16															
					1クール		21日間															
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	.	21																
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																		
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																		
ペメトレキセド点滴静注液	500mg/m ²	点滴末梢	10分以上	↓																		
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																		
ライブリバント点滴静注 生理食塩液	2100mg 250mL	点滴末梢	125ml/hr	↓																		
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																		
カロナール錠	1000mg	内服	投与前	↓																		

備考：ペメトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC PEM+Amivantamab (80kg未満)				更新日		2026/3/16													
					1クール		21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	21															
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
デキサート注射液	9.9mg	点滴末梢	15分	↓																
ペムトレキセド点滴静注液	500mg/m ²	点滴末梢	10分以上	↓																
生理食塩液	100mL	点滴末梢																		
ライブリバント点滴静注	1750mg	点滴末梢	125ml/hr	↓																
生理食塩液	250mL	点滴末梢																		
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																
カロナル錠	1000mg	内服	投与前	↓																

備考：ペムトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。CBDCA+PEM+Amivantamab 4 サイクル施行後。

レジメン名	NSCLC PEM+Amivantamab (≥80kg)				更新日		2026/3/16													
					1クール		21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	21															
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
デキサート注射液	9.9mg	点滴末梢	15分	↓																
ペムトレキセド点滴静注液	500mg/m ²	点滴末梢	10分以上	↓																
ライブリバント点滴静注	2100mg	点滴末梢	125ml/hr	↓																
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																
カロナル錠	1000mg	内服	投与前	↓																

備考：ペムトレキセド投与7日前以前より葉酸0.5mgの内服開始（パンビタン）。ビタミンB12 1mgの注射を7日前以前より開始、9週毎に投与継続。CBDCA+PEM+Amivantamab 4 サイクル施行後。

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC Amivantamab+Lazertinib 1サイクル目 (80kg未満)				更新日		2026/4/24														
					1クール		28日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	2	8	15	22	28												
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓		↓		↓										
デキサート注射液	19.8mg	点滴末梢	15分	↓																	
ガスター注射液	20mg																				
生理食塩液	50mL																				
デキサート注射液	9.9mg	点滴末梢	15分		↓		↓		↓		↓										
生理食塩液	50mL																				
ライブリバント点滴静注	350mg	点滴末梢	投与開始～120分：50mL/hr 120分以降：75mL/hr	↓																	
生理食塩液	250mL																				
ライブリバント点滴静注	700mg	点滴末梢	投与開始～120分：50mL/hr 120分以降：75mL/hr		↓																
生理食塩液	250mL																				
ライブリバント点滴静注	1050mg	点滴末梢	85mL/hr				↓														
生理食塩液	250mL																				
ライブリバント点滴静注	1050mg	点滴末梢	125mL/hr						↓		↓										
生理食塩液	250mL																				
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓	↓		↓		↓		↓										
カロナール錠	1000mg	内服	投与前	↓	↓		↓		↓		↓										
ラズクルーズ錠	240mg	内服	1日1回	連日内服																	

備考：静脈血栓塞栓症予防のため、投与開始後4ヶ月間はエリキュース1回2.5mgを1日2回経口投与。
 皮疹予防のため、開始時～12週目 経口ドキシサイクリン又はミノサイクリン100mgを1日2回内服。13週目以降～1%クリンダマイシン外用ローションを毎日頭皮に塗布。保湿剤を毎日塗布。

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC Amivantamab+Lazertinib 2サイクル目以降(80kg未満)				更新日		2026/4/24													
					1クール		28日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	15	・	28												
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
デキサート注射液	9.9mg	点滴末梢	15分	↓		↓														
生理食塩液	50mL																			
ライブリバント点滴静注	1050mg	点滴末梢	125mL/hr	↓		↓														
生理食塩液	250mL																			
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓		↓														
カロナール錠	1000mg	内服	投与前	↓		↓														
ラズクルーズ錠	240mg	内服	1日1回	連日内服																

備考：静脈血栓塞栓症予防のため、投与開始後4ヶ月間はエリキュース1回2.5mgを1日2回経口投与。
 皮疹予防のため、開始時～12週目 経口ドキシサイクリン又はミノサイクリン100mgを1日2回内服。13週目以降～1%クリンダマイシン外用ローションを毎日頭皮に塗布。保湿剤を毎日塗布。

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC Amivantamab+Lazertinib 2サイクル目以降(80kg以上)				更新日		2026/4/24													
					1クール		28日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	15	・	28												
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
デキサート注射液	9.9mg	点滴末梢	15分	↓		↓														
生理食塩液	50mL																			
ライブリバント点滴静注	1400mg	点滴末梢	125mL/hr	↓		↓														
生理食塩液	250mL																			
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓		↓														
カロナール錠	1000mg	内服	投与前	↓		↓														
ラズクルーズ錠	240mg	内服	1日1回	連日内服																

備考：静脈血栓塞栓症予防のため、投与開始後4ヶ月間はエリキュース1回2.5mgを1日2回経口投与。
 皮疹予防のため、開始時～12週目 経口ドキシサイクリン又はミノサイクリン100mgを1日2回内服。13週目以降～1%クリンダマイシン外用ローションを毎日頭皮に塗布。保湿剤を毎日塗布。

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC BEV+Erl				更新日														
					1クール	21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
ペバシズマブB S点滴静注	15mg/kg	点滴末梢	30~90分	↓															
生理食塩液	100mL																		
タルセバ錠	150mg	内服	1日1回		連日内服														

備考：

レジメン名	NSCLC RAM+Erl				更新日														
					1クール	14日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	14													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓															
サイラムザ点滴静注液	10mg/kg	点滴末梢	30~60分	↓															
生理食塩液	250mL																		
タルセバ錠	150mg	内服	1日1回		連日内服														

備考：前投薬として抗ヒスタミン剤を使用（経口薬も可）

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC CDDP+VNR													更新日	2025/3/28					
														1クール	21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	3	4	5	8	21										
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	メイン		↓	↓														
ソルデム3A輸液	200mL	点滴末梢	メイン				↓			↓										
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	↓																
硫酸Mg補正液	8mEq	点滴末梢	1時間	↓																
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																
デキサート注射液	9.9mg	点滴末梢	15分	↓																
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分		↓	↓	↓													
生理食塩液	50mL	点滴末梢	15分		↓	↓	↓													
ロゼウス静注液	25mg/m ²	点滴末梢	全開	↓						↓										
生理食塩液	50mL	点滴末梢	全開	↓						↓										
20%マンニトール注射液	200mL	点滴末梢	30分	↓																
シスプラチン点滴静注液	80mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																
生理食塩液	500mL	点滴末梢	2時間	↓																
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間	×2	×1															

備考：(制吐剤) アプレピタント、オランザピン併用

レジメン名	NSCLC GEM+VNR													更新日	2020/3/18					
														1クール	21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	8	21														
ソルデム3A輸液	200mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分	↓		↓														
生理食塩液	50mL	点滴末梢	15分	↓		↓														
ロゼウス静注液	25mg/m ²	点滴末梢	全開	↓		↓														
生理食塩液	50mL	点滴末梢	全開	↓		↓														
ゲムシタビン点滴静注	1000mg/m ²	点滴末梢	30分	↓		↓														
ブドウ糖液5%	100mL	点滴末梢	30分	↓		↓														

備考：

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC DTX													更新日					
														1クール	2020/3/18 21日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	21													
ソルデム3A輸液	200mL	点滴末梢	メイン	↓															
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓															
ドセタキセル点滴静注 生理食塩液	60mg/m ² 500mL	点滴末梢	2時間	↓															

備考：

レジメン名	NSCLC nab PTX													更新日					
														1クール	2021/11/24 21日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	8	.	15	.	21									
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓											
デキサート注射液 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓											
アブラキサン点滴静注用 生理食塩液	100mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓		↓											

備考：

レジメン名	NSCLC GEM													更新日					
														1クール	2020/3/18 21日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	8	.	21											
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓													
デキサート注射液 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓													
ゲムシタビン点滴静注 ブドウ糖液5%	1000mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓													

備考：

非小細胞肺癌(NSCLC)

レジメン名	NSCLC VNR													更新日						
														2020/3/18						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	21												
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
ロゼウス静注液	25mg/m ²	点滴末梢	全開	↓		↓														
生理食塩液	50mL																			

備考：

レジメン名	NSCLC AMR(non-small)													更新日						
														2020/3/18						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	3	・	21												
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓														
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓	↓	↓														
カルセド注射用 生理食塩液	40MG/m ² 50mL	点滴末梢	全開	↓	↓	↓														

備考：