



# 婦人科

レジメン名		BEV(3週毎)												更新日	2020/3/18							
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
					1	.	21															
生理食塩液		100mL	点滴末梢	メイン	↓																	
アバステン点滴静注		15mg/kg	点滴末梢	30~90分	↓																	
生理食塩液		100mL																				

備考：

レジメン名		Pembro+BEV(3週毎)												更新日	2023/2/21							
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
					1	.	21															
生理食塩液		100mL	点滴末梢	メイン	↓																	
キイトルーダ点滴静注		200mg	点滴末梢	30分	↓																	
生理食塩液		100mL																				
アバステン点滴静注		15mg/kg	点滴末梢	30~90分	↓																	
生理食塩液		100mL																				

備考：

レジメン名		Pembro(3週毎)												更新日	2023/2/21							
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
					1	.	21															
生理食塩液		100mL	点滴末梢	メイン	↓																	
キイトルーダ点滴静注		200mg	点滴末梢	30分	↓																	
生理食塩液		100mL																				

備考：

# 婦人科

レジメン名	PAOLA(BEV+Olaparib)			更新日	2023/2/21														
				1クール	21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
アバスタチン点滴静注用 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴末梢	30~90分	↓															

備考：リムパーザ 300mg/回 (600mg/日) 1日2回

レジメン名	TC tri-weekly			更新日	2020/3/18														
				1クール	21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	21													
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓															
グラニセトロン点滴静注 ガスター注射液 デキサート注射液	3mg/100mL 20mg 19.8mg	点滴末梢	30分	↓															
パクリタキセル注 ブドウ糖液5%	180mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	3時間	↓															
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓															
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓															

備考：



# 婦人科

レジメン名	TC tri-weekly+Pembro													更新日	2023/2/21							
														1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	.	21																
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																		
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓																		
生理食塩液	100mL																					
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																		
ガスター注射液	20mg	点滴末梢	30分	↓																		
デキサート注射液	19.8mg																					
パクリタキセル注	175mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	3時間	↓																		
生理食塩液	500mL																					
カルボプラチン注射液	AUC=5	点滴末梢	1時間	↓																		
生理食塩液	250mL																					
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																		

備考：

レジメン名	Triweekly TN													更新日	2020/3/18							
														1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	.	21																
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓																		
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																		
ガスター注射液	20mg	点滴末梢	30分	↓																		
デキサート注射液	19.8mg																					
パクリタキセル注	180mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	3時間	↓																		
ブドウ糖液5%	500mL																					
アクブラ静注用	80mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	1時間	↓																		
生理食塩液	250mL																					
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																		

備考：



# 婦人科

レジメン名	DC (75mg/m <sup>2</sup> )													更新日						
														2022/9/27						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																
ドセタキセル点滴静注 生理食塩液	75mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
カルボプラチン注射液 生理食塩液	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
ラクテック★D注	500mL	点滴末梢	2時間	↓																

備考：

レジメン名	DC+BEV													更新日						
														2020/3/18						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																
ドセタキセル点滴静注 生理食塩液	60mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
カルボプラチン注射液 生理食塩液	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
アバスチン点滴静注用 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴末梢	30~90分	↓																

備考：





# 婦人科

レジメン名		weekly PTX+BEV												更新日							
														1クール	21日間						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	8	・	15	・	21											
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓													
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	30分	↓		↓		↓													
ガスター注射液	20mg																				
デキサート注射液	6.6mg																				
パクリタキセル注	80mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓													
ブドウ糖液5%	250mL																				
アバチン点滴静注用	15mg/kg	点滴末梢	30~90分	↓																	
生理食塩液	100mL																				
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓													

備考：

レジメン名		PLD+BEV												更新日						
														1クール	28日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	22	・	28												
ブドウ糖液5%	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																
デキサート注射液	6.6mg																			
ドキシル注	40mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	1時間30分	↓																
ブドウ糖液5%	250mL																			
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
アバチン点滴静注用	15mg/kg					↓		↓												
生理食塩液	100mL																			

備考：ドキシルは4週間毎、アバチンは3~4週間毎の投与となるようスケジュール調整する。

# 婦人科

レジメン名	PLD+BEV 入院用 (BEV4週毎)													更新日						
														2020/10/2						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	・	29													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
アバチン点滴静注用 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴末梢	30~90分	↓																
ブドウ糖液5%	500mL	点滴末梢	メイン		↓															
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分		↓															
ドキシル注 ブドウ糖液5%	40mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間30分		↓															

備考：本レジメンを連続適用する場合、適宜インターバル1日短縮する。

レジメン名	PLD+BEV 外来用 (BEV4週毎)													更新日						
														2020/10/2						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	28														
ブドウ糖液5%	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																
ドキシル注 ブドウ糖液5%	40mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間30分	↓																
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
アバチン点滴静注用 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴末梢	30~90分	↓																

備考：ドキシル初回は入院用レジメンを使用する。

# 婦人科

レジメン名	PLD													更新日						
														2020/3/18						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	28														
ブドウ糖液 5%	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																
ドキシル注 ブドウ糖液 5%	50mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間30分	↓																

備考：

レジメン名	PLD-C													更新日						
														2020/3/18						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	28														
ブドウ糖液 5%	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																
ドキシル注 ブドウ糖液 5%	30mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液 5%	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																

備考：

# 婦人科

レジメン名	PLD-C+BEV (10)													更新日	2024/2/6				
														1クール	28日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	15													
ブドウ糖液 5%	250mL	点滴末梢	メイン	↓															
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 13.2mg	点滴末梢	15分	↓															
ドキシル注 ブドウ糖液 5%	30mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間30分	↓															
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液 5%	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓															
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓													
アバスチン点滴静注用 生理食塩液	10mg/kg 100mL	点滴末梢	30~90分	↓		↓													

備考：PLD-Cは最大6サイクル目安

# 婦人科

レジメン名	子宮肉腫GD													更新日								
														2020/3/18								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	・	8	・	21														
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓																
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																		
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	3mg/100mL 19.8mg	点滴末梢	30分			↓																
ゲムシタビン点滴静注用 ブドウ糖液5%	900mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓																
ドセタキセル点滴静注 ブドウ糖液5%	100mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間			↓																

備考：2クール目以降ゲムシタビンの溶解液がブドウ糖液5% 250mL、投与時間が1時間30分の場合もあり

レジメン名	GC													更新日								
														2020/3/18								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	・	8	・	21														
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓		↓																
ゲムシタビン点滴静注用 ブドウ糖液5%	1000mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓																
カルボプラチン注射液 生理食塩液	AUC=4 500mL	点滴末梢	1時間30分	↓																		

備考：

# 婦人科

レジメン名	Gem単独													更新日					
														2020/3/18					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	8	・	15	・	28									
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓											
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓		↓		↓											
ゲムシタビン点滴静注用 ブドウ糖液5%	1000mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓		↓											

備考：

レジメン名	weekly CDDP40mg/m <sup>2</sup> (CCRT)													更新日					
														2020/3/18					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	3	・	7											
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓															
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	3mg/100mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓															
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	40mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間	↓															
ラクテック注	500mL	点滴末梢	2時間	×2	×2	↓													
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓													

備考：day2・3はデキサメタゾン内服



# 婦人科

レジメン名	AP													更新日	2022/9/27					
														1クール	21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	3	.	21												
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 19.8mg	点滴末梢	30分	↓																
ドキシソルピシン塩酸塩注射用 生理食塩液	60mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴末梢	30分	↓																
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	50mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	2時間	↓																
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	2時間	×3	×2	×2														
ソルデム3A輸液 ラシックス注	500mL 10mg	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓														

備考：

レジメン名	TP Tri-weekly+BEV													更新日	2022/9/27					
														1クール	21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	3	.	21												
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
パロノセトロン点滴静注 ガスター注射液 デキサート注射液	0.75mg/50mL 20mg 19.8mg	点滴末梢	15分	↓																
パクリタキセル注 生理食塩液	135mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	3時間	↓																
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	50mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	2時間	↓																
アバスチン点滴静注用 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴末梢	30~90分	↓																
ラクテック注	500mL	点滴末梢	2時間	×2	×2	↓														
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓														
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																

備考：

# 婦人科

レジメン名	TP Tri-weekly+Pembro													更新日	2023/2/21								
														1クール	21日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	・	21																	
生理食塩液	2000mL	点滴末梢	メイン	↓																			
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓																			
生理食塩液	100mL																						
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																			
アロカリス点滴静注	235mg																						
ガスター注射液	20mg																						
デキサート注射液	19.8mg																						
パクリタキセル注	175mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	3時間	↓																			
生理食塩液	500mL																						
硫酸Mg補正液	8mEq	点滴末梢	30分	↓																			
生理食塩液	100mL																						
シスプラチン点滴静注液	50mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	2時間	↓																			
生理食塩液	500mL																						
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																			

備考：





# 婦人科

レジメン名	子宮頸癌 TC tri-weekly+BEV			更新日	2021/3/18																
				1クール	21日間																
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	21															
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																	
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																	
ガスター注射液	20mg																				
デキサート注射液	19.8mg	点滴末梢	3時間	↓																	
パクリタキセル注	175mg/m <sup>2</sup>																				
ブドウ糖液5%	500mL	点滴末梢	1時間	↓																	
カルボプラチン注射液	AUC=5																				
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	30~90分	↓																	
アバチン点滴静注用	15mg/kg																				
生理食塩液	100mL	内服	投与前	↓																	
レスタミンコーワ錠	50mg																				

備考：



# 婦人科

レジメン名	Gyn:LEAP				更新日														
					1クール	2021/3/20 21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
キイトルーダ点滴静注	200mg/body	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		
レンビマカプセル	20mg	内服	1日1回	連日内服															

備考：

レジメン名	Gyn:Cemiplimab療法				更新日														
					1クール	2024/2/6 21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
リブタヨ点滴静注	350mg/body	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		

備考：

# 婦人科

レジメン名		Pembro+weeklyCDDP (CCRT)												更新日	2025/4/9							
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
					1	・	8	・	15													
生理食塩液	1000mL	点滴末梢	メイン	↓			↓		↓													
キイトルーダ点滴静注	200mg/body	点滴末梢	30分	↓																		
生理食塩液	100mL	点滴末梢	30分	↓																		
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓			↓		↓													
デキサート注射液	9.9mg	点滴末梢	30分	↓			↓		↓													
硫酸Mg補正液	8mEq	点滴末梢	30分	↓			↓		↓													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	30分	↓			↓		↓													
シスプラチン点滴静注	40mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	1時間	↓			↓		↓													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	1時間	↓			↓		↓													
マンニトールS注射液	200ml	点滴末梢	30分	↓			↓		↓													
生理食塩液	1000mL	点滴末梢	メイン	↓			↓		↓													

備考：原則2サイクル

レジメン名		Pembro(CCRT併用後) (3週毎)												更新日	2025/4/9							
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
					1	・	21															
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																		
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓																		
生理食塩液	100mL	点滴末梢	30分	↓																		

備考：Pembro+weeklyCDDP (CCRT)2サイクル投与後、3サイクル投与

レジメン名		Pembro(CCRT併用後) (6週毎)												更新日	2025/4/9							
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
					1	・	42															
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																		
キイトルーダ点滴静注	400mg	点滴末梢	30分	↓																		
生理食塩液	100mL	点滴末梢	30分	↓																		

備考：Pembro(CCRT併用後) (3週毎)を投与後、Pembro(CCRT併用後) (6週毎)を最大20サイクル（放射線治療中を含め）まで。