



# 婦人科

レジメン名		BEV(3週毎)												更新日	2020/3/18							
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓	1	.	21															
アバステン点滴静注	15mg/kg	点滴末梢	30~90分	↓																		
生理食塩液	100mL																					

備考：

レジメン名		Pembro+BEV(3週毎)												更新日	2023/2/21							
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓	1	.	21															
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓																		
生理食塩液	100mL																					
アバステン点滴静注	15mg/kg	点滴末梢	30~90分	↓																		
生理食塩液	100mL																					

備考：

レジメン名		Pembro(3週毎)												更新日	2023/2/21							
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓	1	.	21															
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓																		
生理食塩液	100mL																					

備考：

# 婦人科

レジメン名	PAOLA(BEV+Olaparib)			更新日	2023/2/21														
				1クール	21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
アバスタチン点滴静注用生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴末梢	30~90分	↓															

備考：リムパーザ 300mg/回 (600mg/日) 1日2回

レジメン名	TC tri-weekly			更新日	2020/3/18														
				1クール	21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	21													
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓															
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓															
ガスター注射液	20mg																		
デキサート注射液	19.8mg																		
パクリタキセル注	180mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	3時間	↓															
ブドウ糖液5%	500mL																		
カルボプラチン注射液	AUC=5	点滴末梢	1時間	↓															
ブドウ糖液5%	250mL																		
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓															

備考：

# 婦人科

レジメン名	TC tri-weekly+BEV				投与日																
					更新日		2020/3/18														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	1	.	21															
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																	
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																	
ガスター注射液	20mg	点滴末梢	30分	↓																	
デキサート注射液	19.8mg	点滴末梢	30分	↓																	
パクリタキセル注	180mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	3時間	↓																	
ブドウ糖液5%	500mL	点滴末梢	3時間	↓																	
カルボプラチン注射液	AUC=5	点滴末梢	1時間	↓																	
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	1時間	↓																	
アバチン点滴静注用	15mg/kg	点滴末梢	30~90分	↓																	
生理食塩液	100mL	点滴末梢	30~90分	↓																	
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																	

備考：

レジメン名	TC tri-weekly+Pembro+BEV				投与日																
					更新日		2023/2/21														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	1	.	21															
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																	
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓																	
生理食塩液	100mL	点滴末梢	30分	↓																	
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																	
ガスター注射液	20mg	点滴末梢	30分	↓																	
デキサート注射液	19.8mg	点滴末梢	30分	↓																	
パクリタキセル注	175mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	3時間	↓																	
生理食塩液	500mL	点滴末梢	3時間	↓																	
カルボプラチン注射液	AUC=5	点滴末梢	1時間	↓																	
生理食塩液	250mL	点滴末梢	1時間	↓																	
アバチン点滴静注用	15mg/kg	点滴末梢	30~90分	↓																	
生理食塩液	100mL	点滴末梢	30~90分	↓																	
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																	

備考：









# 婦人科

レジメン名	CPT-N													更新日					
														2020/3/18					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	8	・	28											
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓													
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓		↓													
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 生理食塩液	50mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	2時間	↓		↓													
アクブラ静注用 生理食塩液	60mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	2時間	↓															
ラクテック★D注	500mL	点滴末梢	2時間	↓		↓													

備考：

レジメン名	CPT-CDDP 20mg/m2 day1.8.15													更新日					
														2020/3/18					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	8	・	15	・	28									
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓											
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	3mg/100mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓		↓		↓											
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 生理食塩液	60mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	2時間	↓		↓		↓											
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	20mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	2時間	↓		↓		↓											
ラクテック★D注	500mL	点滴末梢	2時間	↓		↓		↓											

備考：



# 婦人科

レジメン名	PLD+BEV 入院用 (BEV4週毎)													更新日					
														2020/10/2					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	・	29												
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
アバチン点滴静注用 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴末梢	30~90分	↓															
ブドウ糖液5%	500mL	点滴末梢	メイン		↓														
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分		↓														
ドキシル注 ブドウ糖液5%	40mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間30分		↓														

備考：本レジメンを連続適用する場合、適宜インターバル1日短縮する。

レジメン名	PLD+BEV 外来用 (BEV4週毎)													更新日					
														2020/10/2					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	28													
ブドウ糖液5%	500mL	点滴末梢	メイン	↓															
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓															
ドキシル注 ブドウ糖液5%	40mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間30分	↓															
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
アバチン点滴静注用 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴末梢	30~90分	↓															

備考：ドキシル初回は入院用レジメンを使用する。



# 婦人科

レジメン名	PLD-C+BEV (10)				更新日	2024/2/6													
					1クール	28日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	15													
ブドウ糖液 5%	250mL	点滴末梢	メイン	↓															
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 13.2mg	点滴末梢	15分	↓															
ドキシル注 ブドウ糖液 5%	30mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間30分	↓															
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液 5%	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓															
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓													
アバスチン点滴静注用 生理食塩液	10mg/kg 100mL	点滴末梢	30~90分	↓		↓													

備考：PLD-Cは最大6サイクル目安

# 婦人科

レジメン名	子宮肉腫GD													更新日						
														2020/3/18						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	21												
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	3mg/100mL 19.8mg	点滴末梢	30分			↓														
ゲムシタビン点滴静注用 ブドウ糖液5%	900mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓														
ドセタキセル点滴静注 ブドウ糖液5%	100mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間			↓														

備考：2クール目以降ゲムシタビンの溶解液がブドウ糖液5% 250mL、投与時間が1時間30分の場合もあり

レジメン名	GC													更新日						
														2020/3/18						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	21												
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓		↓														
ゲムシタビン点滴静注用 ブドウ糖液5%	1000mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓														
カルボプラチン注射液 生理食塩液	AUC=4 500mL	点滴末梢	1時間30分	↓																

備考：

# 婦人科

レジメン名	Gem単独													更新日					
														2020/3/18					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	8	・	15	・	28									
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓											
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓		↓		↓											
ゲムシタビン点滴静注用 ブドウ糖液5%	1000mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓		↓											

備考：

レジメン名	weekly CDDP40mg/m <sup>2</sup> (CCRT)													更新日					
														2020/3/18					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	3	・	7											
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓															
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	3mg/100mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓															
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	40mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢	1時間	↓															
ラクテック注	500mL	点滴末梢	2時間	×2	×2	↓													
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓													

備考：day2・3はデキサメタゾン内服





# 婦人科

レジメン名	TP Tri-weekly+BEV													更新日	2022/9/27									
														1クール	21日間									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																				
				1	2	3	・	21																
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																				
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	15分	↓																				
ガスター注射液	20mg																							
デキサート注射液	19.8mg																							
パクリタキセル注	135mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	3時間	↓																				
生理食塩液	500mL																							
シスプラチン点滴静注液	50mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	2時間	↓																				
生理食塩液	500mL																							
アバスチン点滴静注用	15mg/kg	点滴末梢	30~90分	↓																				
生理食塩液	100mL																							
ラクテック注	500mL	点滴末梢	2時間	×2	×2	↓																		
ソルデム3 A 輸液	500mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓																		
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																				

備考：

# 婦人科

レジメン名	TP Tri-weekly+Pembro													更新日	2023/2/21							
														1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	・	21																
生理食塩液	2000mL	点滴末梢	メイン	↓																		
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓																		
生理食塩液	100mL																					
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																		
アロカリス点滴静注	235mg																					
ガスター注射液	20mg																					
デキサート注射液	19.8mg																					
パクリタキセル注	175mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	3時間	↓																		
生理食塩液	500mL																					
硫酸Mg補正液	8mEq	点滴末梢	30分	↓																		
生理食塩液	100mL																					
シスプラチン点滴静注液	50mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	2時間	↓																		
生理食塩液	500mL																					
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																		

備考：

# 婦人科

レジメン名	TP Tri-weekly+Pembro+BEV			更新日	2023/2/21																
				1クール	21日間																
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	21															
生理食塩液	2000mL	点滴末梢	メイン	↓																	
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓																	
生理食塩液	100mL																				
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																	
アロカリス点滴静注	235mg																				
ガスター注射液	20mg																				
デキサート注射液	19.8mg																				
パクリタキセル注	175mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	3時間	↓																	
生理食塩液	500mL																				
硫酸Mg補正液	8mEq	点滴末梢	30分	↓																	
生理食塩液	100mL																				
シスプラチン点滴静注液	50mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	2時間	↓																	
生理食塩液	500mL																				
アバスチン点滴静注用	15mg/kg	点滴末梢	30~90分	↓																	
生理食塩液	100mL																				
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																	

備考：

レジメン名	卵巣癌・CPT11			更新日	##															
				1クール	28日間															
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	8	.	15	.	28										
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓												
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓		↓		↓												
デキサート注射液	6.6mg																			
イリノテカン塩酸塩点滴静注液	100mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	1時間30分	↓		↓		↓												
生理食塩液	500mL																			

備考：



# 婦人科

レジメン名	子宮頸癌 TC tri-weekly+BEV			更新日	2021/3/18															
				1クール	21日間															
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																
ガスター注射液	20mg																			
デキサート注射液	19.8mg	点滴末梢	3時間	↓																
パクリタキセル注	175mg/m <sup>2</sup>																			
ブドウ糖液5%	500mL	点滴末梢	1時間	↓																
カルボプラチン注射液	AUC=5																			
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	30~90分	↓																
アバチン点滴静注用	15mg/kg																			
生理食塩液	100mL	内服	投与前	↓																
レスタミンコーワ錠	50mg																			

備考：



# 婦人科

レジメン名	Gyn:LEAP				更新日	2021/3/20														
					1クール	21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
キイトルーダ点滴静注	200mg/body	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			
レンビマカプセル	20mg	内服	1日1回		連日内服															

備考：

レジメン名	Gyn:Cemiplimab療法				更新日	2024/2/6														
					1クール	21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
リブタヨ点滴静注	350mg/body	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			

備考：



# 婦人科

レジメン名	TC tri-weekly+Pembro 子宮体癌				更新日															
					1クール	21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
キイトルーダ点滴静注	200mg/body	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL	点滴末梢																		
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																
ガスター注射液	20mg	点滴末梢																		
デキサート注射液	19.8mg																			
パクリタキセル注	175mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	3時間	↓																
生理食塩液	500mL																			
カルボプラチン注射液	AUC=5	点滴末梢	1時間	↓																
生理食塩液	250mL																			
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																

備考：デカドロン錠4mg2錠分2（朝・昼食後） day2-4 原則6サイクル（最大10サイクルまで許容）、その後Pembro単剤へ

# 婦人科

レジメン名	DC tri-weekly+Pembro 子宮体癌				更新日															
					1クール	21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
キイトルーダ点滴静注	200mg/body	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL	点滴末梢																		
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢																		
ドセタキセル点滴静注	75mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	1時間	↓																
生理食塩液	250mL	点滴末梢																		
カルボプラチン注射液	AUC=5	点滴末梢	1時間	↓																
生理食塩液	250mL	点滴末梢																		

備考：原則、TCと合わせて6サイクル（最大10サイクルまで許容）、その後Pembro単剤へ

# 婦人科

レジメン名	子宮体癌 Pembro(3週毎)				更新日														
					1クール	2025/7/24 21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
キイトルーダ点滴静注	200mg/body	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		

備考：TC/DC tri-weekly+Pembo 実施後のレジメン 臨床試験では原則28サイクル

レジメン名	子宮体癌 Pembro(6週毎)				更新日														
					1クール	2025/7/24 42日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	42													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
キイトルーダ点滴静注	400mg/body	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		

備考：TC/DC tri-weekly+Pembo 実施後のレジメン 臨床試験では原則14サイクル

# 婦人科

レジメン名	TC tri-weekly+Durvalumab 子宮体癌				更新日		2025/7/24													
					1クール		21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
イミフィンジ点滴静注	1120mg/body	点滴末梢	1時間	↓																
生理食塩液	100mL	点滴末梢																		
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																
ガスター注射液	20mg	点滴末梢																		
デキサート注射液	19.8mg																			
パクリタキセル注	175mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	3時間	↓																
生理食塩液	500mL																			
カルボプラチン注射液	AUC=6	点滴末梢	1時間	↓																
生理食塩液	250mL																			
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																

備考：原則6サイクル（副作用から主治医判断で最小4サイクルまで短縮可能）デカドロン錠4mg2錠分2（朝・昼食後）day2-4

レジメン名	DC tri-weekly+Durvalumab 子宮体癌				更新日		2025/7/24													
					1クール		21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
イミフィンジ点滴静注	1120mg/body	点滴末梢	1時間	↓																
生理食塩液	100mL	点滴末梢																		
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																
デキサート注射液	6.6mg																			
ドセタキセル点滴静注	75mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	1時間	↓																
生理食塩液	250mL																			
カルボプラチン注射液	AUC=5	点滴末梢	1時間	↓																
生理食塩液	250mL																			

備考：原則、TCと合わせて6サイクル（副作用から主治医判断で最小4サイクルまで短縮可能）



# 婦人科

レジメン名	子宮体癌 Durvalumab維持(>30kg)				更新日		2025/7/24													
					1クール		28日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	28														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
イミフィンジ点滴静注	1500mg/body	点滴末梢	1時間	↓																
生理食塩液	100mL																			

備考：

レジメン名	子宮体癌 Durvalumab維持(30kg以下)				更新日		2025/7/24													
					1クール		28日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	28														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
イミフィンジ点滴静注	20mg/kg	点滴末梢	1時間	↓																
生理食塩液	100mL																			

備考：