

婦人科

レジメン名	TCweekly (7日間隔)			更新日															
				1クール	2020/3/18 7日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	7													
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓															
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	30分	↓															
ガスター注射液	20mg																		
デキサート注射液	6.6mg																		
パクリタキセル注	80mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓															
ブドウ糖液5%	250mL																		
カルボプラチン注射液	AUC=2	点滴末梢	1時間	↓															
ブドウ糖液5%	250mL																		
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓															

備考：

レジメン名	TCweekly(3週1休)			更新日																
				1クール	2020/3/18 28日間															
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	8	.	15	.	28										
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓												
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	30分	↓		↓		↓												
ガスター注射液	20mg																			
デキサート注射液	6.6mg																			
パクリタキセル注	75mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓												
ブドウ糖液5%	250mL																			
カルボプラチン注射液	AUC=2	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓												
ブドウ糖液5%	250mL																			
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓												

備考：

婦人科

レジメン名	BEV(3週毎)													更新日									
														2020/3/18									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	.	21																	
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																			
アバチン点滴静注 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴末梢	30~90分	↓																			

備考：

レジメン名	Pembro+BEV(3週毎)													更新日									
														2023/2/21									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	.	21																	
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																			
キイトルーダ点滴静注 生理食塩液	200mg 100mL	点滴末梢	30分	↓																			
アバチン点滴静注 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴末梢	30~90分	↓																			

備考：

レジメン名	Pembro(3週毎)													更新日									
														2023/2/21									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	.	21																	
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																			
キイトルーダ点滴静注 生理食塩液	200mg 100mL	点滴末梢	30分	↓																			

備考：

婦人科

レジメン名	PAOLA(BEV+Olaparib)				更新日															
					1クール		21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
アバスチン点滴静注用 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴末梢	30~90分	↓																

備考：リムパーザ 300mg/回 (600mg/日) 1日2回

レジメン名	TC tri-weekly				更新日															
					1クール		21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 ガスター注射液 デキサート注射液	3mg/100mL 20mg 19.8mg	点滴末梢	30分	↓																
パクリタキセル注 ブドウ糖液5%	180mg/m ² 500mL	点滴末梢	3時間	↓																
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																

備考：

婦人科

レジメン名	TC tri-weekly + Pembro													更新日	2023/2/21					
														1クール	21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																
ガスター注射液	20mg	点滴末梢	30分	↓																
デキサート注射液	19.8mg																			
パクリタキセル注	175mg/m ²	点滴末梢	3時間	↓																
生理食塩液	500mL																			
カルボプラチン注射液	AUC=5	点滴末梢	1時間	↓																
生理食塩液	250mL																			
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																

備考：

レジメン名	Triweekly TN													更新日	2020/3/18					
														1クール	21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																
ガスター注射液	20mg	点滴末梢	30分	↓																
デキサート注射液	19.8mg																			
パクリタキセル注	180mg/m ²	点滴末梢	3時間	↓																
ブドウ糖液5%	500mL																			
アクブラ静注用	80mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓																
生理食塩液	250mL																			
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																

備考：

婦人科

レジメン名		TN+BEV												更新日	2020/3/18							
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
					1	.	21															
生理食塩液		500mL	点滴末梢	メイン	↓																	
グラニセトロン点滴静注		3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																	
ガスター注射液		20mg																				
デキサート注射液		19.8mg																				
パクリタキセル注		180mg/m ²	点滴末梢	3時間	↓																	
ブドウ糖液5%		500mL																				
アクブラ静注用		60mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓																	
生理食塩液		250mL																				
アバスチン点滴静注用		15mg/kg100mL	点滴末梢	30~90分	↓																	
生理食塩液																						
レスタミンコーワ錠		50mg	内服	投与前	↓																	

備考：

レジメン名		GC+BEV												更新日	2020/3/18							
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
					1	.	8	.	21													
生理食塩液		500mL	点滴末梢	メイン	↓																	
ラクテック注		500mL	点滴末梢	メイン			↓															
グラニセトロン点滴静注		1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓															
デキサート注射液		6.6mg																				
ゲムシタビン点滴静注用		1000mg/m ²	点滴末梢	30分	↓		↓															
ブドウ糖液5%		100mL																				
カルボプラチン注射液		AUC=4	点滴末梢	1時間	↓																	
ブドウ糖液5%		250mL																				
アバスチン点滴静注用		15mg/kg100mL	点滴末梢	30~90分	↓																	
生理食塩液																						

備考：

婦人科

レジメン名	DC (75mg/m ²)													更新日						
														2022/9/27						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																
ドセタキセル点滴静注 生理食塩液	75mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
カルボプラチン注射液 生理食塩液	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
ラクテック★D注	500mL	点滴末梢	2時間	↓																

備考：

レジメン名	DC+BEV													更新日						
														2020/3/18						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																
ドセタキセル点滴静注 生理食塩液	60mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
カルボプラチン注射液 生理食塩液	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
アバスチン点滴静注用 生理食塩液	15mg/kg100mL	点滴末梢	30~90分	↓																

備考：

婦人科

レジメン名	weekly DC													更新日						
														2020/3/18						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	7														
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	3mg/100mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																
ドセタキセル点滴静注 ブドウ糖液5%	30mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=2 250mL	点滴末梢	1時間	↓																

備考：

レジメン名	weekly TN													更新日						
														2020/3/18						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	7														
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 ガスター注射液 デキサート注射液	1mg/50mL 20mg 6.6mg	点滴末梢	15分	↓																
パクリタキセル注 ブドウ糖液5%	80mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
アクブラ静注用 ブドウ糖液5%	25mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																

備考：

婦人科

レジメン名	CPT-N													更新日					
														2020/3/18					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	8	・	28											
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓													
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓		↓													
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 生理食塩液	50mg/m ² 500mL	点滴末梢	2時間	↓		↓													
アクブラ静注用 生理食塩液	60mg/m ² 500mL	点滴末梢	2時間	↓															
ラクテック★D注	500mL	点滴末梢	2時間	↓		↓													

備考：

レジメン名	CPT-CDDP 20mg/m ² day1.8.15													更新日					
														2020/3/18					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	8	・	15	・	28									
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓											
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	3mg/100mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓		↓		↓											
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 生理食塩液	60mg/m ² 500mL	点滴末梢	2時間	↓		↓		↓											
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	20mg/m ² 500mL	点滴末梢	2時間	↓		↓		↓											
ラクテック★D注	500mL	点滴末梢	2時間	↓		↓		↓											

備考：

婦人科

レジメン名	PLD+BEV 入院用 (BEV4週毎)													更新日	2020/10/2				
														1クール	29日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	・	29												
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
アバスタチン点滴静注用 生理食塩液	15mg/kg100mL	点滴末梢	30~90分	↓															
ブドウ糖液5%	500mL	点滴末梢	メイン		↓														
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分		↓														
ドキシル注 ブドウ糖液5%	40mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間30分		↓														

備考：本レジメンを連続適用する場合、適宜インターバル1日短縮する。

レジメン名	PLD+BEV 外来用 (BEV4週毎)													更新日	2020/10/2				
														1クール	28日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	28													
ブドウ糖液5%	500mL	点滴末梢	メイン	↓															
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓															
ドキシル注 ブドウ糖液5%	40mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間30分	↓															
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
アバスタチン点滴静注用 生理食塩液	15mg/kg100mL	点滴末梢	30~90分	↓															

備考：ドキシル初回は入院用レジメンを使用する。

婦人科

レジメン名	PLD													更新日						
														2020/3/18						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	28														
ブドウ糖液 5%	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																
ドキシル注 ブドウ糖液 5%	50mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間30分	↓																

備考：

レジメン名	PLD-C													更新日						
														2020/3/18						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	28														
ブドウ糖液 5%	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																
ドキシル注 ブドウ糖液 5%	30mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液 5%	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																

備考：

婦人科

レジメン名	PLD-C+BEV (10)													更新日	2024/2/6					
														1クール	28日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	15														
ブドウ糖液 5%	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 13.2mg	点滴末梢	15分	↓																
ドキシル注 ブドウ糖液 5%	30mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間30分	↓																
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液 5%	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
アバチン点滴静注用 生理食塩液	10mg/kg100mL	点滴末梢	30~90分	↓		↓														

備考：PLD-Cは最大6サイクル目安

婦人科

レジメン名	子宮肉腫GD													更新日						
														2020/3/18						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	21												
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	3mg/100mL 19.8mg	点滴末梢	30分			↓														
ゲムシタビン点滴静注用 ブドウ糖液5%	900mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓														
ドセタキセル点滴静注 ブドウ糖液5%	100mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間			↓														

備考：2クール目以降ゲムシタビンの溶解液がブドウ糖液5% 250mL、投与時間が1時間30分の場合もあり

レジメン名	GC													更新日						
														2020/3/18						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	21												
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓		↓														
ゲムシタビン点滴静注用 ブドウ糖液5%	1000mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓														
カルボプラチン注射液 生理食塩液	AUC=4 500mL	点滴末梢	1時間30分	↓																

備考：

婦人科

レジメン名	Gem単独													更新日	2020/3/18				
														1クール	28日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	8	・	15	・	28									
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓											
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓		↓		↓											
ゲムシタビン点滴静注用 ブドウ糖液5%	1000mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓		↓											

備考：

レジメン名	weekly CDDP40mg/m ² (CCRT)													更新日	2020/3/18				
														1クール	7日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	3	・	7											
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓															
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	3mg/100mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓															
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	40mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓															
ラクテック注	500mL	点滴末梢	2時間	×2	×2	↓													
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓													

備考：day2・3はデキサメタゾン内服

婦人科

レジメン名	Nogitecan1.25mg/m ² day1~5+BEV													更新日							
														2020/3/18							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	2	3	4	5	・	21											
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓	↓	↓													
生理食塩液 デキサート注射液	20mL 6.6mg	点滴末梢	ワンショット	↓	↓	↓	↓	↓													
ハイカムチン注射用 生理食塩液	1.25mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓	↓	↓	↓	↓													
アバステン点滴静注用 生理食塩液	15mg/kg100mL	点滴末梢	30~90分	↓																	

備考：

レジメン名	weekly CDGP35mg/m ² (CCRT)													更新日							
														2020/3/18							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	2	3	・	7													
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓																	
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	3mg/100mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																	
アクブラ静注用 生理食塩液	35mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓																	
ラクテック注	500mL	点滴末梢	2時間	×2	×2	↓															
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓															

備考：day2・3はデキサメタゾン内服

婦人科

レジメン名	AP				更新日														
					2022/9/27														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	3	...	21											
ラクテック注	500mL	点滴末梢	メイン	↓															
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 19.8mg	点滴末梢	30分	↓															
ドキソルビシン塩酸塩注射用 生理食塩液	60mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓															
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	50mg/m ² 500mL	点滴末梢	2時間	↓															
ソルデム3 A 輸液	500mL	点滴末梢	2時間	×3	×2	×2													
ソルデム3 A 輸液 ラシックス注	500mL 10mg	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓													

備考：

婦人科

レジメン名	TP Tri-weekly+Pembro													更新日	2023/2/21						
														1クール	21日間						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	21															
生理食塩液	2000mL	点滴末梢	メイン	↓																	
キイトルーダ点滴静注 生理食塩液	200mg 100mL	点滴末梢	30分	↓																	
パロノセトロン点滴静注 アロカリス点滴静注 ガスター注射液 デキサート注射液	0.75mg/50mL 235mg 20mg 19.8mg	点滴末梢	30分	↓																	
パクリタキセル注 生理食塩液	175mg/m ² 500mL	点滴末梢	3時間	↓																	
硫酸Mg補正液 生理食塩液	8mEq 100mL	点滴末梢	30分	↓																	
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	50mg/m ² 500mL	点滴末梢	2時間	↓																	
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																	

備考：

婦人科

レジメン名	子宮頸癌 TC tri-weekly+BEV			更新日	2021/3/18															
				1クール	21日間															
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																
ガスター注射液	20mg																			
デキサート注射液	19.8mg	点滴末梢	3時間	↓																
パクリタキセル注	175mg/m ²																			
ブドウ糖液5%	500mL	点滴末梢	1時間	↓																
カルボプラチン注射液	AUC=5																			
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	30~90分	↓																
アバチン点滴静注用	15mg/kg100mL																			
生理食塩液		点滴末梢	30~90分	↓																
レスタミンコーワ錠	50mg				内服	投与前	↓													

備考：

婦人科

レジメン名	Gyn:LEAP				更新日	2021/3/20													
					1クール	21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
キイトルーダ点滴静注 生理食塩液	200mg/body 100mL	点滴末梢	30分	↓															
レンビマカプセル	20mg	内服	1日1回	連日内服															

備考：

レジメン名	Gyn:Cemiplimab療法				更新日	2024/2/6													
					1クール	21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
リプタヨ点滴静注 生理食塩液	350mg/body 100mL	点滴末梢	30分	↓															

備考：

婦人科

レジメン名		Pembro+weeklyCDDP (CCRT)											更新日	2025/4/9												
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																					
					1	.	8	.	15																	
生理食塩液	1000mL	点滴末梢	メイン	↓			↓		↓																	
キイトルーダ点滴静注 生理食塩液	200mg/body 100mL	点滴末梢	30分	↓																						
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	3mg/100mL 9.9mg	点滴末梢	30分	↓			↓		↓																	
硫酸Mg補正液 生理食塩液	8mEq 100mL	点滴末梢	30分	↓			↓		↓																	
シスプラチン点滴静注 生理食塩液	40mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓			↓		↓																	
マンニトールS注射液 生理食塩液	200ml 1000mL	点滴末梢	30分 メイン	↓			↓		↓																	

備考：原則2サイクル

レジメン名		Pembro(CCRT併用後) (3週毎)											更新日	2025/4/9												
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																					
					1	.	21																			
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																						
キイトルーダ点滴静注 生理食塩液	200mg 100mL	点滴末梢	30分	↓																						

備考：Pembro+weeklyCDDP (CCRT)2サイクル投与後、3サイクル投与

レジメン名		Pembro(CCRT併用後) (6週毎)											更新日	2025/4/9												
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																					
					1	.	42																			
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																						
キイトルーダ点滴静注 生理食塩液	400mg 100mL	点滴末梢	30分	↓																						

備考：Pembro(CCRT併用後) (3週毎)を投与後、Pembro(CCRT併用後) (6週毎)を最大20サイクル（放射線治療中を含め）まで。

婦人科

レジメン名	DC tri-weekly + Pembro 子宮体癌				更新日															
					1クール		21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
キイトルーダ点滴静注 生理食塩液	200mg/body 100mL	点滴末梢	30分	↓																
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																
ドセタキセル点滴静注 生理食塩液	75mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
カルボプラチン注射液 生理食塩液	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																

備考：原則、TCと合わせて6サイクル（最大10サイクルまで許容）、その後Pembro単剤へ

婦人科

レジメン名	子宮体癌 Pembro(3週毎)										更新日	2025/7/24							
											1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
キイトルーダ点滴静注 生理食塩液	200mg/body 100mL	点滴末梢	30分	↓															

備考：TC/DC tri-weekly+Pembo 実施後のレジメン 臨床試験では原則28サイクル

レジメン名	子宮体癌 Pembro(6週毎)										更新日	2025/7/24							
											1クール	42日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	42													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
キイトルーダ点滴静注 生理食塩液	400mg/body 100mL	点滴末梢	30分	↓															

備考：TC/DC tri-weekly+Pembo 実施後のレジメン 臨床試験では原則14サイクル

婦人科

レジメン名	TC tri-weekly + Durvalumab 子宮体癌													更新日	2025/7/24					
														1クール	21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
イミフィンジ点滴静注 生理食塩液	1120mg/body 100mL	点滴末梢	1時間	↓																
パロノセトロン点滴静注 ガスター注射液 デキサート注射液	0.75mg/50mL 20mg 19.8mg	点滴末梢	30分	↓																
パクリタキセル注 生理食塩液	175mg/m ² 500mL	点滴末梢	3時間	↓																
カルボプラチン注射液 生理食塩液	AUC=6 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
レスタミンコーワ錠	50mg	内服	投与前	↓																

備考：原則6サイクル（副作用から主治医判断で最小4サイクルまで短縮可能）デカドロン錠4mg2錠分2（朝・昼食後）day2-4

レジメン名	DC tri-weekly + Durvalumab 子宮体癌													更新日	2025/7/24					
														1クール	21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
イミフィンジ点滴静注 生理食塩液	1120mg/body 100mL	点滴末梢	1時間	↓																
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																
ドセタキセル点滴静注 生理食塩液	75mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓																
カルボプラチン注射液 生理食塩液	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																

備考：原則、TCと合わせて6サイクル（副作用から主治医判断で最小4サイクルまで短縮可能）

婦人科

レジメン名	子宮体癌 Durvalumab+Olaparib維持(>30kg)				更新日														
					1クール	28日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	28													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
イミフィンジ点滴静注 生理食塩液	1500mg/body 100mL	点滴末梢	1時間	↓															

備考：pMMR症例はリムパーザを併用する（1回300mg 1日2回）

レジメン名	子宮体癌 Durvalumab+Olaparib維持(30kg以下)				更新日														
					1クール	28日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	28													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
イミフィンジ点滴静注 生理食塩液	20mg/kg 100mL	点滴末梢	1時間	↓															

備考：pMMR症例はリムパーザを併用する（1回300mg 1日2回）

婦人科

レジメン名	子宮体癌 Durvalumab維持(>30kg)				更新日														
					1クール	28日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	28													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
イミフィンジ点滴静注	1500mg/body	点滴末梢	1時間	↓															
生理食塩液	100mL																		

備考：

レジメン名	子宮体癌 Durvalumab維持(30kg以下)				更新日														
					1クール	28日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	28													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
イミフィンジ点滴静注	20mg/kg	点滴末梢	1時間	↓															
生理食塩液	100mL																		

備考：

婦人科

レジメン名	PLD-N											更新日	2026/4/23																				
												1クール	28日間																				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																													
				1	・	28																											
ブドウ糖液 5%	250mL	点滴末梢	メイン	↓																													
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 9.9mg	点滴末梢	30分	↓																													
ドキシル注 ブドウ糖液 5%	30mg/m ² 250mL	点滴末梢	90分	↓																													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																													
アクブラ静注用 生理食塩液	80mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓																													

備考：カルボプラチンによるアレルギー歴のある患者に用いる

レジメン名	TV											更新日	2026/4/23																				
												1クール	21日間																				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																													
				1	・	21																											
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																													
テブダック点滴静注 ブドウ糖液 5%	2mg/kg 100mL	点滴末梢	30分	↓																													

備考：必要な点眼薬3剤は眼科にて処方された薬剤を使用する