

泌尿器

レジメン名	カバジタキセル（去勢抵抗性前立腺癌）				更新日															
					1クール	2020/3/17 21日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	21														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																
デキサート注射液	6.6mg																			
ポララミン注	5mg																			
ガスター注射液	20mg																			
生理食塩液	250mL	点滴末梢	1時間	↓																
ジェブタナ点滴静注	25mg/m ²																			
プレドニゾン	10mg	内服	朝食後		day1~21															

備考：ジーラスタ皮下注3.6mg(day2)

レジメン名	ドセタキセル療法（ステロイド併用）				更新日														
					1クール	2020/3/26 21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	21													
ラクテックD輸液	500mL	点滴末梢	メイン	↓															
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	点滴末梢	30分	↓															
デキサート注射液	6.6mg																		
ドセタキセル点滴静注	75mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓															
生理食塩液	500mL																		
プレドニゾン	10mg	内服			連日服用														

備考：

泌尿器

レジメン名		テムシロリムス										更新日	2020/3/26							
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日															
					1	.	7													
生理食塩液		100mL	点滴末梢	メイン	↓															
ポララミン注		5mg	点滴末梢	ワンショット	↓															
トーリセル点滴静注液		25mg	点滴末梢	30分～	↓															
生理食塩液		250mL		1時間	↓															

備考：

レジメン名		Pembro（3週毎）										更新日	2021/3/20							
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日															
					1	.	21													
生理食塩液		100mL	点滴末梢	メイン	↓															
キイトルーダ点滴静注		200mg/body	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液		100mL																		

備考：

レジメン名		Pembro（6週毎）										更新日	2021/3/20							
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日															
					1	.	42													
生理食塩液		100mL	点滴末梢	メイン	↓															
キイトルーダ点滴静注		400mg/body	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液		100mL																		

備考：

泌尿器

レジメン名	腎癌 AXI+Pembro (3週毎)				更新日	2021/3/20													
					1クール	21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
キイトルーダ点滴静注 生理食塩液	200mg/body 100mL	点滴末梢	30分	↓															
インライタ錠	10-20mg/日	内服	1日2回	連日服用															

備考：

レジメン名	腎癌 AXI+Pembro (6週毎)				更新日	2021/3/20													
					1クール	42日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	42													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
キイトルーダ点滴静注 生理食塩液	400mg/body 100mL	点滴末梢	30分	↓															
インライタ錠	10-20mg/日	内服	1日2回	連日服用															

備考：

泌尿器

レジメン名	腎癌 Cabo+NIVO (240mg/body : 2週毎)				更新日	2021/11/15													
					1クール	14日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	14													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
オプジーボ点滴静注	240mg/body	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		
カボザンチニブ錠	40mg/日	内服	空腹時	連日服用															

備考：

レジメン名	腎癌 Cabo+NIVO (480mg/body : 4週毎)				更新日	2021/11/15													
					1クール	28日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	28													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
オプジーボ点滴静注	480mg/body	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		
カボザンチニブ錠	40mg/日	内服	空腹時	連日服用															

備考：

泌尿器

レジメン名	腎癌 Lenva+Pembro (3週毎)				更新日	2022/9/27													
					1クール	21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
キイトルーダ点滴静注 生理食塩液	200mg/body 100mL	点滴末梢	30分	↓															
レンビマカプセル	20mg/日	内服	1日1回	連日服用															

備考：

レジメン名	腎癌 Lenva+Pembro (6週毎)				更新日	2022/9/27													
					1クール	42日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	42													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
キイトルーダ点滴静注 生理食塩液	400mg/body 100mL	点滴末梢	30分	↓															
レンビマカプセル	20mg/日	内服	1日1回	連日服用															

備考：

泌尿器

レジメン名	尿路上皮癌 EV										更新日								
											1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	8	・	15	・	28									
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓											
パドセブ点滴静注 生理食塩液	1.25mg/kg 50mL	点滴末梢	30分	↓		↓		↓											

備考：

レジメン名	尿路上皮癌 NIVO(240mg/body：2週毎)										更新日								
											1クール	14日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	14													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
オブジーボ点滴静注 生理食塩液	240mg/body 100mL	点滴末梢	30分	↓															

備考：術後補助化学療法（投与期間12ヶ月まで）

レジメン名	尿路上皮癌 NIVO(480mg/body：4週毎)										更新日								
											1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	28													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
オブジーボ点滴静注 生理食塩液	480mg/body 100mL	点滴末梢	30分	↓															

備考：術後補助化学療法（投与期間12ヶ月まで）

泌尿器

レジメン名	ddMVAC														更新日	2023/2/21			
															1クール	14日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	・	14					
ソルデム3 A輸液	500mL	点滴末梢	メイン	↓															
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン		↓														
ラクテック輸液	500mL	点滴末梢	メイン			↓	↓	↓											
生理食塩液	100mL	点滴末梢	30分	↓															
メソトレキセート注	30mg/m ²	点滴末梢	30分	↓															
ソルデム3 A輸液	500mL	点滴末梢	3時間	↓															
メイロン7%	20mL	点滴末梢	2時間		↓														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	2時間		↓														
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分		↓														
アロカリス点滴静注	235mg	点滴末梢	30分		↓														
デキサート注射液	9.9mg	点滴末梢	30分			↓	↓	↓											
生理食塩液	50mL	点滴末梢	15分			↓	↓	↓											
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分			↓	↓	↓											
ドキシソルピシン塩酸塩注射用	30mg/m ²	点滴末梢	30分		↓														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	30分		↓														
エクザール注射用	3mg/m ²	点滴末梢	30分		↓														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	30分		↓														
ソルデム3 A輸液	500mL	点滴末梢	1時間		↓														
硫酸Mg補正液	8mEq	点滴末梢	1時間		↓														
マンニトールS注射液	200mL	点滴末梢	30分		↓														
シスプラチン点滴静注液	70mg/m ²	点滴末梢	2時間		↓														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	2時間		↓														
ソルデム3 A輸液	500mL	点滴末梢	2時間		↓														
ラクテック輸液	500mL	点滴末梢	4時間		↓														
フィルグラスチムBS注シリンジ	75μg	皮下注射						↓	↓	↓	↓	↓							

備考：計4～6コース。・（制吐剤）オランザピン併用

泌尿器

レジメン名	尿路上皮癌 EV+Pembro (3週毎)													更新日						
														2025/4/1						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	21												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン			↓														
パドセブ点滴静注	1.25mg/kg	点滴末梢	30分	↓		↓														
生理食塩液	50mL																			
キイトルーダ点滴静注	200mg/body	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			

備考：

レジメン名	尿路上皮癌 EV+Pembro (6週毎)													更新日						
														2025/4/1						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	22	・	29	・	42								
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン			↓		↓		↓										
パドセブ点滴静注	1.25mg/kg	点滴末梢	30分	↓		↓		↓		↓										
生理食塩液	50mL																			
キイトルーダ点滴静注	400mg/body	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			

備考：

泌尿器

レジメン名	尿路上皮癌 NIVO+GC (CBDCA) 療法				更新日		2025/7/23													
					1クール		21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	21												
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン			↓														
オブジーボ点滴静注 生理食塩液	360mg/body 100mL	点滴末梢	30分	↓																
パロノセトロン点滴静注 アロカリス点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 235mg 3.3mg	点滴末梢	30分	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分			↓														
ゲムシタビン点滴静注 ブドウ糖液5%	1000mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓														
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																

備考：CDDP中止例で使用を考慮（GEM+CDDP併用において治療を開始） NIVO+化学療法（GEM+CDDP/CBDCA）は合計6サイクルまで

泌尿器

レジメン名	尿路上皮癌(NIVO+GC後) NIVO(240mg)													更新日	2025/7/17							
														1クール	14日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓	1	.	14															
オプジーボ点滴静注	240mg/body	点滴末梢	30分	↓																		
生理食塩液	100mL																					

備考：

レジメン名	尿路上皮癌(NIVO+GC後) NIVO(480mg)													更新日	2025/7/17							
														1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓	1	.	28															
オプジーボ点滴静注	480mg/body	点滴末梢	30分	↓																		
生理食塩液	100mL																					

備考：

泌尿器

レジメン名	膀胱癌（術前）Durva+GC（CDDP）													更新日	2026/4/23					
	薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
1					2	3	4	5	・	8	・	21								
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
ソルデム3 A 輸液	500mL	点滴末梢	メイン		↓															
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン			↓	↓				↓									
イミフィンジ点滴静注	1500mg/body	点滴末梢	1時間	↓																
生理食塩液	100mL																			
ソルデム3 A 輸液	500mL	点滴末梢	1時間	↓																
硫酸Mg補正液	8mEq																			
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																
アロカリス点滴静注	235mg																			
デキサート注射液	9.9mg																			
生理食塩液	50mL	点滴末梢	15分		↓	↓	↓													
デキサート注射液	6.6mg																			
生理食塩液	50mL	点滴末梢	15分								↓									
デキサート注射液	3.3mg																			
ゲムシタビン点滴静注用	1000mg/m ²	点滴末梢	30分	↓							↓									
ブドウ糖液5%	100mL																			
マンニトールS注射液	200mL	点滴末梢	30分	↓																
シスプラチン点滴静注液	70mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																
生理食塩液	500mL																			
ラクテックD輸液	500mL	点滴末梢	1時間	×2																
ラクテック輸液	500mL	点滴末梢	2時間		↓															

備考：Durva+化学療法（GEM+CDDP）は合計4サイクルまで ・（制吐剤）オランザピン併用

泌尿器

レジメン名	膀胱癌（術前）Durva+GC（CDDP）Ccr<60										更新日								
											1クール		21日間						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	8	・	21											
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓													
イミフィンジ点滴静注	1500mg/body	点滴末梢	1時間	↓															
生理食塩液	100mL																		
ソルデム3 A 輸液	500mL	点滴末梢	1時間	↓		↓													
硫酸Mg補正液	8mEq																		
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分	↓		↓													
アロカリス点滴静注	235mg																		
デキサート注射液	9.9mg																		
ゲムシタビン点滴静注用	1000mg/m ²	点滴末梢	30分	↓		↓													
ブドウ糖液5%	100mL																		
マンニトールS注射液	200mL	点滴末梢	30分	↓		↓													
シスプラチン点滴静注	35mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓		↓													
生理食塩液	500mL																		
ラクテックD輸液	500mL	点滴末梢	1時間	×2		×2													

備考：Durva+化学療法（GEM+CDDP）は合計4サイクルまで ・（制吐剤）オランザピン併用

レジメン名	膀胱癌(術後) Durva										更新日								
											1クール		28日間						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	28													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
イミフィンジ点滴静注	1500mg/body	点滴末梢	1時間	↓															
生理食塩液	100mL																		

備考：術前補助療法（Durva+GC）を実施し、その後の術後補助療法として投与 最大8サイクル

泌尿器

レジメン名	前立腺癌 DTX+DAR (ADT併用)				更新日	2026/3/11															
					1クール	21日間															
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	21															
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																	
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																	
ドセタキセル点滴静注 生理食塩液	75mg/body 250mL	点滴末梢	1時間	↓																	
ダロルタミド	1200mg/日	内服	1日2回	連日服用																	
備考：ADT（アンドロゲン遮断療法：GnRHagonist/antagonistまたは精巣摘除術）を併用。ステロイド内服は主治医判断。ドセタキセルはダロルタミド開始後6週間以内に開始し、最大6サイクル投与。																					