

胃

レジメン名	G-SOX																更新日	2020/3/19				
																	1クール	21日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	.	.	.	.	.	15	.	21										
ブドウ糖液 5 %	500mL	点滴末梢	メイン	↓							15		21									
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液 ポララミン注	3mg/100mL 6.6mg 5mg	点滴末梢	30分	↓																		
オキサリプラチン点滴静注液 デキサート注射液 ブドウ糖液 5 %	100mg/m ² 1.65mg 250ml	点滴末梢	2時間	↓																		
S-1	備考参照	内服	朝夕食後	day1 夕～day15 朝服用																		

備考：S-1 体表面積<1.25m² 80mg/日、1.25～1.5未満 100mg/日、1.5≤120mg/日

レジメン名		G-SOX(リザーバ)														更新日		2020/3/19							
																1クール		21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																					
				1	.	.	.	.	.	15	.	21													
生理食塩液	20mL	フラッシュ	フラッシュ	↓								15		21											
ブドウ糖液 5%	500mL	中心静脈	メイン	↓																					
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液 ポララミン注	3mg/100mL 6.6mg 5mg	中心静脈	30分	↓																					
オキサリプラチン点滴静注液 ブドウ糖液 5%	100mg/m ² 250ml	中心静脈	2時間	↓																					
ヘパリンナトリウムロック用	10単位	ロック	ロック	↓																					
S-1	備考参照	内服	朝夕食後	day1 夕～day15 朝服用																					

備考：S-1 体表面積<1.25m² 80mg/日、1.25～1.5未満 100mg/日、1.5≤120mg/日

胃

レジメン名	GC:胃癌SOX+NIVO(末梢)														更新日	2022/5/11					
															1クール	21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	.	.	.	.	15	.	21									
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																	
オブジーボ点滴静注	360mg/body	点滴末梢	30分	↓																	
生理食塩液	100mL																				
ブドウ糖液5%	500mL	点滴末梢	メイン	↓																	
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL																				
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	30分	↓																	
ポララミン注	5mg																				
オキサリプラチン点滴静注液	130mg/m ²																				
デキサート注射液	1.65mg	点滴末梢	2時間	↓																	
ブドウ糖液5%	250ml																				
S-1	備考参照	内服	朝夕食後	day1夕～day15朝服用																	

備考：S-1 体表面積<1.25m² 80mg/日、1.25～1.5未満 100mg/日、1.5≤120mg/日

レジメン名	GC:胃癌SOX+NIVO(リザーバー)														更新日	2022/5/11										
															1クール	21日間										
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																						
				1	.	.	.	.	.	15	.	21														
生理食塩液	20mL	フラッシュ	フラッシュ	↓																						
生理食塩液	100mL	中心静脈	メイン	↓																						
オブジーボ点滴静注	360mg/body	中心静脈	30分	↓																						
生理食塩液	100mL																									
ブドウ糖液 5%	500mL	中心静脈	メイン	↓																						
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL																									
デキサート注射液	6.6mg	中心静脈	30分	↓																						
ポララミン注	5mg																									
オキサリプラチン点滴静注液	130mg/m ²	中心静脈	2時間	↓																						
ブドウ糖液 5%	250ml																									
ヘパリンナトリウムロック用	10単位	ロック	ロック	↓																						
S-1	備考参照	内服	朝夕食後	day1タ～day15朝服用																						

備考：S-1 体表面積<1.25m² 80mg/日、1.25～1.5未満 100mg/日、1.5≤120mg/日

胃

レジメン名	術前G-SOX														更新日	2020/3/19							
															1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	.	.	.	.	.	15	.	21											
ブドウ糖液 5 %	500mL	点滴末梢	メイン	↓							15		21										
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																			
デキサート注射液	6.6mg																						
ポララミン注	5mg																						
オキサリプラチン点滴静注液	130mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																			
デキサート注射液	1.65mg																						
ブドウ糖液 5 %	250ml																						
S-1	備考参照	内服	朝夕食後	day1夕～day15朝服用																			

備考：S-1 体表面積<1.25m² 80mg/日、1.25～1.5未満 100mg/日、1.5≤120mg/日
術前2～3コースまで

胃

レジメン名	GC : RAM+nabPTX																	更新日	2020/3/19	
																		1クール	28日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	15	・	28										
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		28										
グラニセトロン点滴静注バッグ デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓		↓		↓												
サイラムザ点滴静注液 生理食塩液	8mg/kg 250ml	点滴末梢	1時間	↓				↓												
アブラキサン点滴静注用 生理食塩液	100mg/m ² 100ml	点滴末梢	30分	↓		↓		↓												

備考：サイラムザ投与日は前投薬として抗ヒスタミン剤を使用（経口薬も可）

レジメン名	GC ; RAM+PTX療法																	更新日	2020/3/19						
																		1ケール	28日間						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																					
				1	・	8	・	15	・	28															
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓																	
グラニセトロン点滴静注バッグ	1mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓																	
デキサート注射液	6.6mg																								
ガスター注射液	20mg																								
サイラムザ点滴静注液	8mg/kg	点滴末梢	1時間	↓				↓																	
生理食塩液	250ml																								
パクリタキセル注	80mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓																	
生理食塩液	250ml																								
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓																	

備考：

胃

レジメン名	GC ; RAM単剤療法																	更新日	2020/3/19	
																		1クール	14日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	14														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓			14													
サイラムザ点滴静注液	8mg/kg	点滴末梢	1時間	↓																
生理食塩液	250ml	点滴末梢	1時間	↓																

備考：サイラムザ投与日は前投薬として抗ヒスタミン剤を使用（経口薬も可）

レジメン名	GC : Weekly nabPTX																	更新日	2020/3/19	
																		1クール	28日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	15	・	28										
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓												
生理食塩液	100mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓												
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分	↓		↓		↓												
アブラキサン点滴静注用	100mg/m ²	点滴末梢	30分	↓		↓		↓												
生理食塩液	100ml																			

備考：

胃

レジメン名	GC:胃癌XELOX（リザーバー）															更新日	2020/3/19								
																1クール	21日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																					
				1	.	.	.	.	.	15	.	21													
生理食塩液	20mL	フラッシュ	フラッシュ	↓								15		21											
ブドウ糖液 5%	100mL	中心静脈	メイン	↓																					
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	中心静脈	30分	↓																					
デキサート注射液	6.6mg																								
ポララミン注	5mg																								
オキサリプラチン点滴静注液	130mg/m ²	中心静脈	2時間	↓																					
ブドウ糖液 5%	250ml																								
ヘパリンナトリウムロック用	10単位	ロック	ロック	↓																					
カペシタビン	備考参照	内服	朝夕食後	day1タ～day15朝服用																					

備考：カペシタビン 1000mg/m²/回（2000mg/m²/日） 1日2回

レジメン名	GC:胃癌XELOX（末梢）																更新日	2020/3/19			
																	1クール	21日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	.	.	.	.	15	.	21									
ブドウ糖液 5%	250mL	点滴末梢	メイン	↓																	
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液 ポララミン注	3mg/100mL 6.6mg 5mg	点滴末梢	30分	↓																	
オキサリプラチン点滴静注液 デキサート注射液 ブドウ糖液 5%	130mg/m ² 1.65mg 250ml	点滴末梢	2時間	↓																	
カペシタビン	備考参照	内服	朝夕食後	day1夕～day15朝服用																	

備考：カペシタビン 1000mg/m²/回（2000mg/m²/日） 1日2回

胃

レジメン名	GC:胃癌CapeOX+NIVO（リザーバー）															更新日	2022/5/11					
																1クール	21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	.	.	.	.	.	15	.	21										
生理食塩液	20mL	フラッシュ	フラッシュ	↓							15		21									
生理食塩液	100mL	中心静脈	メイン	↓																		
オブジーボ点滴静注	360mg/body	中心静脈	30分	↓																		
ブドウ糖液5％	500mL	中心静脈	メイン	↓																		
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	中心静脈	30分	↓																		
デキサート注射液	6.6mg	中心静脈	30分	↓																		
オキサリプラチン点滴静注液	130mg/m ²	中心静脈	2時間	↓																		
ヘパリンナトリウムロック用	10単位	ロック	ロック	↓																		
カペシタビン	備考参照	内服	朝夕食後	day1夕～day15朝服用																		

備考：カペシタビン 1000mg/m²/回（2000mg/m²/日） 1日2回

レジメン名	GC:胃癌CapeOX+NIVO（末梢）													更新日		2022/5/11					
														1クール		21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	.	.	.	.	15	.	21									
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																	
オブジーボ点滴静注	360mg/body	点滴末梢	30分	↓																	
生理食塩液	100mL																				
ブドウ糖液 5%	500mL	点滴末梢	メイン	↓																	
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL																				
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	30分	↓																	
ポララミン注	5mg																				
オキサリプラチン点滴静注液	130mg/m ²																				
デキサート注射液	1.65mg	点滴末梢	2時間	↓																	
ブドウ糖液 5%	250ml																				
カペシタビン	備考参照	内服	朝夕食後	day1夕～day15朝服用																	

備考：カペシタビン 1000mg/m²/回（2000mg/m²/日） 1日2回

胃

レジメン名	FOLFOX 6 胃癌（リザーバー）																	更新日	2020/3/19			
																		1クール	14日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	・	14																
生理食塩液	20mL	フラッシュ	フラッシュ	↓			14															
ブドウ糖液 5 %	100mL	中心静脈	メイン	↓																		
パロノセトロン点滴静注	0.75mg	中心静脈	15 分	↓																		
デキサート注射液	6.6mg																					
ポララミン注	5mg																					
レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	中心静脈	2時間	↓																		
ブドウ糖液 5 %	250ml																					
オキサリプラチン点滴静注液	85mg/m ²	中心静脈	2時間	↓																		
ブドウ糖液 5 %	250ml																					
フルオロウラシル注	400mg/m ²	中心静脈	15分	↓																		
生理食塩液	50ml																					
フルオロウラシル注	2400mg/m ²	中心静脈	46時間	↓																		
ヘパリンナトリウム注射液	5000単位																					
生理食塩液	適宜調整																					

備考：レボホリナートとオキサリプラチンは同時に開始。

胃

レジメン名	GC:mFOLFOX 6 +NIVO 胃癌（リザーバー）																更新日	2022/7/27
																	1クール	14日間
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日														
				1	.	14												
生理食塩液	20mL	フラッシュ	フラッシュ	↓														
生理食塩液	100mL	中心静脈	メイン	↓														
オプジーボ点滴静注	240mg/body	中心静脈	30分	↓														
生理食塩液	100mL																	
ブドウ糖液5%	100mL	中心静脈	メイン	↓														
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL																	
デキサート注射液	6.6mg	中心静脈	15分	↓														
ポララミン注	5mg																	
レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	中心静脈	2時間	↓														
ブドウ糖液5%	250ml																	
オキサリプラチン点滴静注液	85mg/m ²	中心静脈	2時間	↓														
ブドウ糖液5%	250ml																	
フルオロウラシル注	400mg/m ²	中心静脈	15分	↓														
生理食塩液	50ml																	
フルオロウラシル注	2400mg/m ²																	
ヘパリンナトリウム注射液	5000単位	中心静脈	46時間	↓														
生理食塩液	適宜調整																	

備考：レボホリナートとオキサリプラチンは同時に開始。

胃

レジメン名	TS-1+TXT(DOC)																更新日	2020/3/19									
																	1クール	21日間									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																							
				1	.	.	.	.	.	15	.	21															
ブドウ糖液 5 %	250mL	点滴末梢	メイン	↓							15		21														
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																							
ドセタキセル点滴静注 ブドウ糖液 5 %	40mg/m ² 250ml	点滴末梢	1時間	↓																							
S-1	備考参照	内服	朝夕食後	day1夕～day15朝服用																							

備考：S-1 体表面積<1.25m² 80mg/日、1.25～1.5未満 100mg/日、1.5≦120mg/日

胃

レジメン名	GC：Trastuzumab＋SP併用療法																更新日	2023/10/13			
																	1クール	21日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	2	3	.	.	.	15	.	21									
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																	
ラクテック注	500ml	点滴末梢	メイン		↓	↓															
ソルデム3 A 輸液	500ml	点滴末梢	1時間	↓																	
硫酸M g 補正液	8mEq																				
パロノセトロン点滴静注	0.75mg	点滴末梢	30 分	↓																	
アロカリス点滴静注	235mg																				
デキサート注射液	9.9mg																				
生理食塩液	50ml	点滴末梢	15 分		↓	↓															
デキサート注射液	6.6mg																				
トラスツズマブBS点滴静注用	8mg/kg	点滴末梢	1時間30	↓																	
生理食塩液	(2回目以降 6mg/kg) 250ml		分(2回目 以降30 ～45分)																		
20%マンニトール注射液	200ml	点滴末梢	30分	↓																	
シスプラチン点滴静注液	60mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																	
生理食塩液	500ml																				
ソルデム3 A 輸液	500ml	点滴末梢		×2	×2	×2															
S-1	備考参照	内服	朝夕食後	day1 夕～day15 朝服用																	

備考：S-1 体表面積<1.25m² 80mg/日、1.25～1.5未満 100mg/日、1.5≤120mg/日

胃

レジメン名	GC：Trastuzumab＋XP併用療法																更新日	2023/10/13			
																	1クール	21日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	2	3	.	.	.	15	.	21									
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																	
ラクテック注	500ml	点滴末梢	メイン		↓	↓															
ソルデム3 A 輸液	500ml	点滴末梢	1時間	↓																	
硫酸M g 補正液	8mEq																				
パロノセトロン点滴静注	0.75mg	点滴末梢	30 分	↓																	
アロカリス点滴静注	235mg																				
デキサート注射液	9.9mg																				
生理食塩液	50ml	点滴末梢	15 分		↓	↓															
デキサート注射液	6.6mg																				
トラスツズマブBS点滴静注用	8mg/kg	点滴末梢	1時間30	↓																	
生理食塩液	(2回目以降 6mg/kg) 250ml		分(2回目 以降30 ～45分)																		
20%マンニトール注射液	200ml	点滴末梢	30分	↓																	
シスプラチン点滴静注液	60mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																	
生理食塩液	500ml																				
ソルデム3 A 輸液	500ml	点滴末梢		×2	×2	×2															
カペシタビン	備考参照	内服	朝夕食後	day1 夕～day15 朝服用																	

備考：カペシタビン 1000mg/m²/回 (2000mg/m²/日) 1日2回

胃

レジメン名	エンハーツ(アロカリス使用)																	更新日	2023/10/13				
																		1クール	21日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	・	21																	
ブドウ糖液 5 %	100mL	点滴末梢	メイン	↓																			
パロノセトロン点滴静注	0.75mg	点滴末梢	30分	↓																			
アロカリス点滴静注	235mg																						
デキサート注射液	9.9mg																						
エンハーツ点滴静注用 注射用水	6.4mg/kg 20mL	点滴末梢	30～90分	↓																			
ブドウ糖液 5 %	100ml																						
備考：																							

胃

レジメン名	XELOX+Trastuzumab療法														更新日		2021/11/24									
															1クール		21日間									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																						
				1	.	.	.	.	.	15	.	21														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓								15		21												
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																						
デキサート注射液	6.6mg																									
ポララミン注	5mg																									
トラスツズマブBS点滴静注用生理食塩液	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg) 250ml	点滴末梢	1時間30分(2回目以降30～45分)	↓																						
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	メイン	↓																						
オキサリプラチン点滴静注液	130mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																						
デキサート注射液	1.65mg																									
ブドウ糖液5%	250ml																									
カペシタビン	備考参照	内服	朝夕食後	day1夕～day15朝服用																						
備考：カペシタビン 1000mg/m ² /回（2000mg/m ² /日） 1日2回																										

胃

レジメン名	SOX＋Trastuzumab療法													更新日	2023/2/21										
														1クール	21日間										
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																					
				1	.	.	.	.	.	15	.	21													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓							15		21												
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓																					
デキサート注射液	6.6mg																								
ポララミン注	5mg																								
トラスツズマブBS点滴静注用 注射用水	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg)	点滴末梢	1時間30 分(2回目 以降30 ～45分)	↓																					
生理食塩液	20mL																								
	250ml																								
ブドウ糖液 5 %	250mL	点滴末梢	メイン	↓																					
オキサリプラチン点滴静注液	130mg/㎡	点滴末梢	2時間	↓																					
デキサート注射液	1.65mg																								
ブドウ糖液 5 %	250ml																								
S-1	備考参照	内服	朝夕食後	day1夕～day15朝服用																					

備考：S-1 体表面積<1.25㎡ 80mg/日、1.25～1.5未満 100mg/日、1.5≤120mg/日

胃

レジメン名	FOLFOX 6 胃癌（末梢）																	更新日	2020/3/19
																		1クール	14日間
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	・	14												
ブドウ糖液 5 %	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓														
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液 ポララミン注	0.75mg 6.6mg 5mg	点滴末梢	15 分	↓															
レボホリナート点滴静注用 ブドウ糖液 5 %	200mg/m ² 250mL	点滴末梢	2時間	↓															
オキサリプラチン点滴静注液 デキサート注射液 ブドウ糖液 5 %	85mg/m ² 1.65mg 250ml	点滴末梢	2時間	↓															
フルオロウラシル注 生理食塩液	400mg/m ² 50ml	点滴末梢	15分	↓															
フルオロウラシル注 生理食塩液	1200mg/m ² 500mL	点滴末梢	23時間	↓	↓														

備考：レボホリナートとオキサリプラチンは同時に開始。

胃

レジメン名	GC:mFOLFOX 6 +NIVO 胃癌（末梢）																更新日	2022/7/27
																	1クール	14日間
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日														
				1	2	・	14											
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓														
オプジーボ点滴静注	240mg/body	点滴末梢	30分	↓														
生理食塩液	100mL	点滴末梢																
ブドウ糖液 5 %	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓													
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	15 分	↓														
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢																
ポララミン注	5mg	点滴末梢																
レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓														
ブドウ糖液 5 %	250mL	点滴末梢																
オキサリプラチン点滴静注液	85mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓														
デキサート注射液	1.65mg	点滴末梢																
ブドウ糖液 5 %	250ml	点滴末梢																
フルオロウラシル注	400mg/m ²	点滴末梢	15分	↓														
生理食塩液	50ml	点滴末梢																
フルオロウラシル注	1200mg/m ²	点滴末梢	23時間	↓	↓													
生理食塩液	500mL	点滴末梢																

備考：レボホリナートとオキサリプラチンは同時に開始。

胃

レジメン名	GC : NIVO (240mg/body:2週間毎)																	更新日	2020/3/13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																		1クール	14日間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				1	・	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

備考：

レジメン名	GC : NIVO (480mg/body:4週間毎)																	更新日	2021/3/23	
																		1クール	28日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	28														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	点滴末梢	↓																
オプジーボ点滴静注	480mg/body	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			

備考：

胃

レジメン名	Zolbe(初回)+CapeOX(末梢)															更新日	2025/3/26							
																1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																				
				1	.	.	.	.	.	15	.	21												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓							15		21											
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																				
アロカリス点滴静注	235mg																							
デキサート注射液	9.9mg																							
ガスター注射液	20mg																							
ポララミン注	5mg																							
ビロイ点滴静注用	800mg/m ²	点滴末梢	指示通り	↓																				
生理食塩液	適宜調整																							
ブドウ糖液5%	500mL	点滴末梢	メイン	↓																				
オキサリプラチン点滴静注液	130mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																				
デキサート注射液	1.65mg																							
ブドウ糖液5%	250ml																							
カペシタビン	備考参照	内服	朝夕食後	day1夕～day15朝服用																				
備考：カペシタビン 1000mg/m ² /回（2000mg/m ² /日） 1日2回																								

胃

[illegible]備考：カペシタビン 1000mg/m²/回（2000mg/m²/日） 1日2回

胃

[illegible]備考：カペシタビン 1000mg/m²/回（2000mg/m²/日） 1日2回

胃

レジメン名	Zolbe(2回目以降)+CapeOX(リザーバー)																更新日	2025/3/26								
																	1クール	21日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																						
				1	.	.	.	.	.	15	.	21														
生理食塩液	20mL	フラッシュ	フラッシュ	↓																						
生理食塩液	250mL	中心静脈	メイン	↓																						
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	中心静脈	30分	↓																						
アロカリス点滴静注	235mg																									
デキサート注射液	9.9mg																									
ガスター注射液	20mg																									
ポラミン注	5mg																									
ビロイ点滴静注用	600mg/m ²	中心静脈	指示通り	↓																						
生理食塩液	適宜調整																									
ブドウ糖液5%	250mL	中心静脈	メイン	↓																						
オキサリプラチン点滴静注液	130mg/m ²	中心静脈	2時間	↓																						
ブドウ糖液 5 %	250ml																									
ヘパリンナトリウムロック用	10単位	ロック	ロック	↓																						
カペシタビン	備考参照	内服	朝夕食後	day1夕～day15朝服用																						

備考：カペシタビン 1000mg/m²/回（2000mg/m²/日） 1日2回

胃

[illegible]

備考：レボホリナートとオキサリプラチンは同時に開始。

胃

[illegible]

備考：レボホリナートとオキサリプラチンは同時に開始。

胃

レジメン名	Zolbe(初回)+mFOLFOX6（リザーバー）																更新日	2025/3/26
																	1クール	14日間
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日														
				1	・	14												
生理食塩液	20mL	フラッシュ	フラッシュ	↓														
生理食塩液	250mL	中心静脈	メイン	↓														
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	中心静脈	30分	↓														
アロカリス点滴静注	235mg																	
デキサート注射液	9.9mg																	
ガスター注射液	20mg																	
ポララミン注	5mg																	
ビロイ点滴静注用	800mg/m ²	中心静脈	指示通り	↓														
生理食塩液	適宜調整																	
ブドウ糖液5%	500mL	中心静脈	メイン	↓														
レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	中心静脈	2時間	↓														
ブドウ糖液5%	250mL																	
オキサリプラチン点滴静注液	85mg/m ²	中心静脈	2時間	↓														
ブドウ糖液5%	250ml																	
フルオロウラシル注	400mg/m ²	中心静脈	15分	↓														
生理食塩液	50ml																	
フルオロウラシル注	2400mg/m ²	中心静脈	46時間	↓														
ヘパリンナトリウム注射液	5000単位																	
生理食塩液	適宜調整																	

備考：レボホリナートとオキサリプラチンは同時に開始。

胃

レジメン名	Zolbe(2回目以降)+mFOLFOX6（リザーバー）														更新日	2025/3/26						
															1クール	14日間						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	.	14																
生理食塩液	20mL	フラッシュ	フラッシュ	↓			14															
生理食塩液	250mL	中心静脈	メイン	↓																		
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	中心静脈	30分	↓																		
アロカリス点滴静注	235mg																					
デキサート注射液	9.9mg																					
ガスター注射液	20mg																					
ポララミン注	5mg																					
ビロイ点滴静注用	400mg/m ²	中心静脈	指示通り	↓																		
生理食塩液	適宜調整																					
ブドウ糖液5%	500mL	中心静脈	メイン	↓																		
レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	中心静脈	2時間	↓																		
ブドウ糖液5%	250mL																					
オキサリプラチン点滴静注液	85mg/m ²	中心静脈	2時間	↓																		
ブドウ糖液5%	250ml																					
フルオロウラシル注	400mg/m ²	中心静脈	15分	↓																		
生理食塩液	50ml																					
フルオロウラシル注	2400mg/m ²	中心静脈	46時間	↓																		
ヘパリンナトリウム注射液	5000単位																					
生理食塩液	適宜調整																					

備考：レボホリナートとオキサリプラチンは同時に開始。