

胃

レジメン名	術前G-SOX													更新日	2020/3/19							
														1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	15	.	21										
ブドウ糖液5%	500mL	点滴末梢	メイン	↓																		
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液 ポララミン注	3mg/100mL 6.6mg 5mg	点滴末梢	30分	↓																		
オキサリプラチン点滴静注液 デキサート注射液 ブドウ糖液5%	130mg/m ² 1.65mg 250ml	点滴末梢	2時間	↓																		
S-1	備考参照	内服	朝夕食後	day1夕～day15朝服用																		

備考：S-1 体表面積<1.25m² 80mg/日、1.25～1.5未満 100mg/日、1.5≦120mg/日
術前2～3コースまで

胃

レジメン名	GC : RAM+nabPTX													更新日	2020/3/19				
														1クール	28日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	8	.	15	.	28									
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓											
グラニセトロン点滴静注バッグ デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓		↓		↓											
サイラムザ点滴静注液 生理食塩液	8mg/kg 250ml	点滴末梢	1時間	↓				↓											
アブラキサン点滴静注用 生理食塩液	100mg/m ² 100ml	点滴末梢	30分	↓		↓		↓											

備考：サイラムザ投与日は前投薬として抗ヒスタミン剤を使用（経口薬も可）

レジメン名	GC ; RAM+PTX療法													更新日	2020/3/19				
														1クール	28日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	8	.	15	.	28									
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓											
グラニセトロン点滴静注バッグ デキサート注射液 ガスター注射液	1mg/50mL 6.6mg 20mg	点滴末梢	15分	↓		↓		↓											
サイラムザ点滴静注液 生理食塩液	8mg/kg 250ml	点滴末梢	1時間	↓				↓											
パクリタキセル注 生理食塩液	80mg/m ² 250ml	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓											
レスタミンコーワ	50mg	内服	投与前	↓		↓		↓											

備考：

胃

レジメン名	GC ; RAM単剤療法			更新日															
				1クール	2020/3/19 14日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	14													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓															
サイラムザ点滴静注液	8mg/kg	点滴末梢	1時間	↓															
生理食塩液	250ml																		

備考：サイラムザ投与日は前投薬として抗ヒスタミン剤を使用（経口薬も可）

レジメン名	GC : Weekly nabPTX			更新日															
				1クール	2020/3/19 28日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	8	.	15	.	28									
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓											
生理食塩液	100mL																		
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分	↓		↓		↓											
アブラキサン点滴静注用	100mg/m ²	点滴末梢	30分	↓		↓		↓											
生理食塩液	100ml																		

備考：

胃

レジメン名	GC:胃癌XELOX (リザーバー)										更新日	2020/3/19								
											1クール	21日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	15	.	21								
生理食塩液	20mL	フラッシュ	フラッシュ	↓																
ブドウ糖液5%	100mL	中心静脈	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液 ポララミン注	3mg/100mL 6.6mg 5mg	中心静脈	30分	↓																
オキサリプラチン点滴静注液 ブドウ糖液5%	130mg/m ² 250ml	中心静脈	2時間	↓																
ヘパリンナトリウムロック用 カペシタビン	10単位 備考参照	ロック 内服	ロック 朝夕食後	↓	day1夕～day15朝服用															

備考：カペシタビン 1000mg/m²/回 (2000mg/m²/日) 1日2回

レジメン名	GC:胃癌XELOX (末梢)										更新日	2020/3/19								
											1クール	21日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	15	.	21								
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液 ポララミン注	3mg/100mL 6.6mg 5mg	点滴末梢	30分	↓																
オキサリプラチン点滴静注液 デキサート注射液 ブドウ糖液5%	130mg/m ² 1.65mg 250ml	点滴末梢	2時間	↓																
カペシタビン	備考参照	内服	朝夕食後	↓	day1夕～day15朝服用															

備考：カペシタビン 1000mg/m²/回 (2000mg/m²/日) 1日2回

胃

レジメン名	FOLFOX 6 胃癌（リザーバー）													更新日	2020/3/19				
														1クール	14日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	14													
生理食塩液	20mL	フラッシュ	フラッシュ	↓															
ブドウ糖液 5%	100mL	中心静脈	メイン	↓															
パロノセトロン点滴静注	0.75mg	中心静脈	15分	↓															
デキサート注射液	6.6mg																		
ポララミン注	5mg																		
レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	中心静脈	2時間	↓															
ブドウ糖液 5%	250ml																		
オキサリプラチン点滴静注液	85mg/m ²	中心静脈	2時間	↓															
ブドウ糖液 5%	250ml																		
フルオロウラシル注	400mg/m ²	中心静脈	15分	↓															
生理食塩液	50ml																		
フルオロウラシル注	2400mg/m ²	中心静脈	46時間	↓															
ヘパリンナトリウム注射液	5000単位																		
生理食塩液	適宜調整																		

備考：レボホリナートとオキサリプラチンは同時に開始。

胃

レジメン名	GC:mFOLFOX 6 +NIVO 胃癌（リザーバー）				更新日	2022/7/27													
					1クール	14日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	14													
生理食塩液	20mL	フラッシュ	フラッシュ	↓															
生理食塩液	100mL	中心静脈	メイン	↓															
オブジーボ点滴静注	240mg/body	中心静脈	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		
ブドウ糖液5%	100mL	中心静脈	メイン	↓															
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	中心静脈	15分	↓															
デキサート注射液	6.6mg																		
ポララミン注	5mg																		
レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	中心静脈	2時間	↓															
ブドウ糖液5%	250ml																		
オキサリプラチン点滴静注液	85mg/m ²	中心静脈	2時間	↓															
ブドウ糖液5%	250ml																		
フルオロウラシル注	400mg/m ²	中心静脈	15分	↓															
生理食塩液	50ml																		
フルオロウラシル注	2400mg/m ²	中心静脈	46時間	↓															
ヘパリンナトリウム注射液	5000単位																		
生理食塩液	適宜調整																		

備考：レボホリナートとオキサリプラチンは同時に開始。

胃

レジメン名	TS-1+TXT(DOC)										更新日	2020/3/19									
											1クール	21日間									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	15	.	21									
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	メイン	↓																	
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓																	
ドセタキセル点滴静注 ブドウ糖液5%	40mg/m ² 250ml	点滴末梢	1時間	↓																	
S-1	備考参照	内服	朝夕食後	day1夕～day15朝服用																	

備考：S-1 体表面積<1.25m² 80mg/日、1.25～1.5未満 100mg/日、1.5≤120mg/日

胃

レジメン名	エンハーツ(アロカリス使用)				更新日	2023/10/13															
					1クール	21日間															
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	21															
ブドウ糖液 5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓																	
パロノセトロン点滴静注 アロカリス点滴静注 デキサート注射液	0.75mg 235mg 9.9mg	点滴末梢	30分	↓																	
エンハーツ点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液 5%	6.4mg/kg 20mL 100ml	点滴末梢	30~90分	↓																	

備考：

胃

レジメン名	SOX+Trastuzumab療法													更新日	2023/2/21							
														1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	15	.	21										
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																		
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液 ポララミン注	3mg/100mL 6.6mg 5mg	点滴末梢	30分	↓																		
トラスツズマブBS点滴静注用 注射用水 生理食塩液	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg) 20mL 250ml	点滴末梢	1時間30分(2回目以降30~45分)	↓																		
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	メイン	↓																		
オキサリプラチン点滴静注液 デキサート注射液 ブドウ糖液5%	130mg/m ² 1.65mg 250ml	点滴末梢	2時間	↓																		
S-1	備考参照	内服	朝夕食後		day1夕~day15朝服用																	

備考：S-1 体表面積<1.25m² 80mg/日、1.25~1.5未満 100mg/日、1.5≤120mg/日

胃

レジメン名	GC:mFOLFOX 6 +NIVO 胃癌（末梢）			更新日	2022/7/27														
				1クール	14日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	・	14												
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
オプジーボ点滴静注	240mg/body	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL	点滴末梢																	
ブドウ糖液5%	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓														
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL																		
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分	↓															
ポララミン注	5mg																		
レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓															
ブドウ糖液5%	250mL																		
オキサリプラチン点滴静注液	85mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓															
デキサート注射液	1.65mg																		
ブドウ糖液5%	250ml																		
フルオロウラシル注	400mg/m ²	点滴末梢	15分	↓															
生理食塩液	50ml																		
フルオロウラシル注	1200mg/m ²	点滴末梢	23時間	↓	↓														
生理食塩液	500mL																		

備考：レボホリナートとオキサリプラチンは同時に開始。

胃

レジメン名	GC : NIVO (240mg/body:2週間毎)			更新日	2020/3/13														
				1クール	14日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	14													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓															
オプジーボ点滴静注	240mg/body	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		

備考：

レジメン名	GC : NIVO (480mg/body:4週間毎)			更新日	2021/3/23														
				1クール	28日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	28													
生理食塩液	100mL	点滴末梢	点滴末梢	↓															
オプジーボ点滴静注	480mg/body	点滴末梢	30分	↓															
生理食塩液	100mL																		

備考：

胃

レジメン名	Zolbe(初回)+CapeOX(リザーバー)													更新日	2025/3/26								
														1クール	21日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	15	.	21										
生理食塩液	20mL	フラッシュ	フラッシュ	↓																			
生理食塩液	250mL	中心静脈	メイン	↓																			
パロノセトロン点滴静注 アロカリス点滴静注 デキサート注射液 ガスター注射液 ポララミン注	0.75mg/50mL 235mg 9.9mg 20mg 5mg	中心静脈	30分	↓																			
ビロイ点滴静注用 生理食塩液	800mg/m ² 適宜調整			中心静脈	指示通り	↓																	
ブドウ糖液5%	250mL			中心静脈	メイン	↓																	
オキサリプラチン点滴静注液 ブドウ糖液5%	130mg/m ² 250ml			中心静脈	2時間	↓																	
ヘパリンナトリウムロック用 カペシタビン	10単位 備考参照			ロック 内服	ロック 朝夕食後	↓	day1夕～day15朝服用																

備考：カペシタビン 1000mg/m²/回 (2000mg/m²/日) 1日2回

胃

レジメン名	Zolbe(2回目以降)+CapeOX(リザーバー)													更新日	2025/3/26							
														1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	15	.	21										
生理食塩液	20mL	フラッシュ	フラッシュ	↓																		
生理食塩液	250mL	中心静脈	メイン	↓																		
パロノセトロン点滴静注 アロカリス点滴静注 デキサート注射液 ガスター注射液 ポララミン注	0.75mg/50mL 235mg 9.9mg 20mg 5mg	中心静脈	30分	↓																		
ビロイ点滴静注用 生理食塩液	600mg/m ² 適宜調整			中心静脈	指示通り	↓																
ブドウ糖液5%	250mL	中心静脈	メイン	↓																		
オキサリプラチン点滴静注液 ブドウ糖液5%	130mg/m ² 250ml	中心静脈	2時間	↓																		
ヘパリンナトリウムロック用	10単位	ロック	ロック	↓																		
カペシタビン	備考参照	内服	朝夕食後		day1夕～day15朝服用																	

備考：カペシタビン 1000mg/m²/回 (2000mg/m²/日) 1日2回

胃

レジメン名	Zolbe(初回)+mFOLFOX6 (末梢)			更新日	2025/3/26																		
				1クール	14日間																		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	2	・	14																
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																			
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分	↓																			
アロカリス点滴静注	235mg																						
デキサート注射液	9.9mg																						
ガスター注射液	20mg																						
ポララミン注	5mg																						
ビロイ点滴静注用	800mg/m ²	点滴末梢	指示通り	↓																			
生理食塩液	適宜調整																						
ブドウ糖液5%	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓																		
レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																			
ブドウ糖液5%	250mL																						
オキサリプラチン点滴静注液	85mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																			
ブドウ糖液5%	250ml																						
フルオロウラシル注	400mg/m ²	点滴末梢	15分	↓																			
生理食塩液	50ml																						
フルオロウラシル注	1200mg/m ²	点滴末梢	23時間	↓	↓																		
生理食塩液	500mL																						

備考：レボホリナートとオキサリプラチンは同時に開始。

胃

レジメン名	Zolbe(2回目以降)+mFOLFOX6 (末梢)													更新日	2025/3/26				
														1クール	14日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	・	14												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓															
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	30分	↓															
アロカリス点滴静注	235mg																		
デキサート注射液	9.9mg																		
ガスター注射液	20mg																		
ポララミン注	5mg																		
ビロイ点滴静注用	400mg/m ²	点滴末梢	指示通り	↓															
生理食塩液	適宜調整																		
ブドウ糖液5%	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓														
レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓															
ブドウ糖液5%	250mL																		
オキサリプラチン点滴静注液	85mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓															
ブドウ糖液5%	250ml																		
フルオロウラシル注	400mg/m ²	点滴末梢	15分	↓															
生理食塩液	50ml																		
フルオロウラシル注	1200mg/m ²	点滴末梢	23時間	↓	↓														
生理食塩液	500mL																		

備考：レボホリナートとオキサリプラチンは同時に開始。

胃

レジメン名	Zolbe(初回)+mFOLFOX6 (リザーバー)			更新日	2025/3/26														
				1クール	14日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	14													
生理食塩液	20mL	フラッシュ	フラッシュ	↓															
生理食塩液	250mL	中心静脈	メイン	↓															
パロノセトロン点滴静注 アロカリス点滴静注 デキサート注射液 ガスター注射液 ポララミン注	0.75mg/50mL 235mg 9.9mg 20mg 5mg	中心静脈	30分	↓															
ビロイ点滴静注用 生理食塩液	800mg/m ² 適宜調整			中心静脈	指示通り	↓													
ブドウ糖液5%	500mL	中心静脈	メイン	↓															
レボホリナート点滴静注用 ブドウ糖液5%	200mg/m ² 250mL	中心静脈	2時間	↓															
オキサリプラチン点滴静注液 ブドウ糖液5%	85mg/m ² 250ml	中心静脈	2時間	↓															
フルオロウラシル注 生理食塩液	400mg/m ² 50ml	中心静脈	15分	↓															
フルオロウラシル注 ヘパリンナトリウム注射液 生理食塩液	2400mg/m ² 5000単位 適宜調整	中心静脈	46時間	↓															

備考：レボホリナートとオキサリプラチンは同時に開始。

胃

レジメン名	Zolbe(2回目以降)+mFOLFOX6 (リザーバー)			更新日	2025/3/26														
				1クール	14日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	14													
生理食塩液	20mL	フラッシュ	フラッシュ	↓															
生理食塩液	250mL	中心静脈	メイン	↓															
パロノセトロン点滴静注 アロカリス点滴静注 デキサート注射液 ガスター注射液 ポララミン注	0.75mg/50mL 235mg 9.9mg 20mg 5mg	中心静脈	30分	↓															
ビロイ点滴静注用 生理食塩液	400mg/m ² 適宜調整			中心静脈	指示通り	↓													
ブドウ糖液5%	500mL	中心静脈	メイン	↓															
レボホリナート点滴静注用 ブドウ糖液5%	200mg/m ² 250mL	中心静脈	2時間	↓															
オキサリプラチン点滴静注液 ブドウ糖液5%	85mg/m ² 250ml	中心静脈	2時間	↓															
フルオロウラシル注 生理食塩液	400mg/m ² 50ml	中心静脈	15分	↓															
フルオロウラシル注 ヘパリンナトリウム注射液 生理食塩液	2400mg/m ² 5000単位 適宜調整	中心静脈	46時間	↓															

備考：レボホリナートとオキサリプラチンは同時に開始。

胃

レジメン名	GC:胃癌CapeOX+Trastuzumab+Pembro (リザーバー)			更新日	2025/7/11																	
				1クール	21日間																	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	15	.	21										
生理食塩液	20mL	フラッシュ	フラッシュ	↓																		
生理食塩液	250mL	中心静脈	メイン	↓																		
キイトルーダ点滴静注	200mg/body	中心静脈	30分	↓																		
生理食塩液	100mL																					
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	中心静脈	30分	↓																		
デキサート注射液	9.9mg																					
ポララミン注	5mg																					
トラスツズマブBS点滴静注用 注射用水	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg)	中心静脈	1時間30分(2回目 以降30 ~45分)	↓																		
生理食塩液	20mL 250ml																					
ブドウ糖液5%	250mL	中心静脈	メイン	↓																		
オキサリプラチン点滴静注液 ブドウ糖液5%	130mg/m ² 250ml	中心静脈	2時間	↓																		
ヘパリンナトリウムロック用	10単位	ロック	ロック	↓																		
カペシタビン	備考参照	内服	朝夕食後		day1夕~day15朝服用																	

備考：カペシタビン 1000mg/m²/回 (2000mg/m²/日) 1日2回

