

肝臓

レジメン名	RAM単剤療法			更新日																
				1クール	2022/5/11 14日間															
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	14														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
サイラムザ点滴静注液 生理食塩液	8mg/kg 250mL	点滴末梢	1時間 以上	↓																

備考：前投薬として抗ヒスタミン剤使用。初回60分、2回目以降30分に短縮可能。

レジメン名	BEV+Atezo療法			更新日																
				1クール	2020/10/12 21日間															
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	21														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
テセントリク点滴静注液 生理食塩液	1200mg 250mL	点滴末梢	30~60分	↓																
アバスチン点滴静注用 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴末梢	30~90分	↓																

備考：

肝臓

レジメン名	HCC : Durvalumab 【維持療法】 (>30kg)				更新日	2024/2/5											
					1クール	28日間											
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日													
				1	.	28											
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓													
イミフィンジ点滴静注	1500mg	点滴末梢	1時間	↓													
生理食塩液	100mL																

備考：イジユドは初回（1回）だけ併用。イジユド+イミフィンジ（初回）1コース施行後、イミフィンジ（維持療法）へ移行。

レジメン名	HCC : Durvalumab 【維持療法】 (30kg以下)				更新日	2024/2/5											
					1クール	28日間											
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日													
				1	.	28											
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓													
イミフィンジ点滴静注	20mg/kg	点滴末梢	1時間	↓													
生理食塩液	100mL																

備考：イジユドは初回（1回）だけ併用。イジユド+イミフィンジ（初回）1コース施行後、イミフィンジ（維持療法）へ移行。

