

# 胆道

レジメン名	GCS療法			投与日														更新日	2025/3/24	
																		1クール	14日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	1	.	8	.	14												
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	メイン	↓																
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓																
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	25mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	1時間 30分	↓																
ゲムシタビン点滴静注用 ブドウ糖液5%	1000mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴末梢	30分	↓																
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間 30分	↓																
S-1	40-60mg/回	内服	1日2回	day 1-7																

備考：

レジメン名	GEM+CDDP			投与日														更新日	2025/3/24	
																		1クール	21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	1	.	8	.	21												
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓		↓														
シスプラチン点滴静注液 生理食塩液	25mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢	1時間 30分	↓		↓														
ゲムシタビン点滴静注用 ブドウ糖液5%	1000mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓														
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間 30分	↓		↓														

備考：

# 胆道

レジメン名	S1+GEM1000 2週1休													更新日	2025/3/24							
														1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	・	8	・	14	・	21												
ソルデム3A輸液	200mL	点滴末梢	2時間	↓		↓																
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	15分	↓		↓																
ゲムシタビン点滴静注用 ブドウ糖液5%	1000mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓																
S-1	60mg/m <sup>2</sup>	内服		day1-14																		

備考：



# 胆道

レジメン名	胆道癌 GC+Pembro(3週毎)				更新日															
					1クール	2026/3/11	21日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	8	.	21												
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100ml	点滴末梢																		
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	点滴末梢	15分	↓		↓														
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢																		
シスプラチン点滴静注液	25mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	1時間	↓		↓														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	30分																	
ゲムシタビン点滴静注用	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	30分	↓		↓														
ブドウ糖液5%	100mL	点滴末梢																		
ソルデム3A輸液	500mL	点滴末梢	1時間 30分	↓		↓														

備考：最大8コース実施後、維持療法レジメン(G+Pembro or Pembro)へ

# 胆道

レジメン名	胆道癌 G+Pembro(維持療法)(3週毎)													更新日						
														1クール	2026/3/11 21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	21												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
キイトルーダ点滴静注	200mg	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100ml	点滴末梢																		
ソルデム3A輸液	200mL	点滴末梢	メイン			↓														
生理食塩液	50mL	点滴末梢		↓																
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分			↓														
ゲムシタビン点滴静注用 ブドウ糖液5%	1000mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓														

備考：GC+Pembro実施後の維持療法レジメン

レジメン名	胆道癌 Pembro(維持療法)(6週毎)													更新日						
														1クール	2026/3/11 42日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	42														
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓																
キイトルーダ点滴静注	400mg	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100ml																			

備考：GC+Pembro実施後の維持療法レジメン