

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM DLd-1																更新日	2020/3/18	
																	1クール	28日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	8	・	15	・	22	・	28							
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓									
ソル・コーテフ注射用 生理食塩液	300mg 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓		↓									
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 1L	点滴末梢	指示通り	↓															
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り			↓		↓		↓									
レブラミドカプセル	～25mg	内服		day1～21															

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日及び翌日に内服。
喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM DLd-2														更新日	2020/3/25				
															1クール	28日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	15	・	22	・	28								
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓										
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓		↓		↓		↓										
レブラミドカプセル	～25mg	内服		day1～21																

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日及び翌日に内服。
喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM DLd-3～6												更新日	2020/3/25					
													1クール	28日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	15	.	.	.	22	.	28							
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓													
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓		↓													
レブラミドカプセル	～25mg	内服		day1～21															

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日及び翌日に内服。
喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM DLd-7～																更新日	2020/3/18													
																	1クール	28日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																											
				1	.	.	.	.	.	22	.	28																			
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓								22			28																
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓																											
レブラミドカプセル	～25mg	内服		day1～21																											

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日及び翌日に内服。
喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名		MM DLd-1～2(SC)												更新日	2021/6/15
														1クール	28日間
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日											
				1	.	8	.	15	.	22	.	28			
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3～5分	↓		↓		↓		↓					
レブラミドカプセル	～25mg	内服		day1～21											

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日及び翌日に内服。
喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名		MM DLd-3～6(SC)												更新日	2021/6/15
														1クール	28日間
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日											
				1	.	.	15	.	.	22	.	28			
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3～5分	↓			↓								
レブラミドカプセル	～25mg	内服		day1～21											

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日及び翌日に内服。
喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名		MM DLd-7～(SC)												更新日	2021/6/15
														1クール	28日間
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日											
				1	.	.	.	.	.	22	.	28			
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3～5分	↓											
レブラミドカプセル	～25mg	内服		day1～21											

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日及び翌日に内服。
喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名		MM DBd-1																		更新日	2020/3/18		
																				1クール	21日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	.	4	.	8	.	11	.	15	.	21									
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓			4		↓			11		↓									
ソル・コーテフ注射用 生理食塩液	300mg 50mL	点滴末梢	15分	↓				↓						↓									
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 1L	点滴末梢	指示通り	↓																			
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り					↓						↓									
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓		↓		↓		↓													

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日・ベルケイド投与日及び翌日に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM DBd-2～3																更新日	2020/3/18		
																	1クール	21日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	4	・	8	・	11	・	15	・	21						
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓				↓				↓								
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓				↓				↓								
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓		↓		↓		↓										

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日・ベルケイド投与日及び翌日に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM DBd-4～8																更新日	2020/3/18		
																	1クール	21日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	4	・	8	・	11	・	21								
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓																
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓		↓		↓		↓										

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日・ベルケイド投与日及び翌日に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM DBd-9～																更新日	2020/3/18	
																	1クール	28日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	28													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓															
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓															

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日と翌日に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM DBd-1～3(SC)																更新日	2021/6/15			
																	1クール	21日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	4	・	8	・	11	・	15	・	21							
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3～5分	↓				↓				↓									
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓		↓		↓		↓											

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日・ベルケイド投与日及び翌日に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM DBd-4～8(SC)																更新日	2021/6/15		
																	1クール	21日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	4	・	8	・	11	・	21								
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3～5分	↓																
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓		↓		↓		↓										

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日・ベルケイド投与日及び翌日に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM DBd-9～(SC)																更新日	2021/6/15	
																	1クール	28日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	28													
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3～5分	↓															

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	AL DCyBorD-1～2																更新日	2022/5/19		
																	1クール	28日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	8	・	15	・	22	・	28								
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3～5分	↓		↓		↓		↓										
ベルケイド注射用	1.3mg/m ²	皮下注射		↓		↓		↓		↓										
生理食塩液	20mL			↓		↓		↓												
生理食塩液	50mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓										
注射用エンドキサン	300mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓		↓										
生理食塩液	100mL			↓		↓		↓												

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキユーロ投与日内服。デカドロン錠は20mg/body（day1.2、8.9、15.16、22.23）。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。エンドキサン（300mg/m²：最大500mg/週）は経口投与も可。

レジメン名	AL DCyBorD-3～6																更新日	2022/5/19								
																	1クール	28日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																						
				1	・	8	・	15	・	22	・	28														
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3～5分	↓			8		↓			22		28												
ベルケイド注射用	1.3mg/m ²	皮下注射		↓		↓		↓		↓																
生理食塩液	20mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓																
生理食塩液	50mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓																
注射用エンドキサン	300mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓		↓																
生理食塩液	100mL																									

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキユーロ投与日内服。デカドロン錠は20mg/body（day1.2、8、15.16、22）。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。エンドキサン（300mg/m²：最大500mg/週）は経口投与も可。

レジメン名	AL DCyBorD-7～																更新日	2022/5/19	
																	1クール	28日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	28													
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3～5分	↓															

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキユーロ投与日内服。デカドロン錠は20mg/body（day1）喘息、COPD患者はモンテルカスト内服

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM KdD-1																更新日	2021/3/21							
																	1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																					
				1	2	・	8	9	・	15	16	・	22	・	28										
ブドウ糖液 5 %	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓														
カイプロリス点滴静注用 注射用水	20mg/㎡ 40mL	点滴末梢	30分	↓	↓																				
ブドウ糖液 5 %	100mL																								
カイプロリス点滴静注用 注射用水	56mg/㎡ 60mL	点滴末梢	30分				↓	↓		↓	↓														
ブドウ糖液 5 %	100mL																								
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓			↓			↓												
ソル・コーテフ注射用 生理食塩液	300mg 50mL	点滴末梢	15分	↓	↓																				
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	8mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓	↓																				
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り				↓			↓			↓												

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はday1.2、8.9、15.16、22.23に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM KdD-2																更新日	2021/3/21							
																	1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																					
				1	2	・	8	9	・	15	16	・	22	・	28										
ブドウ糖液 5 %	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓														
カイプロリス点滴静注用 注射用水	56mg/㎡ 60mL	点滴末梢	30分	↓	↓		↓	↓		↓	↓														
ブドウ糖液 5 %	100mL																								
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓			↓			↓			↓												
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓			↓			↓			↓												

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はday1.2、8.9、15.16、22.23に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM KdD-3～6																更新日		2021/3/21		
																	1クール		28日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	2	・	8	9	・	15	16	・	28								
ブドウ糖液 5 %	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓										
カイプロリス点滴静注用	56mg/㎡	点滴末梢	30分	↓	↓		↓	↓		↓	↓										
注射用水	60mL																				
ブドウ糖液 5 %	100mL																				
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓						↓											
ダラザレックス点滴静注用	16mg/kg	点滴末梢	指示通り	↓						↓											
生理食塩液	500mL																				

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はday1.2、8.9、15.16、22.23に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM KdD-7～																更新日		2021/3/21		
																	1クール		28日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	2	・	8	9	・	15	16	・	28								
ブドウ糖液 5 %	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓										
カイプロリス点滴静注用 注射用水	56mg/㎡ 60mL	点滴末梢	30分	↓	↓		↓	↓		↓	↓										
ブドウ糖液 5 %	100mL																				
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																	
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓																	

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はday1.2、8.9、15.16、22.23に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM KdD-1(SC)																更新日		2021/6/15			
																	1クール		28日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	・	8	9	・	15	16	・	22	・	28							
ブドウ糖液 5 %	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓											
カイプロリス点滴静注用 注射用水	20mg/㎡ 40mL	点滴末梢	30分	↓	↓																	
ブドウ糖液 5 %	100mL																					
カイプロリス点滴静注用 注射用水	56mg/㎡ 60mL	点滴末梢	30分				↓	↓		↓	↓											
ブドウ糖液 5 %	100mL																					
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3～5分	↓			↓			↓			↓									

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠はday1.2、8.9、15.16、22.23に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM KdD-2(SC)																更新日	2021/6/15	
																	1クール	28日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	・	8	9	・	15	16	・	22	・	28				
ブドウ糖液 5 %	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓								
カイプロリス点滴静注	56mg/m ²	点滴末梢	30分	↓	↓		↓	↓		↓	↓								
注射用水	60mL																		
ブドウ糖液 5 %	100mL																		
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3～5分	↓			↓			↓			↓						

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠はday1.2、8.9、15.16、22.23に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名		MM KdD-3～6(SC)																更新日	2021/6/15
																		1クール	28日間
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	・	8	9	・	15	16	・	28						
ブドウ糖液 5 %	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓								
カイプロリス点滴静注用 注射用水	56mg/m ² 60mL	点滴末梢	30分	↓	↓		↓	↓		↓	↓								
ブドウ糖液 5 %	100mL																		
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3～5分	↓						↓									

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠はday1.2、8.9、15.16、22.23に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名		MM KdD-7～(SC)																更新日	2021/6/15
																		1クール	28日間
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	・	8	9	・	15	16	・	28						
ブドウ糖液 5 %	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓								
カイプロリス点滴静注用 注射用水	56mg/m ² 60mL	点滴末梢	30分	↓	↓		↓	↓		↓	↓								
ブドウ糖液 5 %	100mL																		
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3～5分	↓															

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠はday1.2、8.9、15.16、22.23に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM Dara-BMP-1																			更新日	2020/3/18		
																				1クール	42日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	・	4	・	8	・	11	・	15	・	22	・	25	・	29	・	32	・	36	・
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓				↓				↓		↓				↓				↓	
ソル・コーテフ注射用 生理食塩液	300mg 50mL	点滴末梢	15分	↓				↓															
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 1L	点滴末梢	指示通り	↓																			
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り					↓				↓		↓				↓				↓	
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射	—	↓		↓		↓		↓			↓		↓		↓		↓		↓		
アルケラン錠	9mg/m ²	内服		day1～4																			
プレドニン錠	60mg/m ²	内服			day2～4																		

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM Dara-BMP-2～9													更新日	2020/3/18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
														1クール	42日間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				1	・	4	・	8	・	22		29	・	42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓			4			8			↓			29			42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM Dara-BMP-★10～															更新日	2020/3/26				
																1クール	28日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	28															
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓			28														
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓																	

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM Dara-BMP-1(SC)																	更新日	2021/6/15				
																		1クール	42日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	・	4	・	8	・	11	・	15	・	22	・	25	・	29	・	32	・	36	・
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3～5分	↓				↓				↓		↓			↓				↓		
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓		↓		↓		↓			↓		↓		↓		↓				
アルケラン錠	9mg/m ²	内服		day1～4																			
プレドニン錠	60mg/m ²	内服			day2～4																		

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM Dara-BMP-2～9(SC)																	更新日	2021/6/15		
																		1クール	42日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	4	・	8	・	22		29	・	42							
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3～5分	↓						↓											
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/㎡ 20mL	皮下注射		↓				↓		↓		↓									
アルケラン錠	9mg/㎡	内服		day1～4																	
プレドニン錠	60mg/㎡	内服			day2～4																

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM Dara-BMP-★10～(SC)																	更新日	2021/6/15						
																		1クール	28日間						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																					
				1	・	28																			
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3～5分	↓																					

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名		MM EPd-1												更新日		2020/3/26					
														1クール		28日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	8	・	15	・	22	・	28									
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓											
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分	↓		↓		↓		↓											
生理食塩液	50mL																				
エムプリシティ点滴静注用	10mg/kg	点滴末梢	指示通り	↓		↓		↓		↓											
注射用水	40mL																				
生理食塩液	250mL																				
ポマリストカプセル	1～4mg	内服	指示通り	day1～21																	

備考：エムプリシティ投与前に抗ヒスタミン剤・ガスター注投与、カロナール錠内服。デキサメタゾン併用。

レジメン名	MM EPd-2													更新日		2020/3/26						
														1クール		28日間						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	・	8	・	15	・	22	・	28										
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓		28										
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分	↓		↓		↓		↓												
生理食塩液	50mL																					
エムプリシティ点滴静注用	10mg/kg	点滴末梢	指示通り	↓		↓		↓		↓												
注射用水	40mL																					
生理食塩液	250mL																					
ポマリストカプセル	1～4mg	内服	指示通り	day1～21																		

備考：エムプリシティ投与前に抗ヒスタミン剤・ガスター注投与、カロナール錠内服。デキサメタゾン併用。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM EPd-3～																	更新日	2020/3/26						
																		1クール	28日間						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																					
				1	.	.	.	.	21	.	28														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓							21			28											
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分	↓																					
生理食塩液	50mL			↓																					
エムプリシティ点滴静注用	20mg/kg	点滴末梢	指示通り	↓																					
注射用水	60mL			↓																					
生理食塩液	250mL			↓																					
ポマリストカプセル	1～4mg	内服	指示通り	day1～21																					

備考：エムプリシティ投与前に抗ヒスタミン剤・ガスター注投与、カロナール錠内服。デキサメタゾン併用。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	Carfilzomib- 1																	更新日	2020/3/31	
																		1クール	28日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	・	8	9	・	15	16	・	21	・	28					
ブドウ糖液 5 %	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓									
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液 5 %	20mg/㎡ 40mL 100mL	点滴末梢	10分	↓	↓															
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液 5 %	27mg/㎡ 40mL 100mL	点滴末梢	10分				↓	↓		↓	↓									
レブラミドカプセル	～25mg	内服	指示通り	day1～21																

備考：デキサメタゾン40mg/day 1日1回 day1,8,15,22(カイプロリス投与前)併用

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	Carfilzomib- 2～12																更新日	2020/3/31			
																	1クール	28日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	2	・	8	9	・	15	16	・	21	・	28						
ブドウ糖液 5 %	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓										
カiproリス点滴静注用 注射用水	27mg/m ² 40mL	点滴末梢	10分	↓	↓		↓	↓		↓	↓										
ブドウ糖液 5 %	100mL																				
レブラミドカプセル	～25mg	内服	指示通り	day1～21																	

備考：デキサメタゾン40mg/day 1日1回 day1,8,15,22(カiproリス投与前)併用

レジメン名	Carfilzomib-13～																更新日	2020/3/31			
																	1クール	28日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	2	・	15	16	・	21	・	28									
ブドウ糖液 5 %	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓													
カiproリス点滴静注用 注射用水	27mg/㎡ 40mL	点滴末梢	10分	↓	↓		↓	↓													
ブドウ糖液 5 %	100mL																				
レブラミドカプセル	～25mg	内服	指示通り	day1～21																	

備考：デキサメタゾン40mg/day 1日1回 day1,8,15,22(カiproリス投与前)併用

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM ELd-1（Elotuzumab-1）																更新日	2020/3/26			
																	1クール	28日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	8	・	15	・	22	・	28									
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓											
ソル・コーテフ注射用	100mg	点滴末梢	15分	↓		↓		↓		↓											
生理食塩液	50mL			↓		↓		↓													
エムプリシティ点滴静注用	10mg/kg	点滴末梢	指示通り	↓		↓		↓		↓											
注射用水	40mL			↓		↓		↓													
生理食塩液	250mL																				
レブラミドカプセル	～25mg	内服	指示通り	day1～21																	

備考：エムプリシティ投与前に抗ヒスタミン剤・ガスター注投与、カロナール錠内服。デキサメタゾン併用。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM ELd-2（Elotuzumab-2）													更新日	2020/3/26						
														1クール	28日間						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	8	・	15	・	22	・	28									
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓											
ソル・コーテフ注射用	100mg	点滴末梢	15分	↓		↓		↓		↓											
生理食塩液	50mL																				
エムプリシティ点滴静注用	10mg/kg	点滴末梢	指示通り	↓		↓		↓		↓											
注射用水	40mL																				
生理食塩液	250mL																				
レブラミドカプセル	～25mg	内服	指示通り	day1～21																	

備考：エムプリシティ投与前に抗ヒスタミン剤・ガスター注投与、カロナール錠内服。デキサメタゾン併用。

レジメン名	MM ELd-3～（Elotuzumab-3～）																更新日	2020/3/26												
																	1クール	28日間												
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																										
				1	・	15	・	21	・	28																				
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓																								
ソル・コーテフ注射用	100mg	点滴末梢	15分	↓		↓																								
生理食塩液	50mL																													
エムプリシティ点滴静注用	10mg/kg	点滴末梢	指示通り	↓		↓																								
注射用水	40mL																													
生理食塩液	250mL																													
レブラミドカプセル	～25mg	内服	指示通り	day1～21																										

備考：エムプリシティ投与前に抗ヒスタミン剤・ガスター注投与、カロナール錠内服。デキサメタゾン併用。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	高用量Carfilzomib- 1																	更新日	2020/3/31	
																		1クール	28日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	・	8	9	・	15	16	・	28							
ブドウ糖液 5 %	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓									
カiproリス点滴静注用 注射用水	20mg/m ² 40mL	点滴末梢	30分	↓	↓															
ブドウ糖液 5 %	100mL																			
カiproリス点滴静注用 注射用水	56mg/m ² 60mL	点滴末梢	30分				↓	↓		↓	↓									
ブドウ糖液 5 %	100mL																			

備考：デキサメタゾン20mg/day 1日1回 day1,2,8,9,15,16,22,23併用

レジメン名	高用量Carfilzomib- 2～																	更新日	2020/3/31	
																		1クール	28日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	・	8	9	・	15	16	・	28							
ブドウ糖液 5 %	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓									
カiproリス点滴静注用	56mg/㎡	点滴末梢	30分																	
注射用水	60mL			↓	↓		↓	↓		↓	↓									
ブドウ糖液 5 %	100mL																			

備考：デキサメタゾン20mg/day 1日1回 day1,2,8,9,15,16,22,23併用

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM ISaPd-1																更新日	2021/3/21			
																	1クール	28日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	8	・	15	・	22	・	28									
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓											
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分	↓		↓		↓		↓											
生理食塩液	50mL																				
サークリサ点滴静注	10mg/kg	点滴末梢	指示通り	↓		↓		↓		↓											
生理食塩液	250mL																				
ポマリストカプセル	～4mg 1日1回	内服	指示通り	day1～21																	

備考：サークリサ投与前に解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤・H2受容体拮抗剤等を投与。デキサメタゾン併用。

レジメン名	MM ISaPd-2～																更新日	2021/3/21	
																	1クール	28日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	15	・	22	・	28									
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓													
サークリサ点滴静注 生理食塩液	10mg/kg 250mL	点滴末梢	指示通り	↓		↓													
ポマリストカプセル	～4mg 1日1回	内服	指示通り	day1～21															

備考：サークリサ投与前に解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤・H2受容体拮抗剤等を投与。デキサメタゾン併用。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名		MM ISaKd-1																更新日	2023/2/21
																		1クール	28日間
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	・	8	9	・	15	16	・	22						
ブドウ糖液 5 %	250mL	点滴末梢	メイン	↓			↓			↓			↓						
ブドウ糖液 5 %	100mL	点滴末梢	メイン		↓			↓			↓								
サークリサ点滴静注 ブドウ糖液 5 %	10mg/kg 250mL	点滴末梢	指示通り	↓			↓			↓			↓						
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液 5 %	20mg/m ² 40mL 100mL	点滴末梢	30分	↓	↓														
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液 5 %	56mg/m ² 60mL 100mL	点滴末梢	30分				↓	↓		↓	↓								

備考：サークリサ投与前に解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤・H2受容体拮抗剤等を投与。デキサメタゾン20mg/day 1日1回 day1,2,8,9,15,16,22,23併用

レジメン名		MM ISaKd-2～																更新日	2023/2/21
																		1クール	28日間
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	・	8	9	・	15	16	・	28						
ブドウ糖液 5 %	250mL	点滴末梢	メイン	↓						↓									
ブドウ糖液 5 %	100mL	点滴末梢	メイン		↓		↓	↓			↓								
サークリサ点滴静注 ブドウ糖液 5 %	10mg/kg 250mL	点滴末梢	指示通り	↓						↓									
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液 5 %	56mg/m ² 60mL 100mL	点滴末梢	30分	↓	↓		↓	↓		↓	↓								

備考：サークリサ投与前に解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤・H2受容体拮抗剤等を投与。デキサメタゾン20mg/day 1日1回 day1,2,8,9,15,16,22,23併用

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名		MM ISa-1																更新日		2023/2/22	
																		1クール		28日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	・	8	・	15	・	22	・	28									
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓											
ソル・メドロール静注用 生理食塩液	40mg 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓		↓											
サークリサ点滴静注 生理食塩液	20mg/kg 250mL	点滴末梢	指示通り	↓		↓		↓		↓											

備考：サークリサ投与前に解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤・H2受容体拮抗剤等を投与。

レジメン名		MM ISa-2～																更新日	2023/2/22	
																		1クール	28日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	・	15	・	28												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
サークリサ点滴静注	20mg/kg	点滴末梢	指示通り	↓		↓														
生理食塩液	250mL																			

備考：サークリサ投与前に解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤・H2受容体拮抗剤等を投与。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM DCEP療法																	更新日	2023/2/22	
																		1クール	21日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	3	4	.	21											
生理食塩液	100mL	中心静脈	プライミング用	↓	↓	↓	↓													
パロノセトロン点滴静注	0.75mg/50mL	中心静脈	30分	↓																
デキサート注射液	39.6mg																			
デキサート注射液	39.6mg	中心静脈	30分		↓	↓	↓													
生理食塩液	100mL																			
注射用エンドキサン	400mg/m ²	中心静脈	24時間	↓	↓	↓	↓													
シスプラチン点滴静注	10mg/m ²																			
生理食塩液	500mL																			
エトポシド点滴静注	40mg/m ²	中心静脈	24時間	↓	↓	↓	↓													
生理食塩液	500mL																			

備考：

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	エルラナタマブ1-3																	更新日	2025/4/1	
																		1クール	14日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	4	.	8	.	14										
エルレフィオ皮下注	12mg	皮下注射		↓																
エルレフィオ皮下注	32mg	皮下注射				↓														
エルレフィオ皮下注	76mg	皮下注射						↓												
デカドロン錠 カロナール錠 レスタミンコーワ錠	20mg 1000mg 50mg	内服	投与前	↓		↓		↓												

備考：初回12mg投与後48時間、2回目32mg投与後24時間は必ず入院管理

レジメン名	エルラナタマブ4-25																	更新日	2025/4/1	
																		1クール	7日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	7														
エルレフィオ皮下注	76mg	皮下注射		↓																

備考：

レジメン名	エルラナタマブ26-																	更新日	2025/4/1	
																		1クール	14日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	14														
エルレフィオ皮下注	76mg	皮下注射		↓																

備考：