

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名		MM DLd-1											更新日		2025/7/17				
													1クール		28日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	8	15	22	28											
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓									
ソル・コーテフ注射用 生理食塩液	300mg 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓		↓									
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 1L	点滴末梢	指示通り	↓															
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り			↓		↓		↓									
レナリドミドカプセル	~25mg	内服		day1~21															

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日及び翌日に内服。
喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名		MM DLd-2											更新日		2025/7/17				
													1クール		28日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	8	15	22	28											
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓									
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓		↓		↓		↓									
レナリドミドカプセル	~25mg	内服		day1~21															

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日及び翌日に内服。
喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名		MM DBd-1											更新日							
													1クール		21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	4	8	11	15	21											
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓			↓				↓									
ソル・コーテフ注射用 生理食塩液	300mg 50mL	点滴末梢	15分	↓			↓				↓									
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 1L	点滴末梢	指示通り	↓																
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り				↓				↓									
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓		↓		↓		↓										

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日・ベルケイド投与日及び翌日に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名		MM DBd-2~3											更新日							
													1クール		21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	4	8	11	15	21											
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓			↓				↓									
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓			↓				↓									
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓		↓		↓		↓										

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日・ベルケイド投与日及び翌日に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM DBd-4~8											更新日								
												2020/3/18								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	4	8	11	21												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓																
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓		↓		↓		↓										

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日・ベルケイド投与日及び翌日に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM DBd-9~											更新日								
												2020/3/18								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	28															
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓																

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日と翌日に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	AL DCyBorD-1~2										更新日									
											2022/5/19									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	8	15	22	28												
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓		↓		↓		↓										
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓		↓		↓		↓										
生理食塩液	50mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓										
注射用エンドキサン 生理食塩液	300mg/m ² 100mL	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓		↓										

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠は20mg/body (day1.2、8.9、15.16、22.23)。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。エンドキサン (300mg/m²：最大500mg/週) は経口投与も可。

レジメン名	AL DCyBorD-3~6										更新日									
											2022/5/19									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	8	15	22	28												
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓				↓												
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓		↓		↓		↓										
生理食塩液	50mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓										
注射用エンドキサン 生理食塩液	300mg/m ² 100mL	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓		↓										

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠は20mg/body (day1.2、8、15.16、22)。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。エンドキサン (300mg/m²：最大500mg/週) は経口投与も可。

レジメン名	AL DCyBorD-7~										更新日									
											2022/5/19									
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	28															
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓																

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠は20mg/body (day1)喘息、COPD患者はモンテルカスト内服

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名		MM KdD-1												更新日	2021/3/21																								
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																																		
					1	2	・	8	9	・	15	16	・	22	・	28																							
ブドウ糖液 5%		100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓																											
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液 5%		20mg/m ² 40mL 100mL	点滴末梢	30分	↓	↓																																	
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液 5%		56mg/m ² 60mL 100mL	点滴末梢	30分				↓	↓		↓	↓																											
生理食塩液		250mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓			↓					↓																							
ソル・コーテフ注射用 生理食塩液		300mg 50mL	点滴末梢	15分	↓	↓																																	
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液		8mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓	↓																																	
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液		16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り				↓			↓					↓																							

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はday1.2、8.9、15.16、22.23に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名		MM KdD-2												更新日	2021/3/21																									
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																																			
					1	2	・	8	9	・	15	16	・	22	・	28																								
ブドウ糖液 5%		100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓																												
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液 5%		56mg/m ² 60mL 100mL	点滴末梢	30分	↓	↓		↓	↓		↓	↓																												
生理食塩液		250mL	点滴末梢	メイン	↓			↓			↓					↓																								
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液		16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓			↓			↓					↓																								

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はday1.2、8.9、15.16、22.23に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM KdD-3~6													更新日								
														1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	8	9	15	16	28												
ブドウ糖液5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓											
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液5%	56mg/m ² 60mL 100mL	点滴末梢	30分	↓	↓		↓	↓		↓	↓											
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓						↓												
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓						↓												

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はday1.2、8.9、15.16、22.23に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM KdD-7~													更新日								
														1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	8	9	15	16	28												
ブドウ糖液5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓											
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液5%	56mg/m ² 60mL 100mL	点滴末梢	30分	↓	↓		↓	↓		↓	↓											
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																		
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓																		

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はday1.2、8.9、15.16、22.23に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM KdD-1(SC)													更新日	2021/6/15								
														1クール	28日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	2	・	8	9	・	15	16	・	22	・	28								
ブドウ糖液5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓												
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液5%	20mg/m ² 40mL 100mL	点滴末梢	30分	↓	↓																		
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液5%	56mg/m ² 60mL 100mL	点滴末梢	30分				↓	↓		↓	↓												
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓			↓			↓			↓										

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠はday1.2、8.9、15.16、22.23に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM KdD-2(SC)													更新日	2021/6/15								
														1クール	28日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	2	・	8	9	・	15	16	・	22	・	28								
ブドウ糖液5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓												
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液5%	56mg/m ² 60mL 100mL	点滴末梢	30分	↓	↓		↓	↓		↓	↓												
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓			↓			↓			↓										

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠はday1.2、8.9、15.16、22.23に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM KdD-3~6(SC)													更新日	2021/6/15							
														1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	・	8	9	・	15	16	・	28									
ブドウ糖液5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓											
カイプロリス点滴静注用 注射用水	56mg/m ² 60mL	点滴末梢	30分	↓	↓		↓	↓		↓	↓											
ブドウ糖液5%	100mL																					
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓						↓												

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠はday1.2、8.9、15.16、22.23に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM KdD-7~(SC)													更新日	2021/6/15							
														1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	・	8	9	・	15	16	・	28									
ブドウ糖液5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓											
カイプロリス点滴静注用 注射用水	56mg/m ² 60mL	点滴末梢	30分	↓	↓		↓	↓		↓	↓											
ブドウ糖液5%	100mL																					
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓																		

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠はday1.2、8.9、15.16、22.23に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM Dara-BMP-1													更新日	2020/3/18				
														1クール	42日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	4	8	11	15	22	25	29	32	36						
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓			↓				↓		↓			↓			↓
ソル・コーテフ注射用 生理食塩液	300mg 50mL	点滴末梢	15分	↓			↓												
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 1L	点滴末梢	指示通り	↓															
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り				↓				↓		↓			↓			↓
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射	—	↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓	
アルケラン錠	9mg/m ²	内服		day1~4															
プレドニン錠	60mg/m ²	内服		day2~4															

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM Dara-BMP-1(SC)													更新日	2025/7/17			
														1クール	42日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日														
				1	4	8	11	15	22	25	29	32	36					
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓			↓			↓		↓			↓			↓
ボルテゾミブ注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓		↓		↓			↓		↓		↓		↓	
アルケラン錠	9mg/m ²	内服		day1~4														
プレドニン錠	60mg/m ²	内服		day2~4														

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM Dara-BMP-2~9(SC)													更新日	2025/7/17			
														1クール	42日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日														
				1	4	8	22	29	42									
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓					↓									
ボルテゾミブ注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓				↓		↓		↓						
アルケラン錠	9mg/m ²	内服		day1~4														
プレドニン錠	60mg/m ²	内服		day2~4														

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM Dara-BMP-★10~(SC)													更新日	2021/6/15			
														1クール	28日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日														
				1	28													
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓														

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM EPd-3~				更新日	2020/3/26														
					1クール	28日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	21	.	28									
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
デキサート注射液	6.6mg	点滴末梢	15分	↓																
生理食塩液	50mL																			
エムプリシティ点滴静注用	20mg/kg	点滴末梢	指示通り	↓																
注射用水	60mL																			
生理食塩液	250mL																			
ポマリストカプセル	1~4mg	内服	指示通り	day1~21																

備考：エムプリシティ投与前に抗ヒスタミン剤・ガスター注投与、カロナール錠内服。デキサメタゾン併用。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM ELd-1 (Elotuzumab-1)				更新日	2025/7/17														
					1クール	28日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	8	15	22	28												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓										
ソル・コーテフ注射用 生理食塩液	100mg 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓		↓										
エムプリシティ点滴静注用 注射用水 生理食塩液	10mg/kg 40mL 250mL	点滴末梢	指示通り	↓		↓		↓		↓										
レナリドミドカプセル	~25mg	内服	指示通り	day1~21																

備考：エムプリシティ投与前に抗ヒスタミン剤・ガスター注投与、カロナール錠内服。デキサメタゾン併用。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	高用量Carfilzomib- 1													更新日	2020/3/31							
														1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	・	8	9	・	15	16	・	28									
ブドウ糖液 5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓											
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液 5%	20mg/m ² 40mL 100mL	点滴末梢	30分	↓	↓																	
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液 5%	56mg/m ² 60mL 100mL	点滴末梢	30分				↓	↓		↓	↓											

備考：デキサメタゾン20mg/day 1日1回 day1,2,8,9,15,16,22,23併用

レジメン名	高用量Carfilzomib- 2~													更新日	2020/3/31							
														1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	・	8	9	・	15	16	・	28									
ブドウ糖液 5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓											
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液 5%	56mg/m ² 60mL 100mL	点滴末梢	30分	↓	↓		↓	↓		↓	↓											

備考：デキサメタゾン20mg/day 1日1回 day1,2,8,9,15,16,22,23併用

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM IsaVRd-1																更新日	2025/7/15
																	1クール	42日間
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日														
				1	4	8	11	15	22	25	29	32	42					
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓			↓			↓		↓			↓			
ボルテゾミブ注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓		↓		↓			↓		↓		↓		↓	
サークリサ点滴静注 生理食塩液	10mg/kg 250mL	点滴末梢	指示通り	↓			↓			↓		↓			↓			
レナリドミドカプセル	~25mg 1日1回	内服	指示通り	day1~14							day22~35							

備考：サークリサ投与前に解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤・H2受容体拮抗剤等を投与。
デキサメタゾン20mg/day 1日1回 day1,2,4,5,8,9,11,12,15,22,23,25,26,29,30,32,33(75歳以上：day1,4,8,11,15,22,25,29,32)併用。

レジメン名	MM IsaVRd-2~4																更新日	2025/7/15
																	1クール	42日間
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日														
				1	4	8	11	15	22	25	29	32	42					
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓						↓					↓			
ボルテゾミブ注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓		↓		↓			↓		↓		↓		↓	
サークリサ点滴静注 生理食塩液	10mg/kg 250mL	点滴末梢	指示通り	↓						↓					↓			
レナリドミドカプセル	~25mg 1日1回	内服	指示通り	day1~14							day22~35							

備考：サークリサ投与前に解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤・H2受容体拮抗剤等を投与。
デキサメタゾン20mg/day 1日1回 day1,2,4,5,8,9,11,12,15,22,23,25,26,29,30,32,33(75歳以上：day1,4,8,11,15,22,25,29,32)併用。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名		MM ISaPd-1											更新日		2021/3/21						
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																
					1	8	15	22	28												
生理食塩液		250mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓	↓	↓												
デキサート注射液		6.6mg	点滴末梢	15分	↓	↓	↓	↓	↓												
生理食塩液		50mL	点滴末梢																		
サークリサ点滴静注		10mg/kg	点滴末梢	指示通り	↓	↓	↓	↓	↓												
生理食塩液		250mL	点滴末梢																		
ポマリストカプセル		~4mg 1日1回	内服	指示通り	day1~21																

備考：サークリサ投与前に解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤・H2受容体拮抗剤等を投与。デキサメタゾン併用。

レジメン名		MM ISaPd-2~											更新日		2021/3/21						
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																
					1	15	22	28													
生理食塩液		250mL	点滴末梢	メイン	↓	↓															
サークリサ点滴静注		10mg/kg	点滴末梢	指示通り	↓	↓															
生理食塩液		250mL	点滴末梢																		
ポマリストカプセル		~4mg 1日1回	内服	指示通り	day1~21																

備考：サークリサ投与前に解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤・H2受容体拮抗剤等を投与。デキサメタゾン併用。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM ISaKd-1													更新日								
														2023/2/21								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	8	9	15	16	22												
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	メイン	↓			↓			↓			↓									
ブドウ糖液5%	100mL	点滴末梢	メイン		↓			↓				↓										
サークリサ点滴静注 ブドウ糖液5%	10mg/kg 250mL	点滴末梢	指示通り	↓			↓					↓										
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液5%	20mg/m ² 40mL 100mL	点滴末梢	30分	↓	↓																	
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液5%	56mg/m ² 60mL 100mL	点滴末梢	30分				↓	↓				↓	↓									

備考：サークリサ投与前に解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤・H2受容体拮抗剤等を投与。デキサメタゾン20mg/day 1日1回 day1,2,8,9,15,16,22,23併用

レジメン名	MM ISaKd-2~													更新日								
														2023/2/21								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	8	9	15	16	28												
ブドウ糖液5%	250mL	点滴末梢	メイン	↓								↓										
ブドウ糖液5%	100mL	点滴末梢	メイン		↓		↓	↓				↓										
サークリサ点滴静注 ブドウ糖液5%	10mg/kg 250mL	点滴末梢	指示通り	↓								↓										
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液5%	56mg/m ² 60mL 100mL	点滴末梢	30分	↓	↓		↓	↓				↓	↓									

備考：サークリサ投与前に解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤・H2受容体拮抗剤等を投与。デキサメタゾン20mg/day 1日1回 day1,2,8,9,15,16,22,23併用

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM ISa-1													更新日							
														2023/2/22							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	8	15	22	28													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓											
ソル・メドロール静注用 生理食塩液	40mg 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓		↓											
サークリサ点滴静注 生理食塩液	20mg/kg 250mL	点滴末梢	指示通り	↓		↓		↓		↓											

備考：サークリサ投与前に解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤・H2受容体拮抗剤等を投与。

レジメン名	MM ISa-2～													更新日							
														2023/2/22							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	15	28															
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓															
サークリサ点滴静注 生理食塩液	20mg/kg 250mL	点滴末梢	指示通り	↓		↓															

備考：サークリサ投与前に解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤・H2受容体拮抗剤等を投与。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	エルラナタマブ1-3										更新日	2025/4/1								
											1クール	14日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	4	.	8	.	14										
エルレフィオ皮下注	12mg	皮下注射		↓																
エルレフィオ皮下注	32mg	皮下注射				↓														
エルレフィオ皮下注	76mg	皮下注射						↓												
デカドロン錠 カロナル錠 レスタミンコーワ錠	20mg 1000mg 50mg	内服	投与前	↓		↓		↓												

備考：初回12mg投与後48時間、2回目32mg投与後24時間は必ず入院管理

レジメン名	エルラナタマブ4-25										更新日	2025/4/1								
											1クール	7日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	7														
エルレフィオ皮下注	76mg	皮下注射		↓																

備考：

レジメン名	エルラナタマブ26-										更新日	2025/4/1								
											1クール	14日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	14														
エルレフィオ皮下注	76mg	皮下注射		↓																

備考：