

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名		MM DLd-1											更新日		2025/7/17				
													1クール		28日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	8	15	22	28											
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓									
ソル・コーテフ注射用 生理食塩液	300mg 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓		↓									
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 1L	点滴末梢	指示通り	↓															
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り			↓		↓		↓									
レナリドミドカプセル	~25mg	内服		day1~21															

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日及び翌日に内服。
喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名		MM DLd-2											更新日		2025/7/17				
													1クール		28日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	8	15	22	28											
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓									
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓		↓		↓		↓									
レナリドミドカプセル	~25mg	内服		day1~21															

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日及び翌日に内服。
喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM DLd-3~6										更新日									
											1クール		28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	15	.	.	.	22	.	28								
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓			↓													
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓			↓													
レナリドミドカプセル	~25mg	内服		day1~21																

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日及び翌日に内服。
喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM DLd-7~										更新日									
											1クール		28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	22	.	28								
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓																
レナリドミドカプセル	~25mg	内服		day1~21																

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日及び翌日に内服。
喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名		MM DBd-1												更新日		2020/3/18			
														1クール		21日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	4	8	11	15	21										
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓			↓				↓								
ソル・コーテフ注射用 生理食塩液	300mg 50mL	点滴末梢	15分	↓			↓				↓								
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 1L	点滴末梢	指示通り	↓															
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り				↓				↓								
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓	↓	↓		↓											

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日・ベルケイド投与日及び翌日に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名		MM DBd-2~3												更新日		2020/3/18			
														1クール		21日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	4	8	11	15	21										
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓			↓				↓								
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓			↓				↓								
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓	↓	↓		↓											

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日・ベルケイド投与日及び翌日に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM DBd-4~8										更新日								
											1クール		21日間						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	4	8	11	21											
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓															
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓															
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓		↓		↓		↓									

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日・ベルケイド投与日及び翌日に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM DBd-9~										更新日								
											1クール		28日間						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	28														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓															
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓															

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はダラザレックス投与日と翌日に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM DBLd(移植非適応)-1~2				更新日												
					1クール	2026/3/9 21日間											
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日													
				1	4	8	11	15	21								
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓			↓				↓						
ボルテゾミブ注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓		↓		↓		↓							
レナリドミドカプセル	~25mg	内服		day1~14													

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠はダラキューロ投与日・ボルテゾミブ投与日及び翌日に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM DBLd(移植非適応)-3~8				更新日												
					1クール	2026/3/9 21日間											
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日													
				1	4	8	11	15	21								
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓													
ボルテゾミブ注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓		↓		↓		↓							
レナリドミドカプセル	~25mg	内服		day1~14													

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠はダラキューロ投与日・ボルテゾミブ投与日及び翌日に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM DBLd(移植非適応)-9~				更新日												
					1クール	2026/3/9 28日間											
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日													
				1	22	28											
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓													
レナリドミドカプセル	~25mg	内服		day1~21													

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はday1,8,15,22に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	AL DCyBorD-1~2										更新日								
											2022/5/19								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	8	15	22	28											
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓		↓		↓		↓									
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓		↓		↓		↓									
生理食塩液	50mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓									
注射用エンドキサン 生理食塩液	300mg/m ² 100mL	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓		↓									

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠は20mg/body (day1.2、8.9、15.16、22.23)。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。エンドキサン (300mg/m²：最大500mg/週) は経口投与も可。

レジメン名	AL DCyBorD-3~6										更新日								
											2022/5/19								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	8	15	22	28											
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓				↓											
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓		↓		↓		↓									
生理食塩液	50mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓									
注射用エンドキサン 生理食塩液	300mg/m ² 100mL	点滴末梢	1時間	↓		↓		↓		↓									

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠は20mg/body (day1.2、8、15.16、22)。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。エンドキサン (300mg/m²：最大500mg/週) は経口投与も可。

レジメン名	AL DCyBorD-7~										更新日								
											2022/5/19								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	28														
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓															

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠は20mg/body (day1)喘息、COPD患者はモンテルカスト内服

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名		MM KdD-1												更新日	2021/3/21							
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
					1	2	・	8	9	・	15	16	・	22	・	28						
ブドウ糖液 5%		100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓										
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液 5%		20mg/m ² 40mL 100mL	点滴末梢	30分	↓	↓																
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液 5%		56mg/m ² 60mL 100mL	点滴末梢	30分				↓	↓		↓	↓										
生理食塩液		250mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓			↓			↓								
ソル・コーテフ注射用 生理食塩液		300mg 50mL	点滴末梢	15分	↓	↓																
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液		8mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓	↓																
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液		16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り				↓			↓			↓								

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はday1.2、8.9、15.16、22.23に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名		MM KdD-2												更新日	2021/3/21							
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
					1	2	・	8	9	・	15	16	・	22	・	28						
ブドウ糖液 5%		100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓										
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液 5%		56mg/m ² 60mL 100mL	点滴末梢	30分	↓	↓		↓	↓		↓	↓										
生理食塩液		250mL	点滴末梢	メイン	↓			↓			↓			↓								
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液		16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓			↓			↓			↓								

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。デカドロン錠はday1.2、8.9、15.16、22.23に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM KdD-1(SC)													更新日	2021/6/15								
														1クール	28日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	2	・	8	9	・	15	16	・	22	・	28								
ブドウ糖液 5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓												
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液 5%	20mg/m ² 40mL 100mL	点滴末梢	30分	↓	↓																		
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液 5%	56mg/m ² 60mL 100mL	点滴末梢	30分				↓	↓		↓	↓												
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓			↓			↓			↓										

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠はday1,2、8,9、15,16、22,23に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM KdD-2(SC)													更新日	2021/6/15								
														1クール	28日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	2	・	8	9	・	15	16	・	22	・	28								
ブドウ糖液 5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓												
カイプロリス点滴静注用 注射用水 ブドウ糖液 5%	56mg/m ² 60mL 100mL	点滴末梢	30分	↓	↓		↓	↓		↓	↓												
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓			↓			↓			↓										

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠はday1,2、8,9、15,16、22,23に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM KdD-3~6(SC)													更新日	2021/6/15							
														1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	・	8	9	・	15	16	・	28									
ブドウ糖液5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓											
カイプロリス点滴静注用 注射用水	56mg/m ² 60mL	点滴末梢	30分	↓	↓		↓	↓		↓	↓											
ブドウ糖液5%	100mL																					
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓						↓												

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠はday1.2、8.9、15.16、22.23に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM KdD-7~(SC)													更新日	2021/6/15							
														1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	・	8	9	・	15	16	・	28									
ブドウ糖液5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓											
カイプロリス点滴静注用 注射用水	56mg/m ² 60mL	点滴末梢	30分	↓	↓		↓	↓		↓	↓											
ブドウ糖液5%	100mL																					
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓																		

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。デカドロン錠はday1.2、8.9、15.16、22.23に内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM Dara-BMP-1													更新日	2020/3/18		
														1クール	42日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日													
				1	4	8	11	15	22	25	29	32	36				
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓			↓			↓	↓			↓			↓
ソル・コーテフ注射用 生理食塩液	300mg 50mL	点滴末梢	15分	↓			↓										
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 1L	点滴末梢	指示通り	↓													
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り				↓			↓	↓			↓			↓
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射	—	↓	↓	↓	↓			↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
アルケラン錠	9mg/m ²	内服		day1~4													
プレドニン錠	60mg/m ²	内服		day2~4													

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名		MM Dara-BMP-2~9											更新日					
													1クール	42日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日														
				1	4	8	22	29	42									
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓					↓									
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓					↓									
ベルケイド注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓			↓		↓		↓							
アルケラン錠	9mg/m ²	内服		day1~4														
プレドニン錠	60mg/m ²	内服		day2~4														

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名		MM Dara-BMP-★10~											更新日					
													1クール	28日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日														
				1	28													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓														
ダラザレックス点滴静注用 生理食塩液	16mg/kg 500mL	点滴末梢	指示通り	↓														

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラザレックス投与日内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM Dara-BMP-1(SC)				更新日														
					1クール	2025/7/17 42日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	4	8	11	15	22	25	29	32	36						
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓			↓				↓		↓			↓			↓
ボルテゾミブ注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓	
アルケラン錠	9mg/m ²	内服		day1~4															
プレドニン錠	60mg/m ²	内服		day2~4															

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM Dara-BMP-2~9(SC)				更新日														
					1クール	2025/7/17 42日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	4	8	22	29	42										
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓					↓										
ボルテゾミブ注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓				↓		↓		↓							
アルケラン錠	9mg/m ²	内服		day1~4															
プレドニン錠	60mg/m ²	内服		day2~4															

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

レジメン名	MM Dara-BMP-★10~(SC)				更新日														
					1クール	2021/6/15 28日間													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	28														
ダラキューロ配合皮下注	1800mg/15mL	皮下注射	3~5分	↓															

備考：カロナール錠・ポララミン錠・デカドロン錠はダラキューロ投与日内服。喘息、COPD患者はモンテルカスト内服を考慮。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM EPd-1				更新日															
					1クール	28日間	2020/3/26													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	8	15	22	28												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓										
デキサート注射液 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓		↓										
エムプリシティ点滴静注用 注射用水 生理食塩液	10mg/kg 40mL 250mL	点滴末梢	指示通り	↓		↓		↓		↓										
ポマリストカプセル	1~4mg	内服	指示通り	day1~21																

備考：エムプリシティ投与前に抗ヒスタミン剤・ガスター注投与、カロナール錠内服。デキサメタゾン併用。

レジメン名	MM EPd-2				更新日															
					1クール	28日間	2020/3/26													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	8	15	22	28												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓										
デキサート注射液 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓		↓										
エムプリシティ点滴静注用 注射用水 生理食塩液	10mg/kg 40mL 250mL	点滴末梢	指示通り	↓		↓		↓		↓										
ポマリストカプセル	1~4mg	内服	指示通り	day1~21																

備考：エムプリシティ投与前に抗ヒスタミン剤・ガスター注投与、カロナール錠内服。デキサメタゾン併用。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名		Carfilzomib- 2~12												更新日								
														2025/7/17								
														1クール		28日間						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	・	8	9	・	15	16	・	21	・	28							
ブドウ糖液5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓		↓	↓											
カiproリス点滴静注用 注射用水	27mg/m ² 40mL	点滴末梢	10分	↓	↓		↓	↓		↓	↓											
ブドウ糖液5%	100mL																					
レナリドミドカプセル	~25mg	内服	指示通り	day1~21																		

備考：デキサメタゾン40mg/day 1日1回 day1,8,15,22(カiproリス投与前)併用

レジメン名		Carfilzomib-13~												更新日								
														2025/7/17								
														1クール		28日間						
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	・	15	16	・	21	・	28										
ブドウ糖液5%	100mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓														
カiproリス点滴静注用 注射用水	27mg/m ² 40mL	点滴末梢	10分	↓	↓		↓	↓														
ブドウ糖液5%	100mL																					
レナリドミドカプセル	~25mg	内服	指示通り	day1~21																		

備考：デキサメタゾン40mg/day 1日1回 day1,8,15,22(カiproリス投与前)併用

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM ELd-1 (Elotuzumab-1)				更新日	2025/7/17														
					1クール	28日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	8	15	22	28												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓										
ソル・コーテフ注射用 生理食塩液	100mg 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓		↓										
エムプリシティ点滴静注用 注射用水 生理食塩液	10mg/kg 40mL 250mL	点滴末梢	指示通り	↓		↓		↓		↓										
レナリドミドカプセル	~25mg	内服	指示通り	day1~21																

備考：エムプリシティ投与前に抗ヒスタミン剤・ガスター注投与、カロナール錠内服。デキサメタゾン併用。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM ELd-2 (Elotuzumab-2)				更新日															
					1クール	28日間	2025/7/17													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	8	15	22	28												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓										
ソル・コーテフ注射用 生理食塩液	100mg 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓		↓										
エムプリシティ点滴静注用 注射用水 生理食塩液	10mg/kg 40mL 250mL	点滴末梢	指示通り	↓		↓		↓		↓										
レナリドミドカプセル	~25mg	内服	指示通り	day1~21																

備考：エムプリシティ投与前に抗ヒスタミン剤・ガスター注投与、カロナール錠内服。デキサメタゾン併用。

レジメン名	MM ELd-3~ (Elotuzumab-3~)				更新日															
					1クール	28日間	2025/7/17													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	15	21	28													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
ソル・コーテフ注射用 生理食塩液	100mg 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓														
エムプリシティ点滴静注用 注射用水 生理食塩液	10mg/kg 40mL 250mL	点滴末梢	指示通り	↓		↓														
レナリドミドカプセル	~25mg	内服	指示通り	day1~21																

備考：エムプリシティ投与前に抗ヒスタミン剤・ガスター注投与、カロナール錠内服。デキサメタゾン併用。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM IsaVRd-1																更新日	2025/7/15	
																	1クール	42日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	4	8	11	15	22	25	29	32	42						
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓			↓			↓		↓			↓				
ボルテゾミブ注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓		↓		↓			↓		↓		↓		↓		
サークリサ点滴静注 生理食塩液	10mg/kg 250mL	点滴末梢	指示通り	↓			↓			↓		↓			↓				
レナリドミドカプセル	~25mg 1日1回	内服	指示通り	day1~14						day22~35									

備考：サークリサ投与前に解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤・H2受容体拮抗剤等を投与。
 デキサメタゾン20mg/day 1日1回 day1,2,4,5,8,9,11,12,15,22,23,25,26,29,30,32,33(75歳以上：day1,4,8,11,15,22,25,29,32)併用。

レジメン名	MM IsaVRd-2~4																更新日	2025/7/15	
																	1クール	42日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	4	8	11	15	22	25	29	32	42						
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓						↓					↓				
ボルテゾミブ注射用 生理食塩液	1.3mg/m ² 20mL	皮下注射		↓		↓		↓			↓		↓		↓		↓		
サークリサ点滴静注 生理食塩液	10mg/kg 250mL	点滴末梢	指示通り	↓						↓					↓				
レナリドミドカプセル	~25mg 1日1回	内服	指示通り	day1~14						day22~35									

備考：サークリサ投与前に解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤・H2受容体拮抗剤等を投与。
 デキサメタゾン20mg/day 1日1回 day1,2,4,5,8,9,11,12,15,22,23,25,26,29,30,32,33(75歳以上：day1,4,8,11,15,22,25,29,32)併用。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM ISaPd-1										更新日									
											1クール		28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	8	15	22	28												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓										
デキサート注射液 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓		↓										
サークリサ点滴静注 生理食塩液	10mg/kg 250mL	点滴末梢	指示通り	↓		↓		↓		↓										
ポマリストカプセル	~4mg 1日1回	内服	指示通り	day1~21																

備考：サークリサ投与前に解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤・H2受容体拮抗剤等を投与。デキサメタゾン併用。

レジメン名	MM ISaPd-2~										更新日									
											1クール		28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	15	22	28													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
サークリサ点滴静注 生理食塩液	10mg/kg 250mL	点滴末梢	指示通り	↓		↓														
ポマリストカプセル	~4mg 1日1回	内服	指示通り	day1~21																

備考：サークリサ投与前に解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤・H2受容体拮抗剤等を投与。デキサメタゾン併用。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	MM ISa-1				更新日															
					1クール	28日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	8	15	22	28												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓										
ソル・メドロール静注用 生理食塩液	40mg 50mL	点滴末梢	15分	↓		↓		↓		↓										
サークリサ点滴静注 生理食塩液	20mg/kg 250mL	点滴末梢	指示通り	↓		↓		↓		↓										

備考：サークリサ投与前に解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤・H2受容体拮抗剤等を投与。

レジメン名	MM ISa-2～				更新日															
					1クール	28日間														
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	15	28														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓														
サークリサ点滴静注 生理食塩液	20mg/kg 250mL	点滴末梢	指示通り	↓		↓														

備考：サークリサ投与前に解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤・H2受容体拮抗剤等を投与。

多発性骨髄腫(MM)

レジメン名	エルラナタマブ1-3										更新日	2025/4/1								
											1クール	14日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	4	.	8	.	14										
エルレフィオ皮下注	12mg	皮下注射		↓																
エルレフィオ皮下注	32mg	皮下注射				↓														
エルレフィオ皮下注	76mg	皮下注射					↓													
デカドロン錠 カロナル錠 レスタミンコーワ錠	20mg 1000mg 50mg	内服	投与前	↓		↓		↓												

備考：初回12mg投与後48時間、2回目32mg投与後24時間は必ず入院管理

レジメン名	エルラナタマブ4-25										更新日	2025/4/1								
											1クール	7日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	7														
エルレフィオ皮下注	76mg	皮下注射		↓																

備考：

レジメン名	エルラナタマブ26-										更新日	2025/4/1								
											1クール	14日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	14														
エルレフィオ皮下注	76mg	皮下注射		↓																

備考：