

急性骨髄性白血病(AML)

レジメン名	AML 地固め3(AA)													更新日	2020/3/30								
														1クール	21日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	中心静脈	1時間	↓	↓	↓	↓	↓															
キロサイド注 生理食塩液	200mg/m ² 500mL	中心静脈	24時間	↓	↓	↓	↓	↓															
アクラシノン注射用 生理食塩液	20mg/m ² 100mL	中心静脈	30分	↓	↓	↓	↓	↓															
ソルデム3A輸液	500mL	中心静脈	メイン	×4	×4	×4	×4	×4	×1														
メソトレキセート キロサイド注 プレドニン 生理食塩液	15mg 40mg 10mg 2mL	髄注	—	↓																			

備考：

レジメン名	AML 地固め4(A triple V)													更新日	2020/3/30								
														1クール	21日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
生理食塩液	500mL	中心静脈	メイン	↓	↓	↓	↓	↓															
キロサイド注 生理食塩液	200mg/m ² 500mL	中心静脈	24時間	↓	↓	↓	↓	↓															
グラニセトロン点滴静注	1mg/50mL	中心静脈	30分	↓	↓	↓	↓	↓															
エトポシド点滴静注液 ブドウ糖液5%	100mg/m ² 250mL	中心静脈	1時間	↓	↓	↓	↓	↓															
ソルデム3A輸液	500mL	中心静脈	メイン	↓	↓	↓	↓	↓															
生理食塩液	100mL	静脈注射	メイン										↓		↓								
オンコピン注射用 生理食塩液	0.8mg/m ² 20mL	静脈注射	ワンショット										↓										
フィルデシン 生理食塩液	2mg/m ² 20mL	静脈注射	ワンショット												↓								

備考：

急性骨髄性白血病(AML)

レジメン名		AML サルベージCAG(SC)													更新日	2020/3/17								
															1クール	21日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	21						
フィルグラスチムB S注シリンジ	200 μ g/ m^2	皮下注射		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓								
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	中心静脈	1時間	↓	↓	↓	↓																	
アクラシノン注射用 生理食塩液	14mg/ m^2 100mL	中心静脈	1時間	↓	↓	↓	↓																	
キロサイド注	10mg/ m^2	皮下注射	12時間毎	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓								
キロサイド注	10mg/ m^2	皮下注射	12時間毎	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓								
ソルデム3 A輸液 メイロン7%	500mL 20mL	中心静脈	メイン	×3	×3	×3	×3	×3	×2															
ソルデム3 A輸液	500mL	中心静脈	メイン						×1	×2	×2	×2	×2	×2	×2	×2	×2							

備考：

レジメン名		AML LDAC20(10日間)													更新日	2021/11/9								
															1クール	28日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	28										
キロサイド注	20mg/ m^2	皮下注射		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓											
ベネクレクスタ錠	100mg	内服	分1	↓																				
ベネクレクスタ錠	200mg	内服	分1		↓																			
ベネクレクスタ錠	400mg	内服	分1			↓																		
ベネクレクスタ錠	600mg	内服	分1																					

備考：1クール目：ベネクレクスタ錠は用量漸増期あり。2クール目以降：ベネクレクスタ錠は1日目から維持投与量を服用。

