

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	CHOP													更新日	2024/7/24							
														1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ソルデム3A輸液	200mL	点滴末梢	メイン	↓																		
グラニセトロン点滴静注 ◆プレドニン	3mg/100mL 100mg	点滴末梢	30分	↓																		
ドキシソルビシン塩酸塩注射用 生理食塩液	50mg/m ² 20mL	点滴末梢	ワンショット	↓																		
オンコビン注射用 生理食塩液	1.4mg/m ² 20mL	点滴末梢	ワンショット	↓																		
注射用エンドキサン 生理食塩液	750mg/m ² 250mL	点滴末梢	2時間	↓																		
◆プレドニン錠	100mg	内服	朝食後		↓	↓	↓	↓														

備考：

レジメン名	リツキシマブ+CHOP療法													更新日	2024/7/24							
														1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																		
リツキシマブBS点滴静注 生理食塩液	375mg/m ² 500mL	点滴末梢	指示通り	↓																		
ソルデム3A輸液	200mL	点滴末梢	メイン		↓																	
グラニセトロン点滴静注 ◆プレドニン	3mg/100mL 100mg	点滴末梢	30分		↓																	
ドキシソルビシン塩酸塩注射用 生理食塩液	50mg/m ² 20mL	点滴末梢	ワンショット		↓																	
オンコビン注射用 生理食塩液	1.4mg/m ² 20mL	点滴末梢	ワンショット		↓																	
注射用エンドキサン 生理食塩液	750mg/m ² 250mL	点滴末梢	2時間		↓																	
◆プレドニン錠	100mg	内服	朝食後			↓	↓	↓	↓													

備考：

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	Bendamustine療法													更新日	2022/5/19							
														1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	・	21															
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓	↓																	
デキサート注射液	3.3mg	点滴末梢	30分	↓	↓																	
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL																					
トリアキシン点滴静注	120mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓	↓																	
生理食塩液	250mL																					

備考：

レジメン名	Bendamustine-R療法													更新日	2022/5/19								
														1クール	28日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	2	・	28																
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓	↓																		
デキサート注射液	3.3mg	点滴末梢	30分	↓																			
ポララミン注	5mg																						
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL																						
デキサート注射液	3.3mg	点滴末梢	30分		↓																		
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL																						
トリアキシン点滴静注	90mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓	↓																		
生理食塩液	250mL																						
リツキシマブBS点滴静注	375mg/m ²	点滴末梢	指示通り	↓																			
生理食塩液	500mL																						

備考：ST合剤とアシクロビルの使用。

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	GB療法1				投与日															
					更新日		2020/3/25													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	1	2	8	15	28												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓	↓		↓	↓												
デキサート注射液	16.5mg	点滴末梢	15分	↓			↓	↓												
生理食塩液	50mL	点滴末梢																		
ガザイバ点滴静注	1000mg	点滴末梢	指示通り	↓			↓	↓												
生理食塩液	250mL	点滴末梢																		
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓	↓															
トリアキシン点滴静注液	90mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓	↓															
生理食塩液	250mL	点滴末梢																		
カロナル錠	500mg 2錠	内服	治療時	↓			↓	↓												
ポララミン錠	2mg 1錠																			

備考：前回投与でinfusion reaction発現がなければ、次回からポララミン錠の省略可。

レジメン名	GB療法2~6				投与日															
					更新日		2020/3/25													
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	1	2	28														
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓	↓															
デキサート注射液	16.5mg	点滴末梢	15分	↓																
生理食塩液	50mL	点滴末梢																		
ガザイバ点滴静注	1000mg	点滴末梢	指示通り	↓																
生理食塩液	250mL	点滴末梢																		
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓	↓															
トリアキシン点滴静注液	90mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓	↓															
生理食塩液	250mL	点滴末梢																		
カロナル錠	500mg 2錠	内服	治療時	↓																

備考：前回投与でinfusion reaction発現がなければ、次回からポララミン錠の省略可。

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	Pola-BR療法1													更新日	2021/6/15					
														1クール	21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	3	・	21												
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓														
ポララミン注 ソル・コーテフ注射用	5mg 100mg	点滴末梢	15分	↓	↓															
生理食塩液	50mL																			
リツキシマブBS点滴静注	375mg/m ²	点滴末梢	指示通り	↓																
生理食塩液	500mL																			
ポライビー点滴静注用 注射用水	1.8mg/kg 20mL	点滴末梢	90分		↓															
生理食塩液	100mL																			
デキサート注射液	3.3mg	点滴末梢	30分		↓	↓														
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL																			
トリアキシン点滴静注液	90mg/m ²	点滴末梢	1時間		↓	↓														
生理食塩液	250mL																			

備考：ST合剤とアシクロビルの使用。ポライビー投与前に解熱鎮痛薬、抗ヒスタミン剤、副腎皮質ホルモン剤を考慮

レジメン名	Pola-BR療法2～6													更新日	2021/6/15					
														1クール	21日間					
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	2	・	21													
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓	↓															
リツキシマブBS点滴静注	375mg/m ²	点滴末梢	指示通り	↓																
生理食塩液	500mL																			
ポライビー点滴静注用 注射用水	1.8mg/kg 20mL	点滴末梢	30分	↓																
生理食塩液	100mL																			
デキサート注射液	3.3mg	点滴末梢	30分	↓	↓															
グラニセトロン点滴静注	3mg/100mL																			
トリアキシン点滴静注液	90mg/m ²	点滴末梢	1時間	↓	↓															
生理食塩液	250mL																			

備考：ST合剤とアシクロビルの使用。ポライビー投与前に解熱鎮痛薬、抗ヒスタミン剤、副腎皮質ホルモン剤を考慮

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	PTCL : Pralatrexate療法													更新日	2020/3/25				
														1クール	49日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	8	・	15	・	22	・	29	・	36	・	49			
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓		↓		↓		↓					
ジフォルタ注射液 生理食塩液	30mg/m ² 50mL	点滴末梢	全開投与	↓		↓		↓		↓		↓		↓					

備考：ジフォルタ投与10日以上前よりフォリアミン0.25T/日を内服。10日以上前よりビタミンB12 1mgの筋注、8~10週ごとに投与。

レジメン名	PTCL : Bv-CHP療法													更新日	2024/7/24				
														1クール	21日間				
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	2	3	4	5	・	21									
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓															
グラニセトロン点滴静注 ◆プレドニン	3mg/100mL 100mg	点滴末梢	30分	↓															
ドキシソルビシン塩酸塩注射用 生理食塩液	50mg/m ² 20mL	点滴末梢	ワンショット	↓															
注射用エンドキサン 生理食塩液	750mg/m ² 250mL	点滴末梢	2時間	↓															
アドセトリス点滴静注用 注射用水 生理食塩液	1.8mg/kg 40mL 100or250mL	点滴末梢	30分 or1時間	↓															
◆プレドニン錠	100mg	内服	朝食後		↓	↓	↓	↓											

備考：アドセトリス初回投与前にinfusion reaction対策としてポララミン注+ソルコーテフ注投与

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	PCNSL : HD-MTX(3.5)													更新日	2020/3/26							
														1クール	14日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	3	4	5	・	14												
ソルデム3A輸液 メイロン7%	500mL 20mL	点滴末梢	メイン	×6	×6	×6	×6	×6														
グラニセトロン点滴静注液 リノロサル注射液	3mg/100mL 4mg	点滴末梢	30分	↓																		
メソトレキセート点滴静注液 生理食塩液	3500mg/m ² 500mL	点滴末梢	4時間	↓																		
ロイコボリン注	30mg	点滴末梢	ワンショット		×3	×4	×4	×2														

備考：メソトレキセート投与前にダイフェン錠の中止を確認

レジメン名	DeVIC療法													更新日	2020/3/30							
														1クール	21日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	2	3	・	21														
ソルデム3A輸液 メイロン7%	500mL 20mL	点滴末梢	メイン	↓																		
ブドウ糖液5%	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓	↓																
デキサート注射液 グラニセトロン点滴静注液	33mg 3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓	↓	↓																
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	300mg/m ² 250mL	点滴末梢	1時間	↓																		
エトキシド点滴静注液 ブドウ糖液5%	100mg/m ² 250mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓																
ウロミテキサン注	300mg/m ²	点滴末梢	ワンショット	↓	↓	↓																
注射用イホマイド 生理食塩液	1.5g/m ² 500mL	点滴末梢	2時間	↓	↓	↓																
ウロミテキサン注	300mg/m ²	点滴末梢	ワンショット	↓	↓	↓																
ウロミテキサン注	300mg/m ²	点滴末梢	ワンショット	↓	↓	↓																
ソルデム3A輸液 メイロン7%	500mL 10mL	点滴末梢	メイン	↓	×2	×2																

備考：

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	GCD療法													更新日	2023/2/21								
														1クール	21日間								
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																			
				1	2	3	4	・	8	・	21												
ソルデム3A輸液	200mL	点滴末梢	メイン	↓																			
生理食塩液	100mL	点滴末梢	メイン							↓													
グラニセトロン点滴静注液	3mg/100mL	点滴末梢	30分	↓						↓													
ゲムシタビン点滴静注用 ブドウ糖液5%	1000mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓						↓													
カルボプラチン注射液 ブドウ糖液5%	AUC=5 250mL	点滴末梢	1時間	↓																			
デカドロン錠	40mg	内服	朝食後	↓	↓	↓	↓																

備考：

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名		Epcoritamab-1											更新日	2024/4/18														
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																							
					1	・	8	・	15	・	22	・	28															
エプキンリ皮下注 生理食塩液		0.16mg 20mL	皮下注射		↓																							
エプキンリ皮下注 生理食塩液		0.8mg 20mL	皮下注射				↓																					
エプキンリ皮下注		48mg	皮下注射						↓			↓																
プレドニン錠		100mg	内服	朝食後	エプキンリ投与日~4日間																							
カロナール錠 レスタミンコーワ錠		500mg 2錠 50mg	内服	投与前	↓		↓		↓		↓																	

備考：

レジメン名		Epcoritamab-2~3											更新日	2024/4/18														
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																							
					1	・	8	・	15	・	22	・	28															
エプキンリ皮下注		48mg	皮下注射		↓		↓		↓		↓																	

備考：前回投与でGrade2又は3のサイトカイン放出症候群があらわれた場合、エプキンリ投与日~4日間プレドニン錠100mg内服。

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名	Epcoritamab-4~9										更新日	2024/4/18							
											1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	15	.	28											
エプキンリ皮下注	48mg	皮下注射		↓		↓													

備考：前回投与でGrade2又は3のサイトカイン放出症候群があらわれた場合、エプキンリ投与日~4日間プレドニン錠100mg内服。

レジメン名	Epcoritamab-10~										更新日	2024/4/18							
											1クール	28日間							
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	.	28													
エプキンリ皮下注	48mg	皮下注射		↓															

備考：前回投与でGrade2又は3のサイトカイン放出症候群があらわれた場合、エプキンリ投与日~4日間プレドニン錠100mg内服。

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名		Mosunetuzumab-1												更新日	2025/7/14													
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																							
					1	・	8	・	15	・	21																	
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓			↓		↓																			
デキサート注射液	19.8mg	点滴末梢	15分	↓			↓		↓																			
生理食塩液	50mL	点滴末梢																										
ルンスミオ点滴静注	1mg/body	点滴末梢	4時間	↓																								
生理食塩液	100mL	点滴末梢																										
ルンスミオ点滴静注	2mg/body	点滴末梢	4時間				↓																					
生理食塩液	100mL	点滴末梢																										
ルンスミオ点滴静注	60mg/body	点滴末梢	4時間						↓																			
生理食塩液	250mL	点滴末梢																										

備考：カロナール500~1000mg、レスタミンコーワ錠50~100mg服用考慮。

レジメン名		Mosunetuzumab-2												更新日	2025/7/14													
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																							
					1	・	21																					
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓																								
デキサート注射液	19.8mg	点滴末梢	15分	↓																								
生理食塩液	50mL	点滴末梢																										
ルンスミオ点滴静注	60mg/body	点滴末梢	2時間	↓																								
生理食塩液	250mL	点滴末梢																										

備考：カロナール500~1000mg、レスタミンコーワ錠50~100mg服用考慮。

非ホジキンリンパ腫(NHL)

レジメン名		Mosunetuzumab-3~8											更新日	2025/7/14							
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓	1	.	21														
ルンスミオ点滴静注	30mg/body	点滴末梢	2時間	↓																	
生理食塩液	100mL																				

備考：カロナール500~1000mg、レスタミンコーワ錠50~100mg服用考慮。

レジメン名		Mosunetuzumab-9~17											更新日	2025/7/14							
薬品名		投与量	投与方法	投与時間	投与日																
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓	1	.	21														
ルンスミオ点滴静注	30mg/body	点滴末梢	2時間	↓																	
生理食塩液	100mL																				

備考：カロナール500~1000mg、レスタミンコーワ錠50~100mg服用考慮。 8サイクルでPR/SDが得られた場合