

膀胱

レジメン名	FOLFIRINOX（アロカリス使用）																	更新日	2023/10/13		
																		1クール	14日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	.	14															
生理食塩液	20mL	中心静脈	フラッシュ	↓																	
ブドウ糖液 5 %	100mL	中心静脈	メイン	↓																	
パロノセトロン点滴静注 アロカリス点滴静注 デキサート注射液 ポララミン注	0.75mg 235mg 9.9mg 5mg	中心静脈	30分	↓																	
オキサリプラチン点滴静注液 ブドウ糖液 5 %	85mg/m ² 250mL	中心静脈	2時間	↓																	
レボホリナート点滴静注用 ブドウ糖液 5 %	200mg/m ² 250mL	中心静脈	2時間	↓																	
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 ブドウ糖液 5 %	180mg/m ² 250mL	中心静脈	90分	↓																	
フルオロウラシル注 生理食塩液	400mg/m ² 50mL	中心静脈	15分	↓																	
フルオロウラシル注 ヘパリンナトリウム注射液 生理食塩液	2400mg/m ² 5,000単位 適宜調整	中心静脈	46時間	↓																	

備考：デキサメタゾン錠4mg/日（day2-3）

レジメン名	GEM+nab PTX																	更新日	2023/10/13	
																		1クール	28日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																
				1	.	8	.	15	.	28										
生理食塩液	250mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓												
パロノセトロン点滴静注 デキサート注射液	0.75mg 6.6mg	点滴末梢	30分	↓		↓		↓												
アブラキサン点滴静注用 生理食塩液	125mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓		↓												
ゲムシタビン点滴静注用 ブドウ糖液 5 %	1000mg/m ² 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓		↓												

備考：

臍臓

レジメン名	nal-IRI+ 5FU/LV（リザーバー）																	更新日	2025/3/24			
																		1クール	14日間			
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																		
				1	.	14																
生理食塩液	20mL	中心静脈	フラッシュ	↓																		
生理食塩液	100mL	中心静脈	メイン	↓																		
パロノセトロン点滴静注	0.75mg	中心静脈	30分	↓																		
アロカリス点滴静注	235mg																					
デキサート注射液	3.3mg																					
オニバイド点滴静注	70mg/m ²	中心静脈	90分	↓																		
ブドウ糖液5%	500mL																					
レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	中心静脈	2時間	↓																		
ブドウ糖液5%	250mL																					
フルオロウラシル注	2400mg/m ²	中心静脈	46時間	↓																		
ヘパリンナトリウム注射液	5,000単位																					
生理食塩液	適宜調整																					

備考：アプレピタントカプセル（day1-3）を考慮

レジメン名	nal-IRI+ 5FU/LV（末梢）																	更新日	2025/3/24		
																		1クール	14日間		
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日																	
				1	2	・	14														
生理食塩液	500mL	点滴末梢	メイン	↓	↓																
パロノセトロン点滴静注	0.75mg	点滴末梢	30分	↓																	
アロカリス点滴静注	235mg																				
デキサート注射液	3.3mg																				
オニバイド点滴静注	70mg/m ²	点滴末梢	90分	↓																	
ブドウ糖液 5 %	500mL																				
レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	点滴末梢	2時間	↓																	
ブドウ糖液 5 %	250mL																				
フルオロウラシル注	1200mg/m ²	点滴末梢	23時間	↓	↓																
生理食塩液	500mL																				

備考：アプレピタントカプセル（day1-3）を考慮

脾臓

レジメン名	GEM1000 3週1休																更新日	2020/3/26	
																	1クール	28日間	
薬品名	投与量	投与方法	投与時間	投与日															
				1	・	8	・	15	・	28									
ソルデム 3 A 輸液	200mL	点滴末梢	メイン	↓		↓		↓											
グラニセトロン点滴静注 デキサート注射液	1mg/50mL 6.6mg	点滴末梢	30分	↓		↓		↓											
ゲムシタビン点滴静注用 ブドウ糖液 5 %	1000mg/㎡ 100mL	点滴末梢	30分	↓		↓		↓											

備考：